


May 20
48207/6

J. VIII. Sie



Digitized by the Internet Archive
in 2018 with funding from
Wellcome Library

H A N D B O E K
O V E R D E
K E N N I S E N G E N E Z I N G
D E R
Z I E K T E N
V A N H E T
V R O U W E L I J K E G E S L A C H T ;

D O O R
E. V O N S I E B O L D,
Consulterenden Arts en Hoogleeraar te Berlijn.

Uit het Hoogduitsch,
naar de *tweede vermeerderde en verbeterde* Uitgave,
door


J. J. G A A S W I J C K,
Praktizerenden Arts te Amsterdam.

T W E E D E N D E E L S E E R S T E S T U K .



T E A M S T E R D A M , B I J
C. L. S C H L E I J E R.

1 8 2 2 .



WELLCOME

LIBRARY

HISTORICAL MEDICAL

LIBRARY

WELLCOME

LIBRARY

HISTORICAL MEDICAL

LIBRARY

WELLCOME

LIBRARY

LIBRARY

HISTORICAL MEDICAL

LIBRARY



I N H O U D.

T W E E D E D E E L.

E E R S T E A F D E E L I N G.

OVER DE ZIEKTEN DER TEELDEELEN. Bladz. 1.

E E R S T E H O O F D S T U K.

OVER DE ONTSTEKING DER BAARMOEDER.	ald.
KENTEEKENEN.	3.
OORZAKEN.	5.
GEVOLGEN.	6.
VOORZEGGING.	7.
GENEESWIJZE.	8.
LITTERATUUR.	11.

T W E E D E H O O F D S T U K.

OVER DE WATERZUCHT DER BAARMOEDER.	12.
KENTEEKENEN.	14.
OORZAKEN.	20.
VOORZEGGING.	21.
GENEESWIJZE.	22.
LITTERATUUR.	27.

D E R D E H O O F D S T U K.

OVER DE BLOEDVLOEIJINGEN DER BAAR-	
MOEDER.	28.
OORZAKEN.	32.
VOORZEGGING.	36.
GENEESWIJZE.	40.
LITTERATUUR.	56.

V I E R .

VIERDE HOOFDSTUK.

	Bladz.
OVER DEN WITTEN VLOED.	62.
KENTEEKENEN VAN DEN WITTEN VLOED.	67.
DE WITTE VLOED VAN ANDERE ZIEKTEN ONDSCHIEDEN.	69.
OOZAKEN VAN DEN WITTEN VLOED.	72.
AFLOOP EN GEVOLGEN VAN DEN WITTEN VLOED.	77.
OOZAKEN EN GEVOLGEN VAN DEN OPGE- STOPTEN WITTEN VLOED.	79.
VOOZEGGING.	80.
GENEESWIJZE.	82.
OVER DE UITWENDIGE MIDDELEN.	92.
BEHANDELING VAN DEN OPGESTOPTEN WITTEN VLOED.	98.
LITTERATUUR.	104.

VIJFDE HOOFDSTUK.

OVER DEN SCIRRHUS EN KANKER DER BAARMOEDER.	107.
KENTEEKENEN VAN DEN SCIRRHUS EN KANKER DER BAARMOEDER.	110.
OOZAKEN.	133.
VOOZEGGING	138.
GENEESWIJZE.	141.
OVER DE UITSNIJDING (<i>Exstirpatio</i>) VAN DEN KANKER DER BAARMOEDER.	157.
LITTERATUUR.	167.

V E R V O L G

V A N D E

NAAMLIJST DER INTEEKENAREN.

Berg, (J. H. van den) Student in de Verloskunde, te Middelburg.

Bleeker, (J.) Med. Doct. en Vroedmeester, te Noordbroek.

Boelman, (H. J.) Med. Doct. en Vroedmeester, te Midwolda.

During, (J. P.) Med. Doct., te Middelburg.

Engels, (G.) Med. Doct. en Vroedmeester, te Noordbroek.

Es, (L. van) Boekhandelaar, te Amsterdam, 12 Ex.

Forsten, (J. A.) Med. Doct., te Middelburg.

Geyp, (J. F.) Heel- en Vroedmeester, te Cortgeene.

Grebber, (S. de) Boekhandelaar, te Amsterdam, 12 Ex.

Gutteling, (J. H.) Heel- en Vroedmeester, te Kruiningen.

Hartog, (B. C.) te Wormerveer.

Hoek, (C. C. van der) Boekhandelaar, te Leyden.

Oosten, (J. van) Boekhandelaar, te Amsterdam.

Puyn, (Jacobus) Heel- en Stads Vroedmeester en Lid van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, te Haarlem.

Reinwardt, (C. G. C.) A. L. M. Philos. en Med. Doct., Hoogleeraar in de Schei- en Kruidkunde en Natuurlijke Historie, Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw, enz. enz. enz., te Leyden.



ZINSTORENDE FOUT.

Bl. 90 reg. 9 van ond. *staat*: afwisselend met *lees*: met

E E R S T E A F D E E L I N G.

OVER DE ZIEKTEN DER TEELDEELEN.

E E R S T E H O O F D S T U K.

Over de Ontsteking der Baarmoeder.

§. 613.

De Ontsteking der Baarmoeder (*Metritis*) wordt, buiten de zwangerheid, de geboorte en het kraambed, zeldzamer waargenomen, en is dán meestendeels slechts mogelijk, wanneer de Baarmoeder tijdens de huwbaarheid in vorm en grootte veranderd wordt, derzelve bloedvaten zich meer ontwikkelen, en zij zelve met de, tot het teelstelsel behoorende, vormfels niet alleen, maar ook met het overige Organismus in betrekking komt, en eenen grooteren invloed op hetzelfde uitoefent. Met de verschijning der maanstonen heeft de Baarmoeder den aanleg ter ontsteking; deze verdwijnt weder met de jaren, als de maanstonen wegblijven, de warmte en de levenskracht der Baarmoeder kwijnen, en deze uit de gemeenschap met de, tot derzelfer stelsel en tot het overig Organismus behoorende, organen en

II.

A

vorm-

vormfels weder terugkeert; in de jaren der afneming zal men derhalve de Baarmoeder slechts zelden ontfloken aantreffen.

§. 614.

De Ontsteking der Baarmoeder verspreidt zich of over derzelver geheelen omvang, of bepaalt zich slechts tot het een of ander gedeelte derzelve, bij voorbeeld tot den bodem, tot den hals, of tot de voorste, achterste, regter- of linkervlakte van derzelve ligchaam, en dan is de zetel der ontsteking of in het spierachtige weeffel der Baarmoeder of in het sponsachtig vaatrijke, met slijmholten voorziene middenweeffel; of dezelve bepaalt zich slechts tot de vliezen, waarmede zij van buiten en van binnen omgeven is, en die het verlengsel van het buikvlies zijn. Dienvolgens kan de Ontsteking der Baarmoeder van eenen flegmoneusen, catarrhalen of erysipilateusen aard wezen.

§. 615.

Voorts is de Ontsteking der Baarmoeder idiopathisch of symptomatisch. De eerste wordt gewoonlijk voortgebracht door invloeden, welke onmiddellijk op de Baarmoeder werkten; terwijl de tweede met andere plaatselijke ontstekingen der bij de Baarmoeder het naastgelegene vormfels gepaard gaat. De idiopathische kan echter ook eene symptomatische of secundaire ontsteking der naastgelegene vormfels ten gevolge hebben. De ontsteking der scheidē, der trompetten van Fallopius, der eijerstokken, der pisblaas, van den en-

endeldarm en van het darmkanaal in het algemeen kan eene afgeleide ontsteking der Baarmoeder zijn, en wordt derhalve dikwerf in verband met deze beschouwd.

Kenteekenen.

§. 616.

De Ontsteking der Baarmoeder herkent men aan de koorts, aan de vaste aanhoudende pijn, en aan een gevoel van zwaarte in het aangedane orgaan. De pijn bepaalt zich tot ééne plaats, is aanhoudend, kloppend, en keert, de ontsteking toenemende, steeds met meerdere hevigheid terug, waarbij het gevoel van zwaarte toeneemt. Is de bodem der Baarmoeder alleen ontstoken, dan is de pijn voornamelijk boven de schaambeensvereening, naar den navel toe, merkbaar; dit gedeelte van den buik is ook meer of min gespannen, gezwollen, hard en bij de aanraking pijnlijk; er hebben snikken, neiging tot, of zelfs werkelijke braking plaats. — Als de ontsteking het voorste gedeelte van het ligchaam der Baarmoeder beslaat, dan bepaalt zich de pijn meer naar voren aan de schaambeensvereening; de plaats boven dezelve en de, meestendeels ook aangedane, pisblaas is gevoelig bij de aanraking gezwollen, waarbij meestal strangurie of ischurie gepaard gaat. — Strekt de ontsteking zich tot het achterste gedeelte van het ligchaam der Baarmoeder uit, dan verspreidt de pijn zich meer naar achteren, naar het staartbeen toe; weshalve men hier vooral hevige kruis- en lendenpijnen, en

storingen in de verrigtingen van den endeldarm bespeurt. — Als alleenlijk de eene of andere zijde wand der Baarmoeder ontstoken is, dan verspreidt zich de pijn in de liezen, heupen, beenen en voeten, derzelver beweging is somtijds geheel verlamd, zij zwellen en zijn geheel gevoelloos. — Zoo de ontsteking zich alleen tot den hals der Baarmoeder bepaalt, dan is het scheidgedeelte met derzelver mond bij het onderilaan pijnlijk, hard, gespannen, heet, droog en eenigzins gezwollen; meestal bevindt zich in dezen toestand ook de scheede, die zeer gemakkelijk bij de ontsteking van den baarmoederhals mede aangedaan wordt. — Verspreidt zich de ontsteking over den geheelen omtrek der Baarmoeder, dan is in al de opgenoemde deelen de pijn, met al de daarmede vergezellende toevallen, alsmede de onstekingskoorts, het hevigst.

§. 617.

Bij de Ontsteking der Baarmoeder lijden ook gemeenlijk de Borsten, als een gevolg van die samenstemming, waardoor zij met de Baarmoeder in verband staan. Er kan derhalve geene hevige ontsteking der Baarmoeder bestaan, zonder dat tevens ook de Borsten mede aangedaan worden; gewoonlijk zijn die pijnlijk, de pijn is stekend, en of aanhoudend of tusschenpoozend.

§. 618.

Als de ziekte toeneemt, dan komen er nog een aantal verschijnselen bij, welke door topische ontstekingen van bijzonder gewigtige organen, met het be-

beloop der ziekte, plegen vergezeld te worden, en zeer dikwijls slechts de deelneming van andere organen te kennen geven; men bespeurt benaauwdheid op de borst, walging, menigvuldige oprispingen van winden, neiging tot en werkelijk braking, meestal reeds teekenen van daarmede gepaard gaande Enteritis en Gastritis. Soms doet zich eene sterke neiging tot stoelgang en waterlozing voor, sterke dorst en drooge tong, hoofdpijn en roodheid van het aangezicht, vonkelen der oogen, suizing der ooren, moeilijke ademhaling, slapeloosheid, stuip-trekkingen, ijshoofdigheid, zuchten, aamborstigheid, gespannene en pijnlijke hypochondriën, of hevige pleurisachtige pijnen der borst met een' droogen, moeilijken hoest; daarop volgen snikken, hikken, meteorismus, zweet op het voorhoofd en borst, kleine zamengetrokkene, snelle tusfchenpoozende pols, koude der extremiteiten, op nieuw braking eener groenachtige stof, ontlasting van stinkend vocht uit de scheede, onwillekeurige pislozing en stoelgang, slaapzucht en de dood.

Oorzaken.

§. 619.

Eéne der meest gewone oorzaken van de Ontsteking der Baarmoeder buiten de zwangerheid, de geboorte en het kraambed, is verkouding, voornamelijk ten tijde der maanstonen, en al hetgene, waardoor deze belangrijke verrigting gestoord wordt. Het maankoliek, hetwelk bijzonder bij Vrouwen, die zich in den winter of gedurende koude zomer-

en herfstavonden te dun kleeden, zoo ligt ontstaat, is dikwerf niet anders, dan eene aanvankelijke ontsteking der Baarmoeder. Over het geheel zijn jonge, volbloedige personen van een prikkelbaar ligchaamsgeftel, die dikwerfaan gestoorde en opgestopte maanftonden lijden, het meest aan de Ontsteking der Baarmoeder onderhevig. — Buitendien kunnen eene Ontsteking der Baarmoeder veroorzaken: verhittende dranken, afdrijvende middelen en die, welke de maanftonden of den abortus bevorderen, drastische purgeermiddelen, polypen en ruwe behandeling der Baarmoeder, terugbuiging en uitzakking derzelve, moederkranfen, moederpillen, vreemde ligchamen in de fcheede en Baarmoeder, derzelve prikkelende infpuitingen, verwonding en kwetfing bij het onderflaan, ontsteking der naastliggende organen, plotfelijk teruggedrevene uitflag, bloedvloeiingen der Baarmoeder, aanbeijen en witte vloed door fchrik, door hevigen toorn, hevige kramp en pijnen, te zeer verhoogde teeldrift of Nymphomanie, onbevredigde hevige liefde, te menigvuldige of ruwe bijflaap, zelfbefmetting, bijzonder met zeer ruwe harde ligchamen, fcherpe witte vloed, venerifche zweren in de fcheede, verplaatfte roosuitflag, vuile fcherpe onreinigheden in de eerfte wegen, rhumatieke en venerifche fcherpten.

Gevolgen.

§. 620.

Wanneer de Ontsteking der Baarmoeder zich niet op den zevenden of veertienden dag verdeelt, dan gaat zij tot verharding, verettering, waterzucht of koud-

koudvuur over. Buiten de zwangerheid en het kraambed is het koudvuur of de verharding één der gewoonlijkste gevolgen; zeldzamer wordt de uitgang der waterzucht waargenomen. De scirrhus en kanker der Baarmoeder zijn zeer dikwijls gevolgen eener voorafgegane ontsteking van dit orgaan.

Voorzegging.

§. 621.

Deze is meestal zeer ongunstig, bijzonder daar de ziekte zoo ligt miskend en de Arts doorgaans eerst dán geroepen wordt, wanneer zij den hoogsten graad bereikt heeft, en dan zoo ligt overhelt, om tot koudvuur over te gaan. — De voorzegging hangt ook veel van het gestel der lijdere, van hare omstandigheden, en van het deel af, dat door de ontsteking is aangetast. De ontsteking is zeer gevaarlijk bij jonge, sterke, volbloedige Meisjes van een prikkelbaar gestel, bij welke de maanstonen zich nu eerst voordoen, of eerst kortelings voor den dag gekomen zijn. — Bij personen van een uitstekend aandoenlijk gestel is zij doorgaans bedenkelijker, bijzonder wanneer er tevens plaatselijke invloeden hevig op de Baarmoeder werkten. — Ontsteking der Baarmoeder, welke derzelver inwendig spierachtig weeffel aantast en zich over den bodem en het ligchaam der Baarmoeder verspreidt, is gevaarlijker dan die, welke slechts derzelver buitenste vlies en den baarmoederhals aandoet. — De voorzegging wordt ook zeer door de jaren en door de koorts, welke met de ontsteking ver-

gezeld gaat, bepaald; zij is derhalve minder gevaarlijk, naar mate de zieke in jaren gevorderd, maar zeer bedenkelijk, wanneer de koorts een typhus is. —

Geneeswijze.

§. 622.

Bij eene flegmoneuse Ontsteking der Baarmoeder, als de oorzaken plotselijk zeer hevig en gewelddadig medewerkten, de zieke flerk, volbloedig en van een prikkelbaar ligchaamsgestel is, de koorts het bepaald of zeer nabijkomend karakter eener Synocha heeft, als de plaatselijke pijn hevig is en de maanftonden plotselijk opgestopt zijn, wordt de antiphlogistische methode in eenen hoogen graad vereischt; algemeene aderlatingen, tijdig aangewend, en het nitrum in een slijmachtig afkooksel zijn hier dringend aangewezen. Heeft de koorts meer het karakter van den Synochus of Typhus, en is de pijn zeer hevig, dan zijn bloedzuigers bijzonder aan te prijzen, die, tijdig en in een genoegzaam getal aangewend, in staat zijn, de ontsteking, zoo niet weg te nemen, nogtans zeer te verminderen en minder gevaarlijk te maken.

§. 623.

Bij de Ontsteking der Baarmoeder zijn het kwik in kleine giften en de spiritus Mindereri zeer werkzame middelen; de laatste met slijmachtige afkooksels, in den beginne, na de vereischte aderlating, afwisselend met nitrum; of waar beide niet aangewezen zijn, alleen toegediend, bijzonder wanneer de

de ontsteking het gevolg eener verkouding is; de vermeerderde uitwaseming, welke daardoor bewerkt wordt, heeft eenen zeer weldadigen invloed op de genezing der ziekte, en het is derhalve noodzakelijk, die tot den zevenden dag gaande te houden.

§. 624.

Heeft de koorts, welke met de Ontsteking der Baarmoeder vergezeld gaat, het karakter van den Synochus, en bevinden zich in de eerste wegen gastrische onreinigheden, dan make men, naar omstandigheden, van voorzigtig aangewende braak- en purgeermiddelen gebruik; in het eerste geval dient de ipecacuanha, in het tweede zijn de potio Riverii, de magnesia met het acidum tartari, en de tamarinden in afkooksel, van veel nut. De aderlating, het nitrum en het kwik worden, als de ontsteking en de plaatselijke pijnen zeer hevig zijn, niettemin aangewezen.

§. 625.

Bijaldien de koorts, welke met de ontsteking gepaard gaat, van eenen gevoeligen, zenuwachtigen aard, of de ontsteking reeds zoodanig toegenomen is, dat zij tot koudvuur dreigt over te gaan, dan is de serpentaria, de kamfer en de moschus met de minerale zuren, bijzonder het elixir. acidum Halleri, dringend aangewezen.

§. 626.

Tot de uitwendige middelen, welke men bij de Ontsteking der Baarmoeder aanwendt, behooren de olieachtige inwrijvingen, de verzachtende stovingen

gen en pappen; dezelve zullen voornamelijk dán van goed gevolg zijn, wanneer de ontsteking zich tot den bodem der Baarmoeder bepaalt. Insgelijks zullen inspuitingen in de scheede slechts dán werking doen, wanneer het scheedegedeelte met gene ten zelfden tijde ontstoken is; hier dienen ook verzachtende dampen, uit een afkooksel van vlierbloemen en scheerling, door eene met hetzelfde natgemaakte spons aangebragt. Van inspuitingen in de holte der Baarmoeder zelve zal men zelden, buiten het kraambed, gebruik kunnen maken, aangezien de kleine opening of geheele fluiting van den moedermond het inbrengen van de moederspuit niet toelaat, en eene gewelddadige aanwending de ontsteking slechts zoude vermeederen. — Verzachtende klisteren zullen echter zeer dienstig zijn, voornamelijk in geval de achterwand van het ligchaam der Baarmoeder lijdt; men late zich, door den eenigzins daarmede vergezellenden buikloop, die, als een natuurlijk gevolg der ontsteking, met derzelyer verdwijning vermindert, niet altijd van het lavementzetten weêrhouden. — Onder de plaatselijke middelen kunnen ook, na behoorlijke aderlating, de inwrijvingen met eene kwikzalf zeer veel uitrigten.

§. 627.

Indien voor het overige de Ontsteking der Baarmoeder uit plaatselijke oorzaken, bij voorbeeld polypen, achter- en voorwaartsbuiging en uitzakking der Baarmoeder, moederkransen, ontstaat, dan moeten deze verdreven worden. Even zoo moet men plotselijk opgestopte aanbeijen, witten vloed, enz.

enz. herstellen, en den witten vloed, kanker, zwe-
ren, e. d. g. genezen, als dezelve de aanleidende
oorzaken der ziekte waren.

LITTERATUUR.

§. 628.

S. G. VOGEL's *Handbuch der practischen Arzneywissenschaft
zum Gebrauche angehende Aerzte. Stend. 1795. 8^o.
IV. Th. S. 417.*

J. P. FRANK, *epitome de curandis hominum morbis. Tom. II.*

MARCUS, *Entwurf einer speciellen Therapie, II. Th. §. 1593.
Nürnb. 1810.*

*Die Krankheiten der Weiber, nosologisch und therapeutisch
bearbeitet von MENDE. Berl. 1811. Tom. II. S. 12.*

CARL WENZEL, *über die Krankheiten des Uterus. Mainz
1816. S. 38.*



T W E E D E H O O F D S T U K .

Over de Waterzucht der Baarmoeder.

§. 629.

De Baarmoeder bevat ongemeen vele bloed- en watervaten, en vormt eene holte, waarin, zoo als in andere holligheden van het ligchaam, in de herten-, borst- en buikholte enz., uit de uiterste einden der slagadervaten een dierlijke wasem zich ophoopt, welks vorming en hoeveelheid in het naauwste verband tot den graad der ontwikkeling en der werkzaamheid van de verrigting der Baarmoeder staat. Deze wasem is gering en van eenen weiachtigen aard bij de nog niet ontwikkelde Baarmoeder vóór de huwbare jaren, meerder gedurende dat tijdperk des levens, wanneer de vatbaarheid ter bevruchting plaats heeft, het meest nogtans en tevens van eenen meer lymphatischen aard, gedurende de zwangerheid, dan in dat tijdperk, wanneer de werkzaamheid der reproductie den hoogsten trap bereikt heeft. In den gezonden toestand bedraagt de menigte van het afgescheidene vocht slechts zoo veel, als tot het bepaalde doel vereischt wordt; en hetzelfde kan zich nimmer te zeer ophooopen, dewijl het deels door den moedermond eenen uitweg vindt, deels door de watervaten, die in groote menigte over de binnenvlakte van derzelver holligheid verspreid zijn, opgeslorpt wordt. Zoodra echter eene te groote menigte van
dit

dit vocht afgezonderd wordt, of eene storing in de verrigting der opslorpende vaten, welke naar die mate met eene geringere werkzaamheid opslorpen, plaats heeft, dan ontstaat er Waterzucht der Baarmoeder, of eene tegennatuurlijke ophooping van dat vocht in de Baarmoeder, voorondersteld, dat aan hetzelfde ook de weg ter ontlasting door den moedermond besloten zij.

§. 630.

Men onderscheidt bij de waterzucht der Baarmoeder de volgende toestanden: of het water bevindt zich in de holte der Baarmoeder, en is onmiddellijk door derzelver wanden omgeven (*Hydrometra ascitica*); of het is, schoon zeldzamer, tusfchen het sponsachtig vaatrijke, met slijmholen voorziene, middenweeffel verspreid; of het is in bijzondere vliesachtige bekleedsels besloten (*Hydrometra cystica, vesicularis, hydatica*), welke echter zeer dikwerf ook door de eerste foort vergezeld is.

§. 631.

De Waterzucht der Baarmoeder is ook verschillende met betrekking tot den tijd, waarin zij ontstaat. Of dezelve doet zich buiten de zwangerheid, of gedurende dezelve, voor; van de eerste, die meestendeels als *Hydrometra ascitica* verschijnt, wordt hier alleen melding gemaakt, terwijl de andere bij de ziekten der zwangere Vrouwen eene plaats zal aantreffen.

Kenteekenen.

§. 632.

De herkenning van de Waterzucht der Baarmoeder, zoo als dit reeds door HIPPOCRATES (*) en verscheidene vroegere Artsen is bijgebracht, valt dikwijls zeer moeilijk; deze ziekte kan gemakkelijk met eene zwangerheid of de buikwaterzucht (*Ascites*) verwisfeld worden. De kenteekenen zijn de volgende: 1) er vormt zich een gezwel in de onderbuikstreek, bijzonder boven de schaambeensvereeniging, hetwelk geheel den vorm der Baarmoeder behoudt, allengskens al grooter wordt, den navel bereikt, zich eindelijk zelfs over den geheelen buik verspreiden kan, bij de aanraking niet hard, maar veeleer elastiek op het gevoel is, en bij de *Hydrometra ascitica* eene duidelijke golving te kennen geeft, welke daarentegen bij de *Hydrometra cystica* niet bespeurd wordt; 2) bij het onderflaan vindt men den moedermond gesloten, het scheid gedeelte verdund, en bijna geheel verdwenen, het onderste segment der Baarmoeder uitgezet, gespannen, en zeer dikwijls wordt bij de *Hydrometra ascitica* aan hetzelfde eene golving waargenomen; 3) is hiermede altoos een gevoel van zwaarte midden in den buik, eene aanhoudende drukking naar beneden, en eene gewaarwording van uitzakking der Baarmoeder gepaard; deze ongemakken zijn des te belangrijker, wanneer eene periodieke, deels-

wij-

(*) HIPPOCRATES, *de mulierum morbis. Lib. I. Cap. VI.*

wijze uitvloeiing van het bijeenverzamelde water, gelijk bij de *Hydrometra cystica*, niet volgen en de zieke eenigermate verligten kan. Somwijlen namelijk, en dit geldt vooral van de *Hydrometra ascitica*, heeft zulk eene uitvloeiing door de *Vagina* plaats. Dezelve wordt dán, over het algemeen, door kramp- en wezenlijk weeënaardige pijnen in den buik voorafgegaan, de Baarmoeder trekt zich tot op eenen zekeren graad te zamen, en eene grootere of geringere hoeveelheid van water wordt met verligting der ongemakken tevens uitgedreven. Het ontlaste vocht is dán meestendeels van eenen weiachtigen of wei-waterachtigen aard, zelden geleiachtig, nog zeldzamer met etter of bloed vermengd. 4) Van het begin der ziekte af bevindt zich de lijderes in eenen tamelijk ongestoorden welstand. Haar voorkomen, de eetlust, de spijsvertering, de slaap, de ademhaling, de pisaffcheiding blijven geregeld, slechts naar gelang de ziekte langer duurde, de uitzetting der Baarmoeder eenen hoogen graad bereikt had, of invloeden voorafgingen, welke het ontstaan der waterzucht over het algemeen begunstigten; naar die mate gaan, als de ziekte toeneemt, teekenen van waterzucht in andere vormfels, bij voorbeeld zuchtachtige zwellingen der voeten, der uitwendige teedeelen enz., en, even als in de *Hydrops ascites*, eene menigte secundaire toevallen daarmede gepaard, die deels door de drukking der uitgezette Baarmoeder op de naastliggende deelen, deels door een secundair lijden der reproductie, over het algemeen veroorzaakt worden. Deze toevallen zijn: bij-

zon-

zonder: sterke spanning en hevige drukking van den buik, in de hypochondriën, in de lenden- en onderbuiksstreek, moeilijke en belette ademhaling, benaauwdheid, ongeregelde polslag, gebrek aan eetlust en aan behoorlijke spijsvertering, walging, winden, kolijkpijnen, braking, Tympanitis, trage ontlasting van verwijlde, stinkende drekstoffen, of hardlijvigheid, somwijlen kramp in den buik en in de blaas, Dysurie, Ischurie en Strangurie, troebele, veeachtige (*jumentosa*), slechts in eene geringe hoeveelheid ontlastende pis, verzwakt voorkomen; eindelijk algemeene vermagering van het ligchaam, Febris hectica met derzelver eigendommelijke verschijnselen, de grootste magteloosheid en colliquative ontlastingen, onder welke vereenigde toevallen eindelijk de zieke bezwijkt. 5) De maanstonen zijn bij de Hydrometra ascitica bijna steeds, maar bij de cystica zeldzamer opgestopt, en worden bij gene meestendeels door eenen witten vloed vervangen.

§. 633.

Van de Buikwaterzucht (*Ascites*) onderscheidt zich de Waterzucht der Baarmoeder door de volgende kenteekenen: 1) de zwelling in de onderbuiksstreek is bij de Waterzucht der Baarmoeder veel meer beperkt, begint lager van de teeldeelen, en breidt zich minder uit; 2) wanneer de zieke van de eene naar de andere zijde bukt, dan gevoelt men eene soort van golving, welke, als de zwelling toeneemt, somtijds ook, bij het onderzoek met de hand, maar nooit zoo duidelijk als bij de Buikwaterzucht waargenomen wordt; 3) de

3) de zieke wordt bij de Waterzucht der Baarmoeder eene bijzondere zwaarte en eene perfsing naar beneden tegen de teeldeelen gewaar; 4) het fcheededeelte verdwijnt bij de Waterzucht der Baarmoeder zeer dikwerf geheel en al, en door de fcheede loopt uit den moedermond water af; 5) het voorkomen der zieke en haar toefland is veel beter dan bij de Buikwaterzucht; die der Baarmoeder kan veel langer duren, zonder dat de verrigtingen der nabijgelegene vormfels van belang lijden: daarentegen voegen zich bij deze veel vroeger ftoringen van den gemeenen welstand, merkbare zwakte in de verfchijnselen der prikkelbaarheid, vermindering der werkzaamheid in het reproductief ftelfel, vermagering van het ligchaam, gebrek aan eetlust, belette af-fcheiding van pis en zweet.

§. 634.

Van de geregelde Zwangerheid wordt de Waterzucht der Baarmoeder door de volgende kenteekenen onderscheiden: 1) de ziekte doet zich voor met de jaren der reeds verlorene bevruchtingsvatbaarheid; 2) de zwelling van den buik bereikt vroeger eene aanmerkelijke grootte, dan in de Zwangerheid, is minder warm, niet zoo hard, meer elastiek, en neemt zeer dikwijls bij afwifeling toe en af; 3) doorgaans zijn de gewone symptomen, welke men meestal in het begin der Zwangerheid pleegt te befpeuren, als: misfelijkheid, braking, gebrek aan eetlust, niet aanwezig; deze doen zich eerst later, met de toeneeming der ziekte, voor, terwijl dezelve gewoonlijk met den aanwas der Zwangerheid plegen te verdwijnen;

4) de borsten zwellen niet op, maar blijven slap en gerimpeld; 5) de maanftonden zijn of voor eenigen tijd opgestopt, of doen zich, maar meestal ongeregeld, en met eenen afloop van water voor, of worden door eene slijmachtige uitvloeijing vervangen; 6) na de helft eener gewone dragt wordt er geene beweging van het kind gevoeld; de eenigzins merkbare golving zal men niet ligt met de beweging van het kind, welke tegen den onderzoekenden vinger eenen harden wederstand biedt, verwisselen; 7) als na den gewonen tijd eener Zwangerheid geene geboorte is gevolgd; 8) het scheidegedeelte is gemeenlijk zachter en rekbaarder, dan in de Zwangerheid, en verdwijnt vroeger; terwijl bij deze de genoemde veranderingen van het scheidegedeelte met de toeneming der vrucht en den duur der Zwangerheid eenen gelijken tred houden; 9) in het scheidegewelf voelt men het onderste segment reeds vroeg gespannen en gewelfd, en door hetzelfde heen eene golving, terwijl deszelfs uitzetting in de Zwangerheid later plaats heeft, en er dan gewoonlijk eene hardheid waargenomen wordt; 10) de Waterzucht der Baarmoeder gaat gewoonlijk met algemeene symptomen der waterzucht gepaard, die in de Zwangerheid niet aangetroffen worden; en als men dezelve waarneemt, dan hebben deze, namelijk: zuchtachtige zwelling der voeten en der uitwendige teeldeelen, meestal slechts op het einde der Zwangerheid plaats. Met de ongeregelde Zwangerheid, of die buiten den Uterus, zal men wel de Waterzucht der Baarmoeder niet ligt verwisselen, als men in aanmerking neemt, dat in gene de buik, wanneer die, uitgenomen bij de bevruchting in een of

of ander trompet van Falloppius, met de toemende vorming van het kind en deszelfs eivliezen, eene buitengewone uitzetting verkrijgt, niet onmiddellijk boven de schaambeensvereëning uitpuilt, en den vorm der Baarmoeder bepaaldelijk aanwijst, maar de zwelling meer in de eene of andere onderbuikstreek waargenomen wordt. Daarbij is de zwelling volstrekt niet elastiek en geene golving in dezelve, het onderste segment der Baarmoeder noch uitgezet noch gespannen, noch het scheidegedeelte verdwenen; wel echter bespeurt men de algemeene teekenen der zwangerheid, der verhoogde voortbrengingskracht, van vermeerderde zwelling der Borsten, de afzondering van een melkachtig vocht uit de tepels, eene dikwijls diep in den buik en in het gedarmte merkbare, offchoon van, bij de zwangerheid in den Uterus, geheel verschillende gewaarwording eener beweging van het kind: verschijnselen, welke doorgaans bij de Waterzucht der Baarmoeder niet aanwezig zijn. Na de tiende maanmaand wordt de beweging minder merkbaar en de zwelling van den buik blijft gedurende eenen langeren of korteren tijd staan, of begint allengskens onmerkbaar te verminderen, waarbij de zieken langer een beter voorkomen en welstand genieten, en de maanston den zich voordoen, nadat met weeënaardige gewaarwordingen de decidua Hunteri stuksgewijze afgezonderd wordt; bij de Waterzucht der Baarmoeder wordt de uitzetting van den buik hoe langer hoe grooter, daarbij is het aangezigt meer ingevallen, en de welstand zoo goed niet, de maanston den komen niet te voorschijn en er ontlast zich of eene ongekleurde

of eene donker-, somtijds bruinroode vochtigheid, zonder blijken van vliezen, maar wel van bedorven en ontbonden maanftondelijk bloed, enz.

§. 635.

Bij de Lijkbeschouwing vindt men, behalve eene aanzienlijke hoeveelheid water in de holte der Baarmoeder, hetwelk men van veertig tot vijftig ponden aangetroffen heeft, of behalve eene verzameling van een grooter of kleiner aantal waterblaasjes, van grooteren of kleineren omvang, zeer dikwijls ook vele werktuigelijke gebreken der Baarmoeder, die ongetwijfeld, even als de Waterzucht der Baarmoeder zelve, gevolgen van eenen voorafgeganen, wel degelijk ontstokenen ziekte-toestand van dit orgaan zijn. Daartoe behooren in het bijzonder verhardingen, knoestgezwollen en verzweringen der Baarmoeder, verdikking van derzelver weeffel, een eeltachtig, zamengetrokken, of met tegennatuurlijk gevormde vliezen besloten moedermond, en onderscheidene vergroeiingen der Baarmoeder met nabijgelegene organen.

Oorzaken.

§. 636.

De naaste oorzaak der Waterzucht van de Baarmoeder bestaat altijd in eene buitengewone ophooping van wei- of waterachtig vocht in de holte der Baarmoeder, dat of door de vermeederde afscheiding, door de belette uitvloeijing, of door de gestoorde opflorping voortgebracht is.

§. 637.

§. 637.

Eene vermeerderde afscheiding van weiachtig vocht kan zeer gemakkelijk ontstaan na eene ontsteking der Baarmoeder, na eene plotselinge opstopping der maanstonen, van witten vloed, of van aanbeijen, na menigvuldige ontijdige verlosfingen, en door de plaatselijke prikkeling van eene in de Baarmoeder zich bevindende misgeboorte, of van een nagebleven stuk moederkoek, zoo als RUYSCH (*) daardoor de Waterzucht der Baarmoeder heeft zien ontstaan. Men heeft dezelve ook als een gevolg van kwetsingen der watervaten waargenomen. Zoo brengt STARK (†) het voorbeeld van een in de Baarmoeder gescheurd watervat bij. De buik zwol zoo spoedig en tot eene zoo verbazende dikte, dat de zieke reeds drie uren daarna stierf.

§. 638.

De oorzaak der belette uitvloeijing van waterachtig vocht kan zijn: vergroeiing van den hals der Baarmoeder, als een gevolg van oorspronkelijke vorming, of eener ontsteking, welke door toevallige invloeden veroorzaakt werd, fluiting van den moedermond door een vlies, door verdikt slijm, dikwijls het gevolg van eenen voorafgeganen witten vloed, door eene bloed-

(*) RUYSCHIUS, *observat. anat. Chirurg.* N^o. 28. pag. 25 et 828.

(†) J. CHR. STARK'S *Handb. zur Kenntniß und Heilung innerer Krankheiten des menschlichen Körpers.* II. Th. Jen. 1800. S. 601. 8^o.

bloedprop of eene andere misvorming nabij den moedermond, die door vreemde lichamen voortgebragt worden, enz.

§. 639.

De opflorping kan belet worden door oorzaken, welke, of op eene organische of dynamische wijze, de werking der opflorpende vaten verminderen. Tot de eersten behooren verscheidene organische gebreken, vleeschgezwellen, verhardingen en knoestgezwellen der Baarmoeder, polypen, uitwasfen en gezwellen (*), waardoor groote watervaten gedrukt worden. Diegenen, welke op eene dynamische wijze de werkzaamheid der opflorpende vaten verzwakken, zijn de zoodanigen, welke of waterzucht in het algemeen doen ontstaan, of die der Baarmoeder in het bijzonder ten gevolge hebben, als bloedvloeijingen der Baarmoeder, dikwijls wederkeerende abortus enz. Zou niet somtijds de aard van het afgescheidene vocht zelfs zoo veranderd worden, dat de watervaten hetzelfde niet opflorpen kunnen?

Voorzegging.

§. 640.

De Waterzucht der Baarmoeder is niet zoo gevaarlijk als die, welke in den buik of in de hersenen plaats heeft. De ziekte kan langen tijd zonder merkbare storing van den algemeenen welstand aanwezig we-

(*) WRISBERG, *Commentat. Soc. Reg. Scient. Goetting.* ann. 1787—88. vol. IX. p. 136.

wezig zijn; deze vertoont zich gewoonlijk slechts dán, wanneer de ophooping van water in eenen hoogen graad toeneemt, en tot eene aanmerkelijke uitzetting der Baarmoeder aanleiding geeft. — Soms tijds ontlast zich het water door de scheede, de uitzetting van den buik gaat weg, en de zieke wordt hersteld, bijzonder wanneer toevallige invloeden, welke zelfs de ophooping van water tegengaan of de vereischte werking der opslorpende vaten herstellen, daartoe medewerken. — In zeldzame gevallen zag men de Waterzucht der Baarmoeder door bijkomende salivatie verdwijnen (*). — Niet zoo gunstig is de voorzegging, wanneer er volstrekt geen water afloopt, de Baarmoeder zeer uitgezet is, eene algemeene verzwakking en vermagering zichtbaar wordt, de pisontlasting zeldzaam, of slechts zeer spaarzaam is, de buik pijnlijk wordt, en sluipende koortsen met symptomen van waterzucht in andere organen, bijzonder in den buik en in de borst, daarmede vergezeld gaan.

Geneeswijze.

§. 641.

De behandeling van de Waterzucht der Baarmoeder vereischt vooral, dat men derzelver aanleidende oorzaken in het oog houdé. Zoo dezelve na eene plotselinge opstopping der maanstonen, der aanbeijen of van eenen witten vloed ontstaat, dan is zulks eene dringende aanwijzing, om die afzonderingen weder te her-

(*) FABRE, *observations de Chirurgie.*

herstellen. De nablijvende vermeerderde afzondering van weiachtig vocht echter wordt inwendig door Antimonialia, Emetica in refracta dosi, maar bijzonder door het kwik en de Digitalis p.; en uitwendig door inwrijvingen met kwik, de vlugtige zalven, de aromatische berookingen en inwikkelingen verdreven. Ligt de oorzaak in den beletten afloop van waterachtig vocht, als een gevolg der vergroeiing van den baarmoederhals, of eener fluiting van den moedermond door een vlies, dan moeten die door eene Operatie weggenomen worden. Men kan zich daartoe van eenen gekromden dunnen Troicar bedienen, en in het vervolg, om het water te ontlasten, eenen Catheter inbrengen, waarvan men dan ook gebruik maakt, wanneer door verdikt slijm in den moedermond het water belet wordt af te loopen.

§. 642.

Als de Waterzucht der Baarmoeder te weeg gebracht wordt door oorzaken, welke de werkzaamheid der opslorpende vaten op eene dynamische wijze verzwakken, en somtijds in eenen paralytischen toestand der opslorpende vaten van het baarmoederstelsel gelegen zijn, bijzonder wanneer de invloeden eene zeer verzwakkende werking op het teelstelsel uitoefenen, dan moet men de algemeene zwakte niet alleen, maar ook de bijzondere van het teelstelsel door versterkende geneesmiddelen wegnemen, en tevens ook zulke middelen aanwenden, welke door verhooging der prikkelbaarheid de werkzaamheid der opslorpende vaten vermeerderen. Inwendig worden Mercurialia, voornamelijk met kamfer en

en opium, de squilla, de digitalis purpurea, de polygala senega (*), het decoctum ononid. spinos., de jeneverbesfen en derzelver preparaten, met Tonica, voornamelijk met bittere extracten, de gentiana, de china, bijzonder aanangeprezen. Uitwendig wende men het unguent. hydrarg. ciner., de ethériscch-olieachtige inwrijvingen, die der squilla en digitalis, van het ol. juniper. en terebinth. aether., het waschen van den buik met geestrijke vochten, de aromatische inwikkelingen en een' gordel uit kruiden aan. Soms kan echter de Waterzucht der Baarmoeder in eenen zoo hoogen graad aanwezig zijn, dat of de aangewezenen middelen, welke onmiddellijk de werkzaamheid der opflorpemde vaten vermeerderen, niet genoegzaam werken, of de afzondering zelve in eene te groote menigte plaats heeft. In dit geval moet de ontlasting van het water door den moedermond voorafgaan; en wanneer deze niet mogelijk, en ook de weg door het scheedegewelf besloten ware, dan moest de Paracentesis door den endeldarm of uitwendig aan den buik aan de eene of andere zijde boven de schaambeenderen (†) met eenen Troicar verrigt worden, die

(*) DÖMLING, *Geschichte und Heilung einer Gebärmutterwassersucht*. In HORN'S *Archiv für die medicinische Erfahrung*. Band V. bl. 14. Berl. 1804.

(†) De Schrijver heeft reeds drie malen op deze wijze de Paracentesis bij de Waterzucht der Baarmoeder gelukkig aangewend, waarop de, ééne handbreed boven den navel uitgezette, Uterus zich merkbaar onder de hand allengskens zamentrok.

die ook in het vervolg andermaal kan vereischt worden, bijaldien zich het water op nieuw weder in eene groote menigte verzamelt. Als men het water heeft doen ontlasten, dan kunnen er, om de gezonkene prikkelbaarheid der Baarmoeder in het algemeen te verhoogen, met de inwendig versterkende geneesmiddelen, ook vlugtig prikkelende inwrijvingen, baden en inspuitingen der Baarmoeder met een aftreksel van aromatische kruiden, aangewend worden.

§. 643.

De Waterzucht der Baarmoeder bijzonder uit aanleidende oorzaken, bij voorbeeld venerische besmetting of organische ziekten, namelijk verhardingen, knoest-, vleesch- of spekkegezwollen der Baarmoeder ontstaande, dan moeten die insgelijks verwijderd worden, bijaldien men de laatstgenoemden uit den weg kan ruimen. Deze vereischen in- en uitwendig de krachtigste Resolventia, het conium maculatum, de digitalis p., de belladonna, en, naar omstandigheden, de Antimonialia en Mercurialia. Polypen of andere misvormingen der Baarmoeder moeten weggenomen worden, en bij de nog voortdurende vermeerderde uitwaseming van weiachtige vochten zijn de middelen §. 642 aangewezen.

§. 644.

Om de wederkeering der Baarmoederwaterzucht voor te komen, is het noodzakelijk op de beterschap der ziekte voornamelijk acht te geven. Tot dat einde dienen een doelmatige, met de telkens individueele betrekkingen der zieken overeenkomstige

ge

ge diët en leefwijze , het eenen geruimen tijd voortgezet gebruik der bij §. 643 bijgebragte inwendige , insgelijks met de aanhoudend versterkende geneesmiddelen , en uitwendig de genoemde inwrijvingen en inwikkelingen van den buik , alsmede het inspuiten van versterkende , zamentrekkende en aromatische afkookfels , de inspuitingen van kalkwater afwisselend met mirrhé of van rooden wijn.

L I T T E R A T U U R.

§. 645.

CHR. CUNRAD et J. FR. STARKE , *de hydrope uteri. Region.* 1701. In HALLERI *disp. pathol.* Tom. IV. N^o. 134.

CAMERARIUS , *de hydrope uteri. Tub.* 1729. 4^o.

G. B. BILFINGER , *de hydrope uteri gravidi. ib.* 1761. 4^o.

COUSIN , *traitement de l'hydropisie de matrice, accompagnée d'inflammation dans l'état de grossesse. Par.* 1783. 8^o.

KOMMER , *praes.* GRUNER , *de hydrometra. Jen.* 1792. 4^o.

DE GREGORINI , *de hydrope uteri, etc. Hal.* 1795.

WIRER , in LODER'S *Journ. für Chirurgie, Geburtshülfe und gerichtliche Arzneykunde.* IV. B. 2 St.

W. A. HAASE , t. a. pl. III. B. 1 Abth. S. 511.



DERDE HOOFDSTUK.

Over de Bloedvloeijingen der Baarmoeder.

§. 646.

Het middelpunt van het geheel Vrouwelijk teelsstelsel is de Baarmoeder. Dezelve bevat eene menigte bloedvaten, welke lijnregt in het bekken liggen, genoegzaam zwevende tusschen de pisblaas en den endeldarm, met eene van derzelve openingen — den buitensten moedermond — buiten- en benedenwaarts gerigt. In derzelve holligheid eindigen de fijnste takken harer vaten, deze zijn met het vaatstelsel van den onderbuik het naauwst vereenigd; zij is de zetel eener periodieke afzondering van bloed — der maanstonen, — bezit zenuwen, staat met zulke belangrijke organen in gemeenschap, en oefent derzelve invloed op het geheele Organismus der Vrouw uit, bij welke het teelsstelsel over het algemeen, ten gevolge van deszelfs grootere ontwikkeling, zeer werkzaam is. Er bestaat derhalve geen orgaan in het Vrouwelijk ligchaam, hetwelk zoo zeer tot Bloedvloeijingen, ook buiten de zwangerheid, de verlossing en het kraambed, geneigd is, als de Baarmoeder; maar die daardoor eene nog sterkere geschiktheid verkrijgt, waarom dan ook Bloedvloeijingen der Baarmoeder veel menigvuldiger bij Vrouwen, die reeds één- of meermalen gekraamd hebben, voorkomen.

§. 647.

Echter kan elk bloedverlies der Baarmoeder geene Bloedvloeijing (*Metrorrhagia*, *Haemorrhagia uteri*) genaamd worden. Slechts datgene, hetwelk niet het gevolg is van de eigendommelijke geregelde ver- rigting der Baarmoeder, en van de gestoorde gezond- heid der Vrouw, verdient dien naam, ten zij slechts eenige of alle verrigtingen van dezelve afwijken.

§. 648.

Derhalve zijn volgens §. 647 de bloedvloeijingen elkander in graad niet gelijk. Menigmaal is het bloedverlies, wat de hoeveelheid betreft, slechts gering; dan eens loopt het als een stroom en doet zich als eene zoogenaamde storting, of geheel versch en helder rood onmiddellijk uit de vaten, of later voor, nadat het bloed zich in de Baarmoeder korter of langer opgehoopt had, en door derzelve plaats- hebbende zamentrekking plotselijk uitgedreven werd. In dit geval is het bloed gewoonlijk van eene don- ker roode kleur, gestold, en ontlast zich ook in klonters.

§. 649.

Een gering bloedverlies kan dus reeds bloedvloei- jing genaamd worden, wanneer hetzelfde, bij voor- beeld bij een zwak gestel der persoon, met eene sto- ring der gezondheid gepaard gaat: terwijl integendeel zelfs het verlies van stroomen bloeds dien naam niet verdient, wanneer het geen nadeeligen in- vloed op de gezondheid uitoefent. Dienvolgens is het denkbeeld van bloedvloeijingen slechts betrekkelijk.

§. 650.

§. 650.

De Bloedvloeijing der Baarmoeder kan of plotsfelijk ontstaan, of wordt gewoonlijk door zekere verschijnselen, welke dezelve te kennen geven, voorafgegaan; met name: moeilijke ademhaling, benaauwdheid, zuchten, groote onrust, hartklopping, beving der ledematen, snelle, driftigen pols, duizeling, hoofdpijn, dofheid, fuizing der ooren, een gevoel van hette door het gansche ligchaam, brandende handen en voetzolen, volheid, gepaard met hette in den onderbuik, een' aandrang naar de teeldeelen, zwelling van de schaamstreek, menigvuldigen aandrang tot pislozing, branding en neiging tot jeuken aan de teeldeelen.

§. 651.

Ten opzichte der Diagnosis is het onderscheid tusfchen de uit- en inwendige Bloedvloeijing zeer belangrijk. In het laatste geval ontlast zich, wel is waar, geen bloed uit de Baarmoeder, maar dat, hetwelk uit derzelve vaten vloeit, hoopt zich in derzelve holte, of in de ledige inwendige tusfchenruimte van derzelve wanden op, en wordt fomtijds slechts uit de afvloeijing van het zich doordringend bloedwater, en uit de bij §. 650 bijgebragte voorboden, gewoonlijk echter uit de toevallen, welke met het toenemend bloedverlies plegen vergezeld te gaan, herkend.

§. 652.

De toevallen echter, welke bij eene Bloedvloeijing zich voordoen, en het gevolg der daardoor plaats-
heb-

hebbende storing van de gezondheid der Vrouw zijn, hangen deels van de menigte des bloeds, deels van het gestel, van den ouderdom, der leefwijze, der meer of min gunstige omstandigheden, van den aanleg, der oorzaak en van andere invloeden af, en zijn dus nu eens meer, dan wederom minder hevig, en voor de gezondheid nadeelig.

§. 653.

Gewoonlijk is het gelaat bleek en ingevallen, de oogen zijn flauw, meestal gesloten, en met blaauwe of bruine kringen omgeven; de spits van den neus ijskoud, en het voorhoofd met een koud zweet overdekt; de ledematen zijn koud, de zieken gevoelen zich zeer vermoeid, krijgen menigvuldige flauwten, duizeling, suizing der ooren, huivering en rilling; zij klagen over eenen droogen mond en aanhouden den dorst; de pols is klein, snel, tuschenpoozend, en dikwerf nauwelijks voelbaar. Dikwijls gaan ook andere toevallen, als drukking op den hartkuil, toeknijping en hette van de keel, misfelijkheid, neiging tot en ook werkelijk braken, daarmede gepaard; de buik is gezwollen, gespannen en pijnlijk. Soms tijds gevoelen zij ook pijnen in de Baarmoeder, in de lendenstreek en aan het heiligbeen, die dikwijls naar onderen tot aan de dijen zich uitstrekken, en zich door scheuren, snijden en trekken te kennen geven. Dikwerf gevoelen zij ook gedurende de bloedvloeiing geene de minste pijnen.

§. 654.

De gevolgen der Bloedvloeijing zijn verschillende. Of dezelve doodt spoedig, en wordt dan meestendeels door een ijskoud zweet, hevige flauwten, beving van alle leden, benaauwdheid, diepe zuchten, reutelende ademhaling, pees- en zenuwtrekkingen voorafgegaan; of dezelve doodt langzaam, als een gevolg der gestadig toenemende verzwakking, door eene sluipende koorts, longtering of waterzucht. Sommige leven wel verscheidene jaren voort; maar eene aanhoudende zwakte, ongeeneslijke witte vloed, hysterie, droefgeestigheid, buiksverstoppingen, onvruchtbaarheid, uitzakking, scirrhus en kanker der Baarmoeder, zijn de gevolgen, welke meestendeels plegen plaats te hebben.

Oorzaken.

§. 655.

Op het ontstaan van de Bloedvloeijing der Baarmoeder heeft bovenal de aanleg der Vrouw eenen veelbeteekenenden invloed; bij zwakke, kwaadsappige gestellen kan dezelve zeer gemakkelijk ontstaan. Dezelve is of bij de geboorte van eene zwakke, afgematte en zieke moeder overgeërfd, die zelve te voren meermalen aan bloedvloeijingen, den witten vloed en andere ziekten veel geleden heeft; of toevallig door schadelijke invloeden, welke reeds van de vroegste jeugd af daartoe medewerkten, bij voorbeeld eene weekelijke opvoeding, slecht voedsel, vochtige en natkoude woning, Engelsche ziekte,

scro-

scrofelen , te vroeg opgewekte teeldrift , veroorzaakt. De bloedvloeijing wordt echter in het vervolg des te zekerder voortgebracht , wanneer zich tijdens de huwbaarheid en met het huwelijk invloeden voordoen , welke de aangeborene of geërfde zwakte in eenen hoogen graad vermeederen , met name : te vroeg ingespannen arbeid , menigvuldig nachtwaken , zittende werkelooze leefwijze , ontevredenheid in het huwelijk , ijverzucht , beleedigde liefde en hartstogten in het algemeen , beroepszorgen , buitensporigheden in het genot van den bijlaap , zelfbevlekking , menigvuldige en ontijdige verlosfingen , een moeilijk kraambed , te langdurige kraamvloed , herhaalde aderlatingen , het misbruik van purgeer- en geneesmiddelen in het algemeen , die te zeer verzwakken , speekselvloed , een sterk zweet , menigvuldige verkoudheden , natkoude woning , onreine lucht en ziekten , waardoor bijzonder de reproductive sfeer lijdt , namelijk : de venerifche befmetting , scrofelen , fcheurbuik , buikloop , roode loop , fchurft , enz.

§. 656.

Nogtans zijn alle Bloedvloeijingen uit de Baarmoeder geene gevolgen van zwakte of van eene verminderde levenskracht , gelijk de meeste voorstanders der opwekkingsthéorie aannemen ; maar de Bloedvloeijingen der Baarmoeder kunnen ook door eene verhoogde prikkelbaarheid van het vaatstelsel , zelfs door eene Synocha , voortgebracht worden. Het verschijnsel (*Symptom*) van het bloedverlies levert geen grond op , om den algemeenen ziekte-toestand telkens voor zwakte te verklaren ; hetzelfde kan bij

gezonde, sterke, gespierde, volbloedige personen, bijzonder die een prikkelbaar gestel hebben, niettemin in vermeerderde sterkte, in eene te zeer verhoogde prikkelbaarheid van het vaatstelsel des overigen Organismus, in eenen Synocha of een Erethismus gelegen zijn, ofschoon er in het orgaan zelf — in de Baarmoeder — zwakte heerscht. En daartoe wordt des te eer aanleiding gegeven, wanneer zekere invloeden, als te hevige ligchaamsbewegingen, dansen, rijden, e. d. g., te zeer verhoogde teeldrift, hevige hartstogten, als toorn en ergernis, het onmatig gebruik van verhittende spijsen en dranken, bij voorbeeld van wijn, koffij, punch, brandewijn, minerale wateren en welke ijzer en veel koolzuur bevatten, te voedzame en gekruide spijsen, het misbruik van warme, bijzonder minerale baden, te groote warmte in den zomer, bijzonder wanneer zich de Meisjes of Vrouwen op het land met den arbeid in de opene lucht bezig houden, enz. mede-werken. Het ontstaan der bloedvloeijing bij deze invloeden is zeer dikwijls het middel, om de ontsteking der Baarmoeder tegen te gaan, welke zich ook zouden ontwikkelen, wanneer de vaten van dit orgaan ten allen tijde den aandrang van het bloed wederstaan konden, of om die critisch te genezen, wanneer dezelve werkelijk plaats heeft.

§. 657.

De bloedvloeijing der Baarmoeder wordt echter zeer dikwijls door plaatselijk lijden van dit orgaan zelf voortgebracht. Dit is of het gevolg eener plaatselijke zwakte van het orgaan, of der storingen van derzelve organisatie en ligging.

§. 658.

§. 658.

De plaatfelijke zwakte der Baarmoeder kan veroorzaakt worden door menigvuldige betasting der teeldeelen, onmatig en te vroeg uitgeoefenden bijflaap, eenen hevigen flag op den buik, en aanhoudende drukking van denzelfven door naauwe kleedren, te fterk rijden, veel zitten, bijzonder bij het borduren met een voorovergebogen ligchaam, den val van eene zekere hoogte op de billen, menigvuldige verkoudingen, die onmiddellijk op den buik en de teeldeelen werken, te fterke maanftonden, voorafgegane menigvuldige bloedvloeiingen in de zwangerheid en geboorte, te fterke en te langdurige kraamvloeden, menigvuldige, bijzonder zware en te fchielijk op elkander volgende verlosfingen, witten vloed, waterzucht der Baarmoeder en derzelve voorafgegane ontfteking, warme dampbaden, of het gebruik van ftoven, de drukking van een moederfteunfel, e. d. g. meer.

§. 659.

Plaatfelijke gebreken, die uit ftoringen der organisatie en ligging der Baarmoeder voortvloei-
 jen, kunnen zijn: verfcheuring van de vaten der Baarmoeder of van derzelve monden, ten gevolge van kwetsuren, welke bij de verlosfing door de hand of instrumenten, bijzonder door eene geweld-
 dadige ruwe afhaling der nageboorte, van een ei, eener mola of van eene andere misvorming in de Baarmoeder toegebracht zijn; grootere of kleinere vleeschklompen of mola in den Uterus na miskramen

of ontijdige verlosfingen (*); veretteringen en zweeren aan de eene of andere plaats van derzelver binnenfte wanden; variceufe uitzettingen der vaten, scirrheufe verhardingen, uitwasfen, polypen, scirrhus en kanker der Baarmoeder, uitzakking, achteren voorwaartsbuiging, keering of verouderde omkanteling der Baarmoeder, enz.

§. 660.

De Bloedvloeijing der Baarmoeder ontftaat ook fomtijds bij zeker lijden in verwijderde of naastgelegene organen. Zoo kan dezelve tot buitengewone en ziekelijke uitzettingen en verhardingen der organen van den onderbuik, als een gevolg van drukking en van den beletten omloop, aanbeijen, verftoppingen en beletten omloop van bloed in den onderbuik, in de lever, galuiftortingen en fcherpe onreinigheden, kwade fpijsvertering, wormen, verzameling van drekftof in den endeldarm, kolijkpijnen, e. d. g., aanleiding geven.

Voorzegging.

§. 661.

Over het algemeen is elke Bloedvloeijing der Baarmoeder wel nadeelig, en moet deels om de oorza-

(*) WIGAND, over eene zeer bijzondere, dikwijls zeer hardnekkige Bloedvloeijing der Baarmoeder, welke na vele miskramen en ontijdige verlosfingen pleegt te ontftaan. In HUFELAND'S *Journal der praktifchen Heilkunde*, van de maand Julij 1816, bl. 16.

zaken, deels om de gevolgen derzelve niet te gering geacht en beoordeeld worden. Dezelve behoort tot die ziektevormen, welke dikwijls wederkeeren, en tot belangrijke, organische, dikwerf ongeneeslijke ziekten der Baarmoeder aanleiding geven. Nogtans zijn niet alle Bloedvloeijingen der Baarmoeder even gevaarlijk, en de graad van het gevaar hangt van zekere omstandigheden af. — Hoe sterker, volbloediger en prikkelbaarder het gestel der lijderes is, des te geringer is het gevaar, dat echter nog ernstiger wordt, hoe zwakker en aandoenlijker het gestel, en hoe grooter de zwakte is, welke reeds door het bloedverlies werd voortgebracht. — Gunstig is de voorzegging, zoo de aard der Metrorrhagie eene Synocha (§. 656) is; de vloeijing ontstaat dan door eene bloedafzondering en kan somwijlen zelfs, bij voorbeeld in de Metritis, kritisch worden; niet bijzonder ongunstig is het, als de bloeding met het karakter van Erethismus gepaard gaat, en insgelijks door eene bloedafzondering gevormd wordt. De bloeding is matig, en leidt niet tot uitputting (*Depletion*), maar laat echter de geneigdheid tot wederinstorting, welke in het vervolg niet meer als eene bloedafzondering, maar als eene doorzijpering (*Anastomosis*) zich voordoet, na. — Ook hier is, gelijk bij alle bloedingen, het Erethismus met doorzijpering gevaarlijker; het bloedverlies is sneller en grooter, gaat meestal met een' belangrijken krampachtigen toestand gepaard, waardoor de bloeding onderhouden wordt; de Bloedvloeijing komt dikwijls weder, gewigtige naziekten, uitterende koorts, waterzucht en werktuigelijke gebreken der Baarmoeder

ten gevolge hebbende. — Schadelijkheden, welker uitwerksfel spoedig voorbijgaat, veroorzaken flechts dán eene aanhoudende Bloedvloeijing der Baarmoeder, wanneer het bloedverlies zelfs als eene nieuwe oorzaak werkt. Aanhoudende nadeelige invloeden, en de zoodanigen, welke de gezamenlijke voeding tevens storen en vernietigen, doen eene hardnekkige, en wanneer de aanleg daartoe eenmaal ontwikkeld is, eene dikwijls wederkeerende en naauwelijks geneeslijke kwaal ontstaan. — Hoe langer de Bloedvloeijing aanhoudt, en hoe moeilijker de oorzaak verwijderd kan worden, des te ongunstiger is de voorzegging. — Eene Bloedvloeijing, welke uit eene algemeene zwakte ontstaat, is niet zoo erg als die, welke aan plaatselijke gebreken als oorzaken toegeschreven wordt. Bloedvloeijingen, bij welke men tevens middelen om dezelve te stelpen onmiddellijk aan de Baarmoeder brengen kan, zijn gemakkelijker tegen te gaan; dit geldt voornamelijk van verwondingen der Baarmoeder. — De inwendige bloedstorting is gevaarlijker, dan de zichtbare Bloedvloeijing, wijl die zoo ligt miskend, en de hulp zeer dikwijls te laat toegebracht wordt; minder gevaarlijk echter dan de uitwendig zichtbare is dezelve hierom, wijl de zamentrekkende werkzaamheid der Baarmoeder niet volkomen verlamd is, en men dus hopen mag, om het werkingsvermogen ook in die deelen, in welke hetzelfde bepaald te voorschijn komt, ligt weder op te wekken. Deze hoop wordt wel niet in elk geval vervuld, en de prikkel van het meer en meer uitzettend bloed, alsmede de zwaarigheid om onmiddellijk aan de lijdende plaats geneesmiddelen toe te bren-

brengen, leveren dan de oorzaken tot gewigtige en aan deze foort van kwaal eigene gevaren op. — De Metrorrhagie als eene zuivere dynamifche ziekte der bloedende vaten is minder gevaarlijk, dan eene plaatselijke, met gewigtige verwonding of ftoring van de organifatie der Baarmoeder, met zweren, scirrhus en kanker, welke meestal ongeneeslijk en doodelijk is. — Rood flagaderbloed, in menigte en ftroomsgewijs met den polsaderflag ontlast, doet het uiterfte doodsgevaar voorzien; niet minder treurig is de voorzegging bij zoodanig eenen vloed, die het gevolg eener aan verlamming grenzende zwakte der Baarmoeder is. Deze dooft of fpoedig door veel bloedverlies en uitputting, of geeft toch aanleiding tot die gevaarlijke naziekten, welke door de verlamme Bloedvloeijing doorgaans veroorzaakt worden. De verlamme Metrorrhagie, zoo dezelve fymptomatifch is, een chronifch beloop volgende, gelijk in de fcheurbuik, de Haemorrhœa petechialis, dan blijft zij wel altijd een gevaarlijk verfchijnsel; doch de voorzegging is niet zoo ongunftig, als wanneer die plotselijk en met geweld, bij voorbeeld onmiddellijk na de verlosfing of ook in de putrida, verfchijnt. — Vrouwen van middelbare jaren ftaan de Metrorrhagie met minder nadeel door, dan jeugdige en bejaarde perfonen, bijzonder wanneer dezelve zich in die jaren voordoet, dat de maanftonden reeds moesten opgehouden zijn; meestal is dezelve ongeneeslijk, doet plaatselijke gebreken vermoeden, of wordt door tering en waterzucht gevolgd. — Plotselijke Metrorrhagiën zijn gevaarlijker dan die, welke langzaam en allengskens ontftaan. Gene geven aanlei-

ding tot verbloeding; bij de laatstgenoemde daarentegen kunnen de zieken van tijd tot tijd eene verbaazende menigte bloeds verliezen. — Van eene ergere beteekenis is het, wanneer stuiptrekkingen, kramp-pijnen, sterke prikkelbaarheid van het zenuwgestel, of, aan den anderen kant, een soporeuse toestand, flauwten, koude extremiteiten, eindelijk de gezamenlijke teekenen van uitputting, met de Bloedvloeijing der Baarmoeder vergezeld gaan. —

Geneeswijze.

§. 662.

Er zijn vier middelen, zonder welke men bij geene Bloedvloeijing der Baarmoeder het doel ter stelping van dezelve bereikt: 1) de rust van het ligchaam en van de ziel, 2) de horizontale ligging, 3) de verwijdering van elke drukking op het ligchaam, 4) een koele leefregel. Deze middelen zijn zoo belangrijk en zoo werkzaam, dat, indien al ook de bloedvloeijing daardoor alleen niet altijd volkomen gestild, dezelve toch zeer gematigd wordt.

§. 663.

De behandeling der Bloedvloeijing zelve rigt zich, zoo veel mogelijk, naar de oorzaak, welke dezelve heeft voortgebracht; en om dezelve in deze betrekking juist te beoordeelen, moet men in de meeste gevallen nimmer het onderflaan verzuimen, of geene Zwangerheid en eene op handen zijnde miskraam, of plaatselijke gebreken der Baarmoeder, het naast

tot

tot het ontstaan der Bloedvloeijing aanleiding geven. Dikwijls is het naauwkeurig onderflaan, wegens de menigte van geronnen bloed in de fcheede en vóór den moedermond, niet mogelijk; men moet dit derhalve eerst wegnemen, om gene met nut te kunnen in het werk ftellen. Ondertusfchen, hoe onmiskenaar het nut van een naauwkeurig onderzoek is, en hoe dikwijls hetzelfde reeds tot groot nadeel der zieke uit het oog verloren werd, zoo moet het bij zeer hevige bloedftortingen, en het te duchten levensgevaar, telkens aan de beoordeeling van den Arts overgelaten blijven, of zoowel de plaatselijke daardoor veroorzaakte prikkeling, als, bij zeer eerbare Vrouwen, de noodzakelijk daarmede gepaard gaande gemoedsbeweging het bloedverlies zoude kunnen vermeederen.

§. 664.

Als de Bloedvloeijing het gevolg der bij §. 655 bijgebragte algemeene zwakte of door verlamming veroorzaakt is, aanhoudend duurt, de zieke zeer verzwakt, koud, onmagtig en aan den rand van het graf is, dan moet men dezelve dringend tegengaan. Men wende middelen aan, die de zoo zeer gezonkene prikkelbaarheid deels in het zenuwgeftel, deels in de reproductie, fpoedig opwekken; kan de zieke nog geene geneesmiddelen innemen, dan trachte men het gansche ligchaam te verwarmen, door aanwending van warme doeken, waarmede het geheele ligchaam, bijzonder de borst en de extremiteiten, bedekt en gewreven worden. Deze zijn nog werkzaam,

mer, als men dezelve met doordringende, vlugtig prikkelende middelen, die men tevens ook onder den neus houdt, besprengt; hiermede vereenige men klisteren van aromatische aftreksels, bij voorbeeld van kamillen of valeriaan met wijn, wijngeest of liq. Hoffm., legt omslagen uit een aftreksel van aromatische kruiden, met wijn of wijngeest, op den onderbuik en de teeldeelen, en, als men het kan aanwenden, inspuitingen daarvan door de scheede in de Baarmoeder, zet blinde koppen op den onderbuik en den binnenkant der dije, en zoodra de zieke slikken kan, reike men haar wat melisfenthee met vitriool-ether, warmen wijn, de liq. of balsm. vit. Hoffm., de naphthen, de tinct. valerian., serpentar., Angelicae, de etherische olie in naphtha opgelost, toe; van een allerbijzonderst nut echter zijn de phosphorzuren, een mengsel uit zwavelzuur en opium, de kaneeltinktuur met naphtha; en bijaldien deze middelen, wegens eene neiging tot hoesten, niet verdragen worden, en dit veroorzaken, dan vereenige men dezelve ook zeer doelmatig met de tinctur. opii. Zoodra de zieke meer bekomen is, reike men de kaneeltinktuur, met het heulsap en een aromatisch aftreksel toe, lave de zieke met vleeschnat, meer of min met dojer van eijeren en met eene of andere specerij, late dezelve naderhand rijst, sago en gepelde garstmelk, en tot drank een weinig, vooral goeden rooden, wijn met water, of een krachtig wél uitgist bier gebruiken; bij hevigen dorst echter, en bijzonder bij eene nablijvende brandende gewaarwording in de keel,

Hal-

Haller's of Mynsicht's zuur elixir., met water of een aftreksel van zoethoutwortel vermengd, drinken. — Wanneer de bloeding meer een langzaam beloop en eenen chronischen aard aanneemt, dan worden de aluin in poeder van vijf tot tien greinen met suiker en kaneel, deszelfs oplossing van 3j op $\frac{3}{4}$ vi aromatisch water met eene siroop of wei van aluin, de looistofhoudende middelen, de kina in een geconcentreerd afkooksel, de afkookfels van den cort. simarub., angustur., van het lign. campechens. en het zwavelzuur-ijzer aangewezen, waarmede men zeer doelmatig de kaneeltinktuur, de liquor. a. m. H. e. d. g. vereenigt.

§. 665.

Als de Bloedvloeijing zeer sterk, en het gevolg eener kramp met algemeene zwakte van het ligchaam is, dan wordt derzelver ontstaan reeds door den aanleg, door een teeder tot hysterie en zwakte der gevoeligheid geneigd ligchaamsgestel, en door de invloeden, welke eene bijzondere nadere rigting op de Baarmoeder hadden, veroorzaakt. Alle invloeden van den geest, die met voorstellingen, welke slechts eenigermate tot het geslacht betrekking hebben, gepaard gaan, oefenen derzelver werking, zonder dat de zieke iets daarvan gewaar wordt, met eene ongeloofelijke snelheid op de geslachtssferen en bijzonder op de verrigtingen der Baarmoeder, weshalve men aan dezelve deze aangewezen rigting bijzonder toerekenen mag. Ook de algemeene ligchamelijke invloeden waren van dien aard, dat zij, door storing
van

van den bloedomloop in den onderbuik en eene ongewone prikkeling der zenuwen, eene ziekelijke afzondering van bloed in den Uterus te weeg bragten. De bloeding gaat vergezeld met slapeloosheid en akelige droomen, hysterische kramppijnen van allerlei aard, kramp in de blaas, bleeke pis, kleinen, ongelijken, zamengesrokken' pols, koude, drooge huid en koude extremiteiten; de vloeijing volgt nu eens in kleinere, dan wederom bij grootere tusschenpoozen, telkens voorafgegaan door eene knijping in den onderbuik, met eene opwelling en groote aandoenlijkheid van den buik, waarop eene weeënaardige trekking in het kruis en in de schaamstreek volgt, en onder zoodanigen aandrang wordt het bloed in eene vloeibare gedaante en in klonten tevens ontlast. Daarop heeft er eene korte verpoozing plaats, gedurende welke de spanning en de pijn in den onderbuik ophouden en geen bloed afloopt, offchoon toch eene inwendige trekking met eene brandende gewaarwording in de schaamstreek aanhoudt en met eene algemeene kwalijkbevinding gepaard gaat. Het duurt niet lang, of de kramp treedt weêr naar buiten en de vermelde toevallen hebben alsdan op nieuw plaats. In dit geval wordt geheel bijzonder aangeprezen de ipecacuanha in kleine giften van een kwart tot een half grein met een aromatiek bijvoegfel of het Dowers poeder, het infus. en de tinct. valerian., de essentia castorei, de liquor C. C. succinatus, met het opium, het vlugge ammoniak, bij voorbeeld een theelepel vol salmiakgeest met eenen eetlepel water, de tinctura ambrae et moschi,

matig warme stovingen uit een aftreksel van kamillen op den onderbuik, antispasmodische klisteren en inspuitingen, bijzonder met opium (*).

§. 666.

Er zijn nog andere middelen, welke tegen de Bloedvloeijing der Baarmoeder aanbevolen worden, namelijk: de aluin, de terra en tinctura catechu, de radix ratanhiaë (†), de lapis haematides, het keukenzout, de braakwijnsteen in kleine giften, het houtskoolpoeder, de loodsuiker, de casia lignea, het secale cornutum (§) e. d. g. meer. Als de Bloedvloeijing zeer sterk is en spoedig moet gestild worden, dan zullen deze middelen derzelver doel niet bereiken, en bij chronische, dikwijls wederkeerende Bloedvloeijingen werken de meeste derzelve onzeker, of zelfs de aanwending daarvan, als van den aluin, van de loodsuiker enz., is zelfs met menig gevaar en nadeel voor de gezondheid vergezeld; ook moet men niet uit het oog verliezen, dat de werking van sommige moeilijk of volstrekt niet blijkt, of dat die middelen, als men dezelve roemde, ge-

(*) PET. COPLAND'S *Erzählung verschiedener Fälle von Mutterblutflüssen, bei welchen Klystiere von Opium sich nützlich erzeugten*. In *Annalen der A. Mit. L.* 16. St. N°. 8.

(†) HIPPOLIT RUIZ, *über die Ratanhia-Wurzel, ihr Wachsthum, und ihre arzneylische Kräfte*. In *neue Sammlung auserlesener Abhandlungen zum Gebrauche prakt. Aerzte*. II. Bd. 3e. St. Leipz. 1817.

(§) Door Dr. PRESCOT aanbevolen. Zie *Salzb. medic. chir. Zeitung*. Jahrg. 1819. II. Bd. N°. 43. S. 302.

gewoonlijk ook vereenigd werden met andere, welke eene veelvermogender eigenschap bezitten, dan als bloedstillende middelen te werken. De radix ratanhia kan den kaneelbast en terra catechu vervangen, en wordt ook slechts bij chronische Bloedvloeijingen der Baarmoeder aangewezen, in geval de kaneelbast te verhittend werkte. Als men de Bloedvloeijing, welke een gevolg der algemeene zwakte is, volkomen gestild heeft, dan moet men niet alleen derzelve wederkeering voorkomen, maar ook derzelve nadeelige gevolgen uit den weg ruimen. Het is derhalve noodzakelijk, dat de oorzaken (§. 655), waardoor deze zwakte voortgebracht wordt, niet alleen slechts vermijd worden, maar dat men ook het ligchaam doelmatig trachte te voeden en te versterken, door zoodanigen diët en zulke geneesmiddelen, die de prikkelbaarheid in de reproductie verhoogen. De middelen §. 306 worden hier ook aangewezen; alleenlijk moet men met voorzigtigheid in acht nemen, dat de diët, zoowel als het geneesmiddel en deszelfs giften, telkens naar den graad der zwakte, van het gestel der zieke, der idiosynkrasie, der geneigdheid, welke de Bloedvloeijing is voorafgegaan, en der menigte van het bloedverlies bepaald worden, en dat men na eene te groote ontlasting van bloed, bijzonder in den beginne, geene te prikkelende en verhittende geneesmiddelen, spijsen en dranken voorschrijve, die dan gemakkelijk, als gevolgen der te zeer vermeerderde bloedbereiding, en der daardoor te schielijk verhoogde prikkelbaarheid in het vaatstelsel, tot eenen aandrang naar de Baarmoeder

moeder en op nieuw tot eene Bloedvloeijing aanleiding geven.

§. 667.

Als de Bloedvloeijing een gevolg der verhoogde prikkelbaarheid in het vaatstelsel of van een Erethismus is; de daarmede vergezellende koorts het karakter der Synocha heeft; de zieke van een volbloedig, sterk, prikkelbaar ligchaamsgestel is, door invloeden, gelijk aan die, welke §. 648 bijgebracht werden, voorafgegaan wordt; de zieke tevens hevige pijnen in de schaamstreek gevoelt; deze bij de aanraking hard en pijnlijk is; de pols vol en hard slaat; de koorts met ontsteking gepaard gaat, de hette en dorst hevig is; het bloedverlies nog gering was of het bloed nog bij tuschenpoozingen, met afwisselende hevigheid, vloeit; dan is eene algemeene aderlating aan den arm dringend aangewezen, welke in dit geval dikwijls zoo weldadig werkt, dat met de, door de kunst bewerkte, ontlasting in eene genoegzame hoeveelheid, de Bloedvloeijing der Baarmoeder ophoudt. Dezelve wordt insgelijks dan aangewezen, als ten tijde van het ophouden der stonden, of nog na dezelve, de bloeding, door voor de met Synocha gepaard gaande Metrorrhagie genoemde schadelijke invloeden (§. 656), bij sterke en welgevoede personen veroorzaakt wordt. Ja zelfs in zulke gevallen, waar de hypersthenische toestand geenszins duidelijk kenbaar is, wordt de bloedontlasting als een afleidend middel (*Revulsorium*) door ervaren Geneesheeren aanbevolen; intuschen vereischt derzelve aanwending groote voorzigtigheid, naardien de

de regte maat der bloedontlasting moeilijk te treffen is (in zoo ver geringe bloedontlastingen van der geene beduidende uitwerking zijn, rijkelijke daarentegen ligtelijk het karakter van het Erethismus en doorzijpering kunnen toebrengen). Plaatfelijke middelen, om de Bloedvloeijing te stillen, aan te wenden, zouden in het genoemde geval niet alleen geheel overbodig, maar ook hoogst schadelijk zijn; de daardoor bewerkte contractie der slagadervaten zoude juist eerst de ontsteking der Baarmoeder volkomen ontwikkelen, welke dikwijls, tot geluk der zieke, door de ontstane Bloedvloeijing voorgekomen werd. In dit opzigt kan somtijds de Bloedvloeijing zelfs een weldadig verschijnsel worden; en de ondervinding leert, dat die van zelve ophield, zoodra door de ontlasting van bloed de daardoor te weeg gebragte koorts in het vaatstelsel gematigd werd. Zeer doelmatig echter schrijft men der zieke antiphlogistische middelen, bijzonder het nitrum, de crem. tart. en verdunnende koeldranken voor, waartoe zich de plantenzuren, het citroen-, het wijnsteen- en het azijnzuur in dit geval bijzonder aanprijzen, welke men ook met zachte zuurachtige ontlastmiddelen uit de pulp. tamarind., cassiae, de cremor. tart., sal. Seign. e. d. g. vereenigt. Heeft echter de zieke reeds eene groote menigte bloeds verloren, is haar pols niet meer vol en hard, en haar toestand nabij dien van zwakte, van eene in een' minderen graad gezonkene prikkelbaarheid van het vaatstelsel of van het Erethismus, dan is er geen middel werkzamer dan Haller's zuur elixir. Men neme zich in acht, van andere te prikkelende,

bij-

bijzonder vlugtig prikkelende middelen, welke de Bloedvloeijing zeer ligt weder op nieuw doen ontstaan, aan te wenden; deze kunnen slechts dan weder aangewezen worden, wanneer, ten gevolge van het zware bloedverlies, de zieke tot den hoogsten graad van zwakte vervallen ware. Bij eene zeer verhoogde prikkelbaarheid van het vaatstelsel wordt de digitalis purpurea, in een aftreksel of tinktuur, afwisselend met de zuren toegediend, alsmede het opium, bijzonder wanneer hysterische kramppijnen daarmede vergezeld gaan, zeer aangeprezen. Evenwel moet ook de zieke, na de volkomene stilling der Bloedvloeijing, een doelmatig diët in acht nemen; zij moet eene al te sterke prikkeling op de prikkelbare en reproductieve sferen vermijden, bijzonder te verhittende spijsen en dranken, en hetgeen bij §. 656 als schadelijke invloeden is opgenoemd geworden; haar voedsel moet meer uit het plantenrijk bestaan, de drank oplosfend, verdunnend, en de dampkring matig, meer vochtig dan droog zijn.

§. 668.

Bijaldien de Bloedvloeijing der Baarmoeder aan eene aanmerkelijke plaatselijke zwakte, door de invloeden §. 658 veroorzaakt, toegeschreven wordt, dan vereischt deels de algemeene toestand der zieke, deels de plaatselijke van het orgaan, bijzondere opmerkzaamheid. Bij gene kan zelfs alleenlijk zwakte zich voordoen, of is nabij aan die, welke §. 656 is bijgebracht geworden: de plaatselijke zwakte maakt in beide gevallen, wat de algemeene behandeling betreft, volstrekt geen onderscheid;

maar de plaatselijke behandeling der Bloedvloeijing zal in het geval, §. 655, eene verandering vereischen; hier wordt dringend aangewezen, om de Bloedvloeijing, door bevordering van de contractie der vaten, tegen te gaan.

§. 669.

Maar bij de Bloedvloeijing, die bijzonder een gevolg van de plaatselijke zwakte der Baarmoeder is, moet men de verschillende toestanden der Baarmoeder zelve onderscheiden. Het orgaan kan met deszelfs vaten geheel atonisch, en de prikkelbaarheid in hetzelfde zoo zeer verminderd zijn, dat deszelfs toestand aan verlamming grenst; in dit geval worden aanbevolen: de bedekking van den onderbuik met eenen warmen doek of flanel; het wrijven, voorondersteld, dat de onbezwangerde Baarmoeder zoo zeer boven de schaamstreek uitpuilt, dat men dezelve voelen kan; de warme stovingen met azijn en aromatische kruiden; het besprengen van warme doeken met vlugtig prikkelende geneesmiddelen; of de inwrijvingen met wijngeest, salmiak of kamfergeest, met vitriooléther, het zoogenaamde Eau de Cologne, e. d. g.; ook, wanneer de moedermond genoegzaam geopend is, inspuitingen met azijn en aromatische aftreksels met of zonder wijngeest in de Baarmoeder, en zelfs klisteren daarvan. Doch bij de aanwending der eerstgenoemden, zorge men, dat het geronnen bloed, hetwelk zich voor den moedermond geplaatst heeft, weggenomen, alsmede dat de injectiespuit, van eenen gepastten vorm, diep genoeg ingebracht worde; somtijds

wordt

wordt zelfs de Baarmoeder reeds bij de aanraking met de vingers tot contractie gebragt, en zoo de moedermond genoegzaam verwijld is, dan kan men ook een tampon, uit eene spons vervaardigd, en in wijngeest gedoopt, inbrengen.

§. 670.

Intusschen doen al die middelen (§. 669) niet altijd de gewenschte uitwerking, en de Bloedvloeijing duurt, met het grootste levensgevaar, gestadig voort. De koude is het éénigste middel, hetwelk nog eene contractie der baarmoedervaten kan te weeg brengen, en reeds zoo menige zieke uit eenen zoo wanhopigen toestand redde. Er is een tijd geweest, dat men dit middel bij Bloedvloeijingen geheel veronachtzaamde, en, uit hoofde van deszelfs verzwakkende werking, als schadelijk veroordeelde. Hoe partijdig en onverklaarbaar de beschouwing zij, om de uitwerking der koude op zwakteoorzaak toe te passen, zoo min laat zich derzelve voortreffelijke uitwerking bij den schijndood, bij zekere ontstekingen en gezwellen, die door kwetsuren ontstaan, bij zekere soorten van bekleemde breuken, bij den météorismus en Bloedvloeijingen loochenen; hetzij dezelve door prikkeling der vaten tot contractie, door de onttrekking der overvloedige warmtestof, of door bevordering der stolling van het bloed de vloeijing daarvan stopt. In alle gevallen moet door dezelve wel de, bij eenen zoo hoogen graad van verlamming der Baarmoeder, zoo zeer verminderde prikkelbaarheid der vaten weder opgebeurd en tot contractie gebragt worden; want an-

ders ware het niet wel verklaarbaar, hoe de Bloedvloeijing zoude ophouden.

§. 671.

Men wendt de koude gewoonlijk als stoving op den onderbuik aan, als inspuiting in de Baarmoeder, of met een tampon, welke men, zoo daartoe mogelijkheid is, in de Baarmoeder brengt, aanvankelijk in eenen minderen, en des noods in eenen sterkeren graad. Als de Bloedvloeijing ophoudt, vermindert men weder den graad van koude, droogt de zieke zorgvuldig en met de meeste voorzigtigheid af, en legt dan enkel drooge, matig warme doeken aan, welke in den beginne met een geestrijk, vlugtig prikkelend middel natgemaakt worden. Naderhand kan men ook weder van warme aromatische stovingen, van eenen met aromatische kruiden gevulden zak, die in warmen wijn gedoopt en wel uitgedrukt wordt, en van geestrijke inwrijvingen op den onderbuik, in den omtrek van het kruis en in de liezen gebruik maken.

§. 672.

Een andere toestand van plaatselijke zwakte der Baarmoeder is die, bij welke derzelver gevoeligheid zeer bijzonder verhoogd is. De zieke heeft meestal een bij uitstek gevoelig ligchaamsgestel; de buik is opgezet en pijnlijk; de Bloedvloeijing heeft meer, nu eens bij kleinere, dan wederom bij grootere tusschenpoozen, plaats; wordt door knijpingen in het lijf voorafgegaan, en is met hevige, krampachtige pijnen, of liever met eene weeënaardige trekking in
het

het kruis en in de schaamstreek vergezeld. In dit geval doen bijzonder stovingen uit een aftreksel van kamillen, dergelijke inspuitingen en klisteren, met tinktuur van opium, inwrijvingen met salmiakgeest, of vlugtige smeersels, voortreffelijke diensten, waarmede men, bijzonder bij eenen voortgelijken algemeen toestand, inwendig de ipecacuanha in kleine giften, de liquor C. C. succinatus met opium en kamillenthee vereenigt, zoo als de aanwijzing van deze middelen §. 665 nader is bepaald geworden.

§. 673.

Behalve de in §. 669—672 genoemde uitwendige middelen, die meer tot de zoogenaamde stoppende geteld worden, zijn ook de afleidende van veel nut. Hiertoe behooren: de drooge koppen, van twee tot vier stuks op elke borst gezet, die als tegenwerkend (*antagonistische*) prikkelmiddel bij de Metrorrhagie door Erethismus bijzonder aanbevolen worden; op gelijke wijze werken de mostaardpap of Spaansche vliegpleister, afwisselend tuschen en onder de borsten gelegd, de warme armbaden en het gelijktijdig indompelen der voeten in koud water, of het omwikkelen derzelve met doeken, die in het koudste water gedoopt zijn. Nogtans schijnt de uitslag niet altijd zeker te wezen, daar bij deze methode ook wel Congestiën naar den Uterus begunstigd en sterkere bloedingen kunnen te weeg gebracht worden. Hetzelfde kan van de in Engeland gebruikelijke blikken Laars (*) bij de minste aanwen-

(*) Men zie HUFELAND's *Journal der practischen Heilkunde*, Jahrg. 1819 M. May 3 St. S. 103.

wending in de Bloedvloeijing der Baarmoeder te duchten zijn, die gelijk een groote kop werkt.

§. 674.

Ten einde de Bloedvloeijing niet weder instorte, zoo is het eene der eerste voorwaarden, dat ook de schadelijkheden, (§. 658), welke tot de plaatselijke zwakte der Baarmoeder aanleiding gegeven hebben, verwijderd en vermijd worden.

§. 675.

De Bloedvloeijing der Baarmoeder door plaatselijke gebreken, welke aan floringen van derzelver bewerktuiging en ligging toegeschreven worden (§. 659), veroorzaakt zijnde, dan moeten deze vooral uit den weg geruimd worden; weshalve die een naauwkeurig onderzoek vereischen. De meeste dezer plaatselijke gebreken zullen in bijzondere hoofdstukken behandeld worden; zoodat men die hier kan voorbijgaan. — Zijn er grootere of kleinere vleeschklompen of molen in den Uterus aanwezig, die na mis- of ontijdige geboorten de Bloedvloeijing gaande houden, dan is de gewone, enkel dynamische methode dikwijls niet altijd toereikend, om het vreemde ligchaam te verwijderen, en de verlorene krachten, het gevolg van een aanhoudend bloedverlies, te vergoeden. WIGAND (*) prijst het tijdig inbrengen van eenen uit zwam, linnen, plukfel of vlas bereide tampon in de scheede aan, waardoor niet alleen de Bloedvloeijing gestild, maar ook de vast-

zit-

(*) t. a. pl. bl. 30.

zittende vleeschklomp, door middel van eene bewerkte ontsteking, tot ettering gebragt, de moedermond verzacht, verslapt, en daardoor tot een gemakkelijk doorlaten van het vreemde ligchaam op eene geschikte wijze voorbereid, en de baarmoedermond tot contractie geprikkeld wordt. De tampons worden in zeer eenvoudige slijmerige afkookfels van havergort, althéa - wortel e. d. g. gedoopt, en slechts dán, wanneer de vleeschklompen of vreemde lichamen ontlast zijn, en de nu nog aanhoudende Bloedvloeijing het gevolg van eene zwakte der Baarmoeder schijnt te wezen, laat men de tampons met zamentrekkende middelen natmaken, of daarmede inspuitingen in de scheede doen. Voor het overige moeten de tampons niet langer, dan om de twaalf uren weggenomen, en tegen versche, goed uitgewaschene verwisseld worden. Onder weeënaardige pijnen schiet het vreemde ligchaam alleen af, of wanneer het zeer groot is, onder eene zachte medewerking van den Vroedmeester, door middel van een daartoe dienstig Tangetje (*pince aux faux germes*) of d. g. Dikwijls houdt alsdan de Bloedvloeijing dadelijk op; somtijds echter duurt dezelve ook nog wel eenige dagen voort, en volgt dan gedurende dien tijd het beloop van gewonen kraamvloed, zoodat de kunst hier verder niets te doen heeft. Bijaldien er evenwel nog gedurende eenige dagen zuiver en helder bloed ontlast wordt, dan geven men inwendig kina, kaneel en soortgelijke middelen en late uitwendig eenige zacht zamentrekkende inspuitingen in de Baarmoeder doen.

§. 676.

De Bloedvloeijing door oorzaken §. 660 ontstaan zijnde, dan moeten deze insgelijks verwijderd worden. Zoo kan een braakmiddel aangewezen zijn, wanneer de Bloedvloeijing na galuustortingen, overladingen der maag, en na het gebruik van andere schadelijke voedsels ontstaat. Aanhoudende verstoppingen van den stoelgang kunnen zacht ontlastende klisteren, en de aanwezigheid van wormen wormmiddelen vereischen, om de Bloedvloeijing der Baarmoeder te matigen; waarbij echter, ter voorkoming van wederinstorting, altijd de gewigtigste aanwijzing blijft, om der zieke zulke voorschriften te geven, die het wederontstaan dezer storingen tegengaan. Zoo zoude alles vruchteloos zijn, wanneer de zieke, die met aanhoudende verstoppingen gekweld werd, steeds eene zittende leefwijze hield, en zich aan het genot van zwaar verteerbare spijsen onbezorgd overgaf.

L I T T E R A T U U R.

§. 677.

J. ADR. HELVETIUS, *traité des pertes de sang avec leur remède spécifique, accompagné d'une lettre sur la nature et la guérison du cancer. Par.* 1697. 12°. deux éd. 1706. 12°.

KNEUSSEL, *de haemorrhagia uteri matronae abortientis. Giess.* 1698. 8°.

P. T. SCHACHER, *de haemorrhagiis gravidarum. Lips.* 1717.
In HALLERI *disp. chir. Tom. IV. N°.* 136.

- GEORG. WOLFFG. WEDEL, *de foemina duodecim annos pro-
fluvio sanguinis laborante. Jen. 1719. 4º.*
- FISSCHER, *de menorrhagia. Erford. 1727. 4º.*
- FR. HOFFMANN, *de haemorrhagia uteri. Hal. 1730.*
- BRUNNER, *de partu praeternaturali ob situm placentae su-
per orificium uteri internum. Argent. 1730. 4º.*
- FRIDERICI, *de uterina gravidarum haemorrhagia, ib.
1732. 4º.*
- WEIGAND, *de fluxu sanguinis in gravidis. Altd. 1736. 4º.*
- CHOMEL, *ergo praegnanti, superveniente uteri haemorrha-
giâ, partus manu promovendus. Par. 1743. 4º.*
- RULLMANN, *de praeternaturali ac difficili ob haemorrha-
giam uteri antecedentem. Giess. 1744.*
- GEBAUER, *de salubritate haemorrhagiae uteri. Erlang.
1746. 4º.*
- C. LINNAEUS, *de haemorrhagia uteri sub statu graviditatis.
Ups. 1749.*
- ERICHSON, *de haemorrhagiâ uteri sub statu graviditatis.
ib. 1750. 4º.*
- THURNEYSSEN, *de causis haemorrhagiarum in gravidis. Bas.
1751. 4º.*
- ANDR. PASTA, *discorso intorno al flusso di sangue dell' utero
delle donne gravide. Bergam. 1752. door den Parijschen
Hoogleeraar J. L. ALIBERT, in het Fransch vertaald,
onder den titel: traité des pertes de sang des femmes
enceintes. Par. an VIII. 2 vol. 8º.*
- STAEHLIN, *de partu cum haemorrhagiâ uteri conjuncto.
Lugd. Bat. 1753. 4º.*
- WESSEL, *de partu cum haemorrhagiâ uteri ob placentam
orificio uteri adhaerentem. Basil. 1753. 4º.*
- J. D'URBANN, *de haemorrhagia uterina. Edinb. 1753. In
HALLERI disp. chir. Tom. IV. Nº. 137.*
- REICHARD, *de haemorrhagia uteri partum insequente.
Argent. 1755. 4º.*

ANN. CAR. LORRY, *quaestio medica, an parturienti, accedente haemorrhagiâ uterinâ, diversâ pro diverso casu encheiresi, promovendus. Par. 1758. 8°.*

GEHLER, *de sanguine in partu profluente. Lips. 1759. 4°.*

C. F. KALTSCHMID, *de haemorrhagiâ post partum nimia. Jen. 1759. 4°.*

Dezelfde, *de partu cum haemorrhagiâ uterinâ conjuncto. ib. 1762. 4°.*

J. W. GULBRANDT, *de sanguifluxu uterino. Hafn. et Lips. 1766. 8°.*

OBERLIN, *de haemorrhagia uteri. Argent. 1767. 4°.*

SPENCE, *de sanguinis ex utero gravidarum et parturientium profluviis. Edinb. 1767. 4°.*

SCHROEDER, *de haemorrhagia uteri. Goett. 1771. Vid. Opusc. I. p. 280—318.*

NICOLAI, *de curatione nimiae in puerperis haemorrhagiae ex utero. Jen. 1773.*

G. M. SAXTORPH, *de sanguifluxu uterino. Hafn. 1774.*

RIGBY, *essay on the uterine haemorrhagies. Lond. 1775.*

HOPFF, *de haemorrhagia uteri. 1775.*

GULBRAND, *de sanguifluxu uterino. Lips. 1776. In WEIZ N. Ausz. XI. p. 6.*

LE ROUX, *observations sur les pertes de sang des femmes en couches, et sur le moyen de les guérir. Dyon. 1776. 8°.*
deux ed. 1810. 8°.

AASKOW, *de usu opii in haemorrhagiis gravidarum. 1777.*
In Act. Societ. med. Hafn. Tom. III.

STUVE, *de haemorrhagiâ uteri. Goett. 1780.*

DALY, *de menorrhagia. 1781.*

BEIJER, *de uteri haemorrhagiis. Argent. 1782.*

SAIJERS, *de menorrhagiâ. Edinb. 1782.*

J. A. WENDRINGSKY, *de haemorrhagiis uteri. Vienn. 1784.*
In EIJEREL diss. Vindob. vol. IV. N°. 10.

SAHL, *de uteri haemorrhagia. Ingolst. 1785.*

PUTTMANN, *de usu aquae frigidae in haemorrhagiis uteri.*
Argent. 1785. 4°.

DENMAN, *essay on uterine haemorrhagies, depending on
praegnancy and parturition.* Lond. 1786. 8°.

RAPH. BENEV. SABATIER, *theses de uterinis praegnantium
haemorrhagiis.* Par. 1788. 4°.

A. SENFT, *de haemorrhagia uteri.* Wirceb. 1788.

JOH. PETR. FRANK, *de haemorrhagiâ uteri ex spasmò se-
cundinas incarcerente.* Ticin. 1789. 4°.

Dezelfde, *epitome.* Tom. V. pag. 290.

MAX. STOLL, *praelect. in divers. morb. chron. vol. II. Vin-
dobon.* 1789. pag. 104 et 381.

EVANS, *de menorrhagiâ.* Edinb. 1790. 8°.

FEILD, *de menorrhagiâ, ib.* 1790. 8°.

RAUCH, *de haemorrhagiis uteri in genere.* Jen. 1790. 4°.

HENCKE, *de haemorrhagiis uterinis nocivis.* Erford. 1791. 4°.

HURTER, *de sanguifluxu uterino.* Goett. 1793. 4°.

STARKS *Archiv.* IV. B. 730.

CAR. STRACK, *observationes medicinales de una prae caeteris
causa, propter quam sanguis e foeminarum utero nimius
profluit, atque haec quo modo submoveri debeat.* Berol.
1794. pag. 48. 8°.

BUSCH, *de haemorrhagiis uteri.* Marb. 1795. 4°.

ESKUCHEN, *de haemorrhagia uteri. ib.* 1795. 4°.

MILLOT, *sur les pertes de sang des femmes.* Par. an VI. 8°.

WINICKER, *de uteri haemorrhagia gravidarum.* Goett.
1797. 4°.

E. VON SIEBOLD et BILLING, *de menorrhagia s. uteri hae-
morrhagia.* Wirceb. 1799. 4°.

J. N. THOMANN, *über den Gebärmutterblutfluss.* In RÖSCH-
LAUBS *Magazin der Heilk.* V. B. I St.

DÖMLING, *über die Natur und Behandlungsart der asthe-
nischen Blutflüsse.* In HORN'S *Archiv für die medic.
Erfahrung.* III. B. I St.

- A. LEROY'S *Vorlesungen über die Gebärmutterblutflüsse.* Leipz. 1802. S. 216. 8°.
- LENTIN, *über widernaturliche Blutungen aus der Mutter.* In deszelfs *Beyträgen.* III. Th. 2 Abth. N°. 11.
- S. G. VOGEL, *Handbuch der prakt. Arzneywissenschaft.* 5 Th. S. 149—192.
- GRATIAN, *de metrorrhagia.* Franc. ad Viadr. 1802. 4°.
- C. H. VALENTIN, *essai sur les pertes qui précèdent, accompagnent ou suivent l'accouchement.* Par. 1802. 8°.
- DEMANGEON, *de fallaci atque nocuo obturamenti in haemorrhagiis uteri cohibendis usu.* ib. 1804. 4°.
- MEYER, *Systemat. Handbuch zur Heilung der Blutflüsse.* t. a. pl.
- SPANGENBERG, *über die Blutflüsse.* Braunsch. 1803. 8°.
S. 376.
- WERDERMANN, *Etwas von den Mutterblutflüssen.* In MUR-SINNA'S *Journ.* II. B. III. St. N°. 3.
- ED. ROMIEUX, *diss. sur la ménorrhagie.* Par. 1803.
- J. A. E. BILLOT, *essai sur la ménorrhagie.* ib. 1804.
- BRANDT, *de partium genitalium foeminarum haemorrhagiis.* Hal. 1805. 4°.
- HAND, *de metrorrhagia.* Franc. ad Viadr. 1805. 4°.
- AUSSANDON, *diss. sur la ménorrhagie.* Par. 1806. 4°.
- RIMANN, *de haemorrhagiâ uteri post partum lethali.* Erlang. 1807. 4°.
- JOHN BURNS, *practical observations on the uterine haemorrhage.* Lond. 1807. 4°.
- JOSSE, *diss. sur l'efficacité du tampon dans les pertes de sang dépendantes de l'attache du placenta sur l'orifice de la matrice.* Par. 1808. 4°.
- BEZIAN, *diss. sur les pertes utérines qui arrivent durant la grossesse, pendant et immédiatement après l'accouchement.* ib. 1810.

LEO. LABERNADIER, *disf. sur la ménorrhagie active. ib.*
1811. 4°.

N. L. BRISEZ, *diss. sur la ménorrhagie. ib.* 1815.

GOFFIN, *essai sur les hémorrhagies en général, et en particulier sur la ménorrhagie. ib.* 1815.

DUNC. STEWART, *a treatise on uterine haemorrhage.*
Lond. 1816.

J. B. CALARY, *essai sur les pertes utérines hors l'état de*
grossesse. Par. 1817. 4°.



VIERDE HOOFDSTUK.

Over den Witten Vloed.

§. 678.

Door Witten Vloed (*Fluor albus, Leucorrhoea*) verstaat men in het algemeen eenen, op bepaalde tijden of gestadig durenden, slijmvloed uit de scheede.

§. 679.

Hoeveelheid, kleur, gesteldheid, reuk, smaak en nadeelige uitwerking van het ontlaste vocht zijn verschillend.

§. 680.

De hoeveelheid van het ontlaste vocht hangt meestal van het gestel en de leefwijze der zieke, en van den duur, den graad en de oorzaak der kwaal af; vele Vrouwen verliezen weinige droppels daags, andere verscheidene ponden. Met betrekking tot de hoeveelheid, bespeurt men ook bij dag en nacht onderscheid. Sommigen hebben 'snachts en tegen den morgen, als zij stil te bed liggen, en de uitwaseming toegenomen is, den Vloed minder dan bij dag; bij anderen wordt juist het tegenovergestelde waargenomen.

§. 681.

De kleur van het ontlaste vocht is wit, of naar het blaauwe, gele, groene, graauwe of zwarte hellen.

lende. De groenachtige kleur is, volgens gedane waarnemingen, de menigvuldigste, waaruit deels het ondoelmatige blijkt, om dezen Vloed met het voorzetfel: wit, te bestempelen. Wij hebben echter de eenmaal algemeen aangenomene benaming gevolgd.

§. 682.

De gesteldheid is gewoonlijk slijmachtig, en naar eene ligte oplossing van gom gelijkende; somtijds echter is die zeer taai, dik, kleverig, of zeer vloeibaar en waterachtig.

§. 683.

Met betrekking tot den reuk neemt men waar, dat het afgezonderde vocht of geheel geen, of eenen, aan slijmafzonderingen gewonen, reuk heeft; doch menigmaal riekt hetzelfde zeer sterk, vies, ziltig, als bedorvene etter of rottige kaas, en doet een vreemd ligchaam, eenen moederkrans, of eene zweer in de scheede, of eenen polypus, verettering, verharding of kanker der baarmoeder vermoeden. — Van den smaak laat zich weinig zeggen, als dat dezelve, gelijk de kleur en de reuk, ook wel door voortgelijke invloeden kan veranderd worden; hetzelfde zal somtijds volstrekt geen, op een' ander' tijd zeer scherpen, viezen en ziltigen smaak hebben. Reuk, smaak en kleur echter kunnen ook zeer dikwijls door een langer of korter verblijf in de scheede, en door de buitenlucht bepaald worden.

§. 684.

Ten opzigte van derzelve schadelijke uitwerking is het somtijds zeer zacht en goedaardig, en tast

vol-

volstrekt niet aan; somtijds echter is het ook zeer scherp, en dan zoo invretend, dat de naastgelegene vormfels aan derzelver oppervlakte daardoor ontveld en gestoord worden.

§. 685.

De chemische eigenschappen van het ontlaste vocht zijn insgelijks verschillende, en rigten zich naar de jaren der persoon, naar de oorzaak, naar den verschillende zieken toestand, en ook dáárnaar, of de ontstane Witte Vloed zich niet als een gevolg — welligt als crisis — eener andere ziekte voorgedaan hebbe; belangrijk zijn derhalve de proefnemingen, door FOURCROY in het werk gesteld.

§. 686.

De Artsen hebben aan deze ziekte van oudsher zeer verschillende benamingen gegeven, die men in de Schriften van HIPPOCRATES, SYLVIVS, MORGAGNI, LINNAEUS, CHARLETON, ASTRUC, CULLEN, SCHWEDIAUER, HOFFMANN en anderen kan nazien. De meesten zijn niet altijd op den eigenlijken aard, maar op verschijnselen der ziekte, en op de verscheidenheid van derzelver zetel gegrond; en zelfs hierover zijn de Artsen het in lang niet eens kunnen worden; door nauwkeurige ontleding en waarneming echter is bewezen, dat elk vormfel der teeldeelen, hetwelk een slijmvlies bezit, het werktuig (*Substraat*) dezer ziekte zijn kan. Daar nu deze zich niet alleen tot de scheede, maar ook tot de baarmoeder bepaalt, zoo kunnen beiden te gelijk, of de baarmoeder of de scheede alleen, de

de zitplaats der ziekte zijn. Somwijlen is het werktuig alleen het slijmvlies van den pisweg. FRANK gewaagt ook nog van eenen fluor albus tubarii, en de Schrijver heeft waargenomen, dat somtijds enkel de nymphen, bijzonder de nymphae pendulae, of de inwendige zijde der gróote schaamlippen, de zetel der onrègelmatische afzondering geweest zijn. Het zal derhalve niet ongepast wezen, over den ongeregelden slijmvloed der teeldeelen in het algemeen te spreken; den Arts toch moge het overgelaten worden, om in noodzakelijke en mogelijke gevallen den zetel der kwaal nader te onderzoeken, en daarop bij de genezing te letten. Voor het overige kan men niet ontkennen, dat de scheede, ten gevolge van derzelver ligging en maakfel van het slijmvlies, hetwelk door BICHAT zoo voortreffelijk beschreven is, het meest door deze ziekte aangetast wordt.

§. 687.

Met den Witten Vloed zijn gewoonlijk slechts volwasfene Meisjes en Vrouwen behebt; men heeft deze ziekte nogtans ook bij Kinderen in het vroegste tijdperk van hun leven waargenomen. HOFFMANN heeft een Meisje gekend, hetwelk in de eerste dagen na hare geboorte daarmede aangetast was; JACOBI nam denzelven bij een Meisje van twee weken waar; SLEVOGT, MUSITANUS en anderen bij Meisjes van drie, vier en vijf maanden; NEUTER, SENNERTUS, DOLEUS, FERNELIUS, RODERICUS A CASTRO en andere Artfen bij Meisjes van twee en een half, vier, acht, negen en tien jaren, en in het *Kopenhagener Journal*, 1e. deel, aanm. 93, bladz. 16, vindt

men de geschiedenis van eenen Witten Vloed bij een zesjarig Meisje aangeteekend. Van de huwbaarheid af tot den tijd der ophoudende maanston- den lijdt de Vrouw het meest aan deze kwaal, minder na dien tijd, offchoon de Schrijver dezelve ook bij Vrouwen tusfchen de zestig en zeventig jaren waargenomen heeft. HIPPOCRATES uitspraak, dat voornamelijk ongehuwden het meest door deze kwaal aangetast worden, heeft de Schrijver niet bevestigd gevonden.

§. 688.

Men onderscheidt gemeenlijk den Witten Vloed in eenen goedaardigen en kwaadaardigen (*fluor albus benignus et malignus*): eenige Artsen noemen den eersten, welke niet het gevolg eener venerifche besmetting is; terwijl de tweede door die besmetting veroorzaakt wordt. Deze verdeeling houdt men voor zeer onjuist; want het is aan elken Arts bekend, dat een niet venerifche Witte Vloed zeer dikwerf veel kwaadaardiger, hardnekkiger en moeilijker te genezen is, te meer, wanneer de oorzaak zeer verborgen ligt. — Anderen noemen den Witten Vloed met meer regt goedaardig, wanneer dezelve wit, zacht en niet fcherp is; maar boosaardig, wanneer die met eene zeer fcherpe, stinkende en bijtende uitvloeijing gepaard gaat. — Oneigen is de verdeeling in eenen eigendommelijken en niet zamengeftelden Witten Vloed (*fluor albus specificus et simplex*), waarmede verscheidene Artsen het onderscheid tusfchen den venerifchen Witten Vloed en elken anderen, welke aan geene venerifche besmetting toegeschreven wordt, te kennen geven. Eigenaar-

aardig daarentegen is de verdeeling in eenen haastigen en slependen Witten Vloed (*fluor albus acutus et chronicus*); de behandeling van den eenen of van den anderen vereischt dikwijls geheel onderscheidene inzigten.

Kenteekenen van den Witten Vloed.

§. 689.

De Witte Vloed ontstaat in drie tijdperken, welke aan eene enkel trapsgewijze verscheidenheid van aanvankelijke en toenemende verschijnselen gekend worden.

§. 690.

Eerste tijdperk. De zieke klaagt over uitvloeijing van een slijmachtig vocht uit de teeldeel-
len, die niet zeer sterk is; deze uitvloeijing heeft een witachtig voorkomen, naar zeer dun stijffel of eene ligte oplossing van gom gelijkende; bij de uitvloeijing klaagt de zieke over geene de minste pijn, of op het hoogst slechts over eene onaangename gewaarwording; voor het overige bevindt zij zich zeer wel, heeft een gezond voorkomen; geene verrigting is gestoord, en men neemt ook in het overige Organismus anders volstrekt geene verandering waar. Dit zijn de verschijnselen der kwaal in het eerste tijdperk, dat zich door de zachtste, meestal slechts plaatselijke aandoening kenmerkt, en gemeenlijk bij eene uitzakking der baarmoeder of scheede, in de zwangerheid, of als het gevolg eener werktuigelijke prikkeling in de scheede, bij voorbeeld van polypaardige uitwasfen, welke uit de baarmoeder binnenwaarts hangen, waargenomen wordt.

§. 691.

Tweede tijdperk. Het uit de scheede ontlaste vocht is wel geheel wit, maar buitengemeen overvloedig; het gelaat der zieke is zeer bleek, zij is zeer mager of gezwollen, de oogen liggen diep en de oogleden zijn bruin; zij klaagt over zwakte, matigheid, zwaarte in de leden, koude handen en voeten, de pols is klein en langzaam, de spijsvertering en zelfreproductie zijn zeer gestoord, gebrek aan of zeer bedorven eetlust, een wit beslagene tong, winden, nu eens verstopping, dan wederom buikloop, niet zelden gezwollen of zeer ingevallen kleine onderbuik, de pis is of wit, of ten minste met slijm vermengd, menigmaal ischurie en strangurie; de maanstonen vloeijen of geheel niet, ongeregeld, zeer spaarzaam of zeer overvloedig en houden den typus niet; de scheede is aandoenlijker en op het gevoel korrelachtig, een gevolg der gezwollene slijmklieren, waarvan, met het slijmvlies omgeven, eene groote hoeveelheid in de scheede aanwezig is; het scheededeel wordt hoe langer hoe slapper en is gezwollen, de buitenste moedermond opent zich zeer dikwijls van tijd tot tijd, en deszelfs dwarsche opening neemt eene ronde gedaante aan, de baarmoedersbanden zijn zeer verflapt.

§. 692.

Derde tijdperk. Van dag tot dag nemen de in het eerste tijdperk kenmerkende verschijnselen en ongemakken toe, de uitvloeijing is niet alleen zeer overvloedig, maar ook van eenen zeer bedorvenen aard;

aard; dezelve is geel geverfd, groenachtig of dun, stinkt onverdragelijk, is zeer fcherp en bijtend, de zieke klaagt bij de afvloeiing over hevige pijnen en branden bij de pislozing, de fcheede is zeer gezwollen, ontstoken, ontveld en veretterd, de binnenkant der dijen is door het fcherpe vocht aangetast, en het gaan valt moeilijk.

De Witte Vloed van andere Ziekten onderscheiden.

§. 693.

De Witte Vloed kan zeer ligt met andere ziekten, welke met dezelve overeenkomstige verschijnselen hebben, verwisfeld worden; van dien aard zijn zweren der fcheede of baarmoeder, een abces, een polyp, scirrhus en kanker der baarmoeder, en de wankleurige maanftonden. Dewijl de behandeling dezer ziektevormen van die des Witten Vloeds verschilt, zoo is het noodzakelijk, de onderscheidende kenteekenen nader op te geven.

§. 694.

Van eene verzwering der fcheede en baarmoeder onderscheidt zich de Witte Vloed door de volgende teekenen: de verzweringen worden door veel heviger verschijnselen der ontfteking voorafgegaan, waarop de teekenen eener inwendige suppuratione volgden, als: het gevoel eener vermeerderde warmte met eene afwisselende vliegende rilling over het gansche ligchaam, heete handen, drooge en brandende huid, taanachtig gelaat, treurig gemoedsgeftel, des avonds meer koorts, fomtijds

uitterend zweet, hevige pijnen, bijzonder boven de schaambeenderen, die zich tot in de liezen, de groote schaamlippen en de dijen afwaarts uitstrekken; de uitvloeijing is zeer stinkend en van verschillende kleur, dikwijls bruinachtig en met bloedstrepen vermengd. Het onderzoek moet nader beslissen, of de verzwering in de scheede of in de baarmoeder zich geplaatst hebbe. Voor het overige kunnen eene verzwering en Witte Vloed tegelijk aanwezig zijn, in welk geval beide ziekten zich door derzelfver eigene verschijnselen onderscheiden.

§. 695.

De Witte Vloed onderscheidt zich van den abces der baarmoeder door het beloop dezer ziekte, welke regelmatig is. Reeds in den beginne ontwaart de zieke hette, eenige dagen achtereen pijnen, naderhand klopping op eene bepaalde plaats, de pijn neemt allengskens af, en de klopping wordt door eene vliegende rilling en eene etterachtige uitvloeijing vervangen. Het beloop van den Witten Vloed is minder regelmatig, bijzonder de chronische, en dan houdt die ook denzelfden typus niet. Ook de uitvloeijing zelve kan ter onderscheiding van beide ziekten dienen; bij den abces is dezelve etter, bij den Witten Vloed eene slijmachtige stof. Werpt men iets daarvan in het water, dan zakt het, als het etter is, op den grond, scheidt van een en lost zich geheel op; doch het slijmachtig vocht blijft op de oppervlakte drijven, vormt draden, vlokken en strepen. Intusschen kan men niet ont-

ontkennen, dat in vele gevallen de Diagnosis desnietteenstaande zeer moeilijk is.

§. 696.

De scirrhus en kanker der baarmoeder onderscheidt zich meestal door de §. 994 bijgebragte kenteekenen, door de zeer hardnekkige, en naar eenen stinkenden etter zweemende uitvloeijing, door de hevigste pijnen in de baarmoeder, die ligt met trismus en opisthotonus gepaard gaan, door vliegende steken, welke zich door het bekken verspreiden, en door het meestal zeer harde, gezwollene en pijnlijke scheidedeel met de omgekrulde lippen van den moedermond.

§. 697.

De vloeijing uit de scheede, als een gevolg van eenen in de baarmoeder ontstane polyp, onderscheidt zich door het gevoel van zwaarte aan den uitgang van het bekken, door de stompe krampachtige pijnen in de schaamstreek, door den droogen en zeldzamen stoelgang, door de menigvuldige bloedlozing, welke somtijds met blijken van misgeboorte vermengd is, door zwelling van het scheidedeel en pijn in het scheidewelf.

§. 698.

De wankleurige maanstonen houden gewoonlijk derzelver tijdperk, daar de Witte Vloed gewoonlijk onregelmatig verschijnt en toch meermalen met ongeregelde of te sterk vloeiende maanstonen vergezeld gaat.

Oorzaken van den Witten Vloed.

§. 699.

De teeldeelen, voornamelijk de ſcheede, zonden, in den gezonden toefland, uit de ſlijmklieren en uitwaſemende vaten van derzelver ſlijmvlies telkens een ſlijm van eene meer weiachtige zelfſtandigheid, en flechts in eene zoodanige hoeveelheid, af, als daarvan vereiſcht wordt, om de deelen glibberig te houden. Deze regelmatige ſlijmafzondering heeft zoo lang plaats, als de levendige krachten — de opwekbaarheid — der ſlagaderen en aderen met elkander in evenwigt ſtaan; zoodra echter het evenwigt der ſlagaderen en aderen, der uitwaſemende en opſlorpende vaten geſtoord wordt, dan heeft er ook eene buitengewone quantitative en qualitative ſe- en excretie van het ſlijm plaats, als een gevolg der heerſchende ſlagaderlijkheid in de aderen der ſlijmvliezen, en van het verbroken evenwigt der ſe- en excernerende vaten. Dit geſtoord evenwigt wordt, bij den Witten Vloed, niet alleen door de vermeerderde afzondering van het ſlijm zelf, maar ook door de pijnlijke, meestal brandende gewaarwording, bijzonder bij de piſlozing, en door het zwellen van het ſlijmvlies der ſcheede, of veeleer van derzelver klieren, te kennen gegeven.

§. 700.

Aſtheniſche perſonen, zwakke, ſlijmerige, kwaadſappige geſtellen, hetzij dezelve door overerving, of eerst naderhand door ſchadelijke invloeden ontſtaan,

flaan, zijn voornamelijk aan deze kwaal blootgesteld. Insgelijks werken zeer daartoe mede het verblijf in vochtige woningen, eene zittende, wel lustige, weekelijke en werkelooze leefwijze, te lang slapen, bijzonder op veërenbedden, belette uitwaseming, ongeregelde maanstonen, het niet zuigen, uitzakking der scheede en baarmoeder, naauwe en te warme kleederen, te hevige inspanning van het ligchaam, bijzonder die met nachtbraken vergezeld gaan, buitensporige leefwijze, kommer, verdriet, droefgeestigheid, genot van te veel plantaardig voedsel, bijzonder van vele meelspijzen, moeskruiden en peulvruchten, het misbruik van versch, niet uitgist bier, hetwelk weinig hop bevat, van slecht water, van taaije en zwaar verteerbare spijsen, bijzonder van veel visch, menigvuldige kwade spijsvertering en daardoor veroorzaakte storingen in het gastrische stelsel, te veel koffij en thee, misbruik van afdrijvende middelen tot herstel der maanstonen, verhoogde en onbevredigde teeldrift, misbruik van purgeermiddelen, bijzonder van middelzouten, te wijd bekken, uitstekende zwakte van het baarmoederstelsel, die doorgaans door menigvuldig kramen, te vroeg genoten' bijslaap, buitensporigheden in denzelfden en in de Onanie, miskramen, zware en moeilijke verlosfingen, bloedvloeijingen der baarmoeder, veroorzaakt wordt; het gebruik van stoven, misbruik van laauwwarme baden, gewelddadige afhaling der nageboorte, voorafgegane ontsteking der baarmoeder, afdrijvende en verhittende middelen, te lang zuigen, enz.

Merkwaardig is het, dat de Witte Vloed op zekere jaargetijden, bij voorbeeld in den herfst, menigvuldiger voorkomt. Insgelijks heeft men denzelven epidemisch waargenomen: een bewijs, dat de verandering van den dampkring invloed op het ontstaan dezer kwaal hebben kan, zoo als die ook de epidemische katarrhus te weeg brengt. LEAKE (*) heeft den Witten Vloed gedurende den herfst in Engeland epidemisch waargenomen, toen er tevens katarrhale ziekten, keelontstekingen en diarrheën, afwisselend met den Witten Vloed, heerschten; deze vereischte dezelfde behandeling, en verdween tevens op denzelfden tijd. In Berlijn werd dezelve in 1722 (†), en te Noël, eene kleine stad in Frankrijk, in 1769 epidemisch waargenomen, zoo als men in het *Journal de Médecine* gemeld vindt. — In Holland (§) en Brazilië zou deze kwaal endemisch heerschen; dáár wil men het aan den vochtigen dampkring, hier aan het te sterk gebruik van verkoelende dranken, bijzonder van limo-
na-

(*) *Disposition aux malad. chron.*

(†) *Decad. 2. Acta med. Berol. vol. III. et IV.*

(§) Zeer zelden, inderdaad, zal men hier te Lande eene Vrouw aantreffen, die niet aan den Witten Vloed laboreert, of daarvan niet in eenen meerderen of minderen graad reeds het slagtoffer geweest is. Tot ééne der voornaamste oorzaken wil ik althans gebragt hebben het niet behoorlijk reinigen harer teeldeelen, tijdens zij de maanstonen gehad heeft; en dat hieraan eerder de oorzaak, dan wel aan eenen vochtigen dampkring moet toe-

nade en het misbruik van laauwe baden, toegeschreven hebben. — Ook in Berlijn mogt de Schrijver eenen endemischen Witten Vloed waarnemen, welke aan de te vroege inspanning van den geest en opwekking der teeldrift, het sterk rijden en dansen, waartoe kinderen te vroeg opgeleid worden, de dunne kleeding, bijzonder met korte rokken, de verkouding, het veel zitten, bij het breijen en naaijen, het vermoeijen in de groote stad, door loopen e. d. g. mogt toegeschreven worden.

§. 702.

De Witte Vloed wordt zeer dikwijls door plaatselijke, deels werktuigelijke, deels organische invloeden, voortgebracht. Daartoe behooren moedersteunfels, steenen, sponzen, of andere vreemde lichamen in de scheede en baarmoeder, menigvuldige betasting der teeldeelen, te veelvuldige bijslaap, maden, uitvloeijing van scherpen etter uit de baarmoeder, onreinheid, bijzonder na menigvuldigen bijslaap, het indringen van drekstoffen, bij gescheurden bilnaad, en uitvloeijing van pis in de scheede, vleeschklompen, polypen, uitwasfen en beursgezwellen in de baarmoeder en scheede, scirrhus en kanker der baarmoeder, eene tot rotting overgegane vrucht in de baarmoeder, de zwangerheid.

§. 703.

toegeschreven worden, blijkt voornamelijk dááruit, dat Meisjes, vóórdát bij haar de maanstonen te voorschijn gekomen zijn, hier zeldzamer, in vergelijking van andere Landen, met den Witten Vloed gekweld, aange troffen worden.

§. 703.

De Witte Vloed kan ook het gevolg eener venere-
rische besmetting zijn, en ontwikkelt zich ook bij
Vrouwen, die eene rhumatieke, arthritische, rha-
chitische en scrofuleuse gesteldheid hebben. Bij de
laatstgenoemde ziekten komt dezelve symptomatisch
voor, naardien die met de afzonderingen in het
algemeen, en met die van het slijm in een bijzon-
der verband staan; of door deze kwaal zich metas-
tatisch voordoen.

§. 704.

De Witte Vloed komt dán ook somtijds voor,
wanneer zekere af- en uitzonderingen, zelfs zieke-
lijke, in andere vormfels en organen plotselijk op-
gestopt worden. Zoo heeft men denzelven na op-
stopping van verkoudheid, eener zinking met vele
slijmerige uitwerpselen vergezeld, van braking (*),
van den aanbeijenvloed, van zweeterige voeten,
van het kwaadzeer, van zweren, bijzonder aan de
voeten, van schurft en van ander huiduitslag zien
ontstaan. Somtijds doet dezelve zich voor na het
verzuimen eener gewone aderlating, is de medge-
zel, of het gevolg van koortsen, bijzonder van epi-
demische tuschenpoozende of zenuwkoortsen; ook
neemt men denzelven waar bij de moeilijke tand-
wording der kinderen, bij de hysterie, bij wormen,
bijzonder bij maden, welke zich in menigte uit-
den

(*) R. A. FONSECA, *Consultat. med. T. I. Consultat. 21.*

den endeldarm naar de teeldeelen verspreiden (*), bij verstoppingen der baarmoeder; en eenige malen heeft de Schrijver denzelven na kinderpokken en mazelen zien ontstaan.

Afloop en gevolgen van den Witten Vloed.

§. 705.

De Witte Vloed verdwijnt of geheel, zoodra men deszelfs aanleidende oorzaak weggenomen heeft, of houdt, volgens waarneming, somtijds dán eerst op, wanneer de eerste maandelijksche zuivering, eene bloedvloeijing der baarmoeder, buikloop, braking, kwijling, zweet, of een uitslag zich voordoen.

§. 706.

Evenwel kan de Witte Vloed, als die lang duurt, menigvuldige — zelfs zeer treurige — gevolgen hebben. Deze zijn: hysteric, buikwaterzucht, waterzucht en verharding van den eijerstok, polypen en vleeschgezwollen der baarmoeder, sponsachtige uitwasfen der fcheede, ontijdige verlosfingen, onvruchtbaarheid, voornamelijk wanneer de zetel der kwaal in de baarmoeder is, uitzakking der baarmoeder.

(*) Niet lang geleden behandelde de Schrijver te Berlijn een Meisje, dat pas de maanftonden gekregen had, aan Witten Vloed, die voor geene middelen wijken wilde, totdat men, na gedaan onderzoek, eene menigte maden ontdekte, welke dooding door eene sublimaat-oplossing spoedig de ziekte deed verdrijven.

moeder en scheede, metritis, die gemakkelijk tot koudvuur overgaat, zweren en abscesen in de baarmoeder en scheede, scirrhus en kanker der baarmoeder, aanbeijen der schaamlippen, Nymphomanie, chronische zinking en uitslag, abscesen en zweren in andere vormfels, schele hoofdpijn, bleekzucht, kwaadsappigheid, Atrophie, verlammingen, rug- (*tabes dorsalis*) (*) en longtering, eene sluipende uitterende koorts en de dood.

§. 707.

Bij de Lijkbeschouwing vond men de s c h e e d e zeer verwijd, somtijds ook zeer naauw, als gevolgen van derzelver onregelmatige zwelling, derzelver wanden ontstoken, menigmaal branderig, zeer dik, kraakbeenig en met scirrheuse en kankerachtige gezwellen en zweren bezet; het s c h e e d e d e e l zeer dik, gezwollen, ontstoken, scirrheus en geëxulcereerd; de zweren strekten zich somtijds tot in de scheede en den endeldarm; den m o e d e r m o n d zeer geopend tot aan de holte der baarmoeder, deszelfs lippen omgekruld, gezwollen, roodachtig en variceus. Zeer dikwijls waren dezelve de zitplaats van gezwellen en zweren, en bevatteden eene wankleurige, slijmerige stoffe; de baarmoeder zelf kwam ongemeen grooter dan in den gezonden toestand voor: somtijds was dezelve kleiner, derzelver binnenvlies gezwollen, week, poreus of zeer hard en kraakbeenig; derzelver vaten variceus, de

(*) HORN'S *Archiv für die medic. Klinik.* 1813, 14. März und April.

de ligging daarvan veranderd, en met nabijgelegene vormfels vergroeid; in derzelver holligheid vond men eene menigte slijm, scirrheuse en polypeuse gezwollen, waterblazen, vleeschklompen, stukken van ont-aarde eijeren, de klieren van het slijmachtig middelweeffel gezwollen, ter grootte eener erwt, somwijlen zeer klein en bijna geheel vergaan en onmerkbaar; de klieren zelfs bevatteden eene groote menigte roodachtig, of wit taai slijm; in zeldzame gevallen ontdekte men in derzelver holligheid levendige maden. — De trompetten van Fallopius deden zich geëxculcereerd, met de eijerstokken vergroeid, en dik voor, en waren met een slijmerig vocht, dat uit de holligheid der baarmoeder zich aldaar ontlastte, aangevuld. — De eijerstokken zag men ongemeen groot, verhard, met waterblazen vergezeld, geëxculcereerd en met eene witte, krijtachtige stof omgeven; somtijds waren dezelfde zeer klein, smal, wit en zeer verlengd, derzelver banden ongemeen breed en dik, en derzelver vaten variceus.

*Oorzaken en gevolgen van den opgestopten
Witten Vloed.*

§. 708.

De Witte Vloed kan plotselijk opgestopt worden, en wel, volgens waarneming, door eene zeer brandende hette in den zomer, door strenge koude in den winter, door verkoudingen der voeten, van den onderbuik en der teeldeelen, door koude voet- of algemeene baden, bijzonder na voorafgegaan zweet,
door

door zeer zamentrekkende inspuitingen, door misbruik van minerale baden, verkeerde behandeling, voornamelijk als een gevolg van verzuimde inachtneming der tijdperken, enz. Soms werd door plotselijk werkende gemoedsaandoeningen, bij voorbeeld door schrik, de Witte Vloed dadelijk opgestopt; menigmaal verdwijnt dezelve tot nadeel der zieken eensklaps, zonder dat men altijd de oorzaak ontdekken kan. — De gevolgen van den opgestopten Witten Vloed kunnen zijn: dysurie, strangurie en ischurie, ontsteking en abces der baarmoeder, ontsteking van den onderbuik, aanbeijen, zweeterige voeten, chronische en herpetische uitslag, gepaard met hevige beenpijnen, gierstuitslag, katarrhale en slijmkoortsen, longontsteking, longtering, waterzucht, buikloop, pisvloed, maagkramp, hysterie, hoofdpijn, migraine, jicht, verlammingen, enz.

Voorzegging.

§. 709.

De voorzegging van den Witten Vloed is eensdeels gunstig, anderdeels ongunstig: gunstig, dewijl deze kwaal zelden onmiddellijk het leven met gevaar dreigt; ongunstig, dewijl dezelve dikwijls zeer hardnekkig, langdurig en moeilijk te genezen is, waarbij men niet uit het oog moet verliezen, dat dezelve voor de zieke een zeer lastig ongemak is. De hoofdvoorwaarden tot de voorzegging zijn de volgende: hoe zachter en goedaardiger, hoe minder scherp en invretend de Witte Vloed is, des te gemakkelijker volgt de genezing. — Zoo de-

de Witte Vloed zich vóór het tijdperk der maanftonden voordoet, dan wijkt dezelve dikwijls voor geen middel hoegenaamd; maar verdwijnt met de zich voordoende maanftonden ten tijde der huwbaarheid, indien het Meisje zich anders wel bevindt, de Witte Vloed zelfs geenen nadeeligen invloed op hare gezondheid had, en geene afwijkingen in de teeldeelen zich gevormd hebben. — Hoe langer de Witte Vloed duurde, des te moeilijker; hoe korter, des te gemakkelijker is de genezing. — Hoe stinkender, scherper en bijtender de stoffe is, welke afgezonderd wordt, des te moeilijker is de genezing. — De Witte Vloed bij Meisjes is gemakkelijker te genezen, dan bij bejaarden; bij oude Vrouwen wordt dezelve veelal ongeneeslijk, en vergezelt haar tot den dood. — Hoe langer de Witte Vloed duurt, des te bedenkelijker wordt dezelve; hoe meer de reproductie gedaald is, des te hagchelijker, en een bewijs, dat er ligt waterzucht, cachexie, atrophie e. d. g. ontstaan kunnen. — Als de Witte Vloed zeer hardnekkig, met hevige pijnen en steken in de schaamstreek en in het bekken vergezeld is, de ontlaste stof dagelijks morsiger en scherper wordt; dan geeft dit vermoeden tot kanker in de baarmoeder, en de kwaal blijft onherstelbaar. — De ondervinding leert, dat de Witte Vloed somtijds in het tijdperk der huwbaarheid, of zoodra een Meisje zwanger wordt, of een buikloop of eene tuschenpoozende koorts zich voordoet, ophield. — Zij, die met den Witten Vloed gekweld zijn, worden ligt onvruchtbaar, en ontvangen niet. — Hoe verborgener de oorzaak is, welke den Witten Vloed te weeg bragt,

des te moeilijker wordt de genezing. — Hoe geringer de aanleg tot den Witten Vloed is, des te gemakkelijker volgt de genezing. — Zeer treurig is de voorzegging, als flauwten en stuiptrekkingen den Witten Vloed vergezellen.

Geneeswijze.

§. 710.

Het wezenlijke der geneeswijze bij den Witten Vloed berust op de beperking der slijmafzondering en het bewerken eener weiachtige afscheiding. Dit kan echter dáárdoor geschieden, dat de gezonkene veerkracht (de verminderde werkzaamheid der aderen) trapsgewijze opgewekt worde. Daarbij nemen men wel in aanmerking, dat, hoe langer de Witte Vloed duurt, des te sterker dezelve is; hoe pijnlijker, gezwollen en hervormd het vlies en de klieren der scheede zijn, des te voorzigtiger en langzamer de veerkracht moet verhoogd worden.

§. 711.

Eene der eerste voorwaarden ter genezing van den chronischen Witten Vloed bestaat dus vooral hierin, dat de zelfreproductie van het Organismus langs alle wegen door uitwendige gunstige invloeden bevorderd, en dat vooral ook de schadelijke invloeden (§. 700) verwijderd en vermijd worden.

§. 712.

Men kan dikwijls bij eenen chronischen Witten Vloed, die niet te lang aanhield, zeer gemakkelijk de

de apotheek ontberen , mits men den leefregel naar de volgende voorschriften in acht neme: 1) al het voedsel , dat de zieke geniet , moet gemakkelijk te verteren , en toch voedzaam zijn ; 2) tot drank prijze men goed , uitgegist bier , een weinig , bijzonder rooden , Bourgonje , Bisfchop en kruiderwijn aan ; 3) men verbiede het misbruik van koffij , thee en warme dranken ; 4) men fchrijve eene matige en menigvuldige beweging voor , en verbiede de geflaidig zittende en ftaande leefwijze , het menigvuldig nachtwaken en te lang flapen , bijzonder in te zachte veërenbedden , te fterke inspanningen van het ligchaam , verkoudingen , bijzonder der voeten , maar ook verhittingen door het verblijf in te warme vertrekken , door wandelingen in te heet weder , door fterke bewegingen , door menigvuldig danfen , door het misbruik van verhittende dranken , van wijn en punch , door fterk gekruide vleeschfpijzen en geregtten van eenen verhevenen fmaak ; 5) vooral bevelemen , zich van ftoven te onthouden ; 6) men late eene gepaste , met het jaargetijde overeenkomftige , kleeding dragen , welke noch den onderbuik noch het ligchaam in het algemeen nadeelig drukt , en hetzelve niet aan eene beduidende verkouding of verwarming blootftelt ; 7) zeer nuttig zijn laauw-warme baden en menigvuldige wrijvingen der huid ; 8) betastingen der teeldeelen , Onanie en te menigvuldige bijflaap moeten vermijd , en de teeldeelen , voornamelijk na den bijflaap , zindelijk gehouden worden.

§. 713.

Evenwel zijn deze bijgebragte diëtetische voorschriften bijzonder bij den chronischen Witten Vloed, welke lang aanhield, of aan eene bijzonder gewigtige oorzaak moet toegeschreven worden, niet altijd toereikend; en men is dan ook genoodzaakt, te gelijktijd zijne toevlugt tot geneesmiddelen te nemen. Men moet dan, om de in §. 710 bijgebragte geneeswijze aan te wenden, op de oorzaak, de zitplaats der kwaal, de gevolgen, den ziekelijken toestand der scheede en baarmoeder, en op sommige verbindingen letten.

§. 714.

Bijaldien de ziekte het uitwerksel is eener verzwakte voortbrengingskracht van het Organismus in het algemeen, dan moeten niet alleen de invloeden vermijd, maar ook zulke geneesmiddelen aangewend worden, welke het naast met de reproductie overeenstemmen; de *Tonica*, namelijk: *herba trifolii fibrini*, *folia aurantiorum viridium*, *radix gentianae*, — *cascarillae*, *lignum quassiae*, *cortex cinnamomi*, de kinabast en deszelfs surrogaten, in aftreksel of afkooksel, en het ijzer, zijn hier aangewezen.

§. 715.

De kwaal met verstoppingen van den onderbuik, welke zeer dikwijls de gevolgen der verzwakte voortbrengingskracht zijn, gepaard gaande, dan worden de *gummata ferulacea*, het *gummi ammoniacum* — *galbanum* — *asa foetida*, *succinum*, *aconitum*,

tum, belladonna, digitalis purpurea, de spiesglansen kwikoxyde, bij voorbeeld calomel, het Plumer's poeder, aethiops martialis, terra ponderosa salita, calx muriata, calx antimonii sulphurata, de zwavelbaden, e. d. g. aangeprezen. Deze middelen verdrijven zeer bijzonder de storingen van het watervaatstelsel in het algemeen, beperken de onregelmatige slijmafscheiding in het baarmoederstelsel, en bewerken de weiachtige afscheiding des te zekerder, wanneer men, na wegneming der verstoppingen en het herstel der geregelde veerkracht van het aderstelsel, tot de in §. 714 opgegevene middelen, voornamelijk de kina en het ijzer, zijne toevlugt neemt.

§. 716.

Als de Witte Vloed het gevolg is der niet verschijnende of opgestopte maanstanden, dan moet men dezelve herstellen; want men heeft reeds doen opmerken, dat met derzelver regelmatige verschijning zeer dikwijls de kwaal verdwijnt. Offchoon wij, wat de behandeling van dezen ziekelijken toestand aangaat, naar de voordragt van het tweede en vijfde Hoofdstuk der eerste Afdeeling kunnen verwijzen, zoo moeten wij toch hier nog op de verbinding opmerkzaam maken, waardoor het oogmerk van de uit den weg ruiming der kwaal zeer verhindert kan worden, namelijk, wanneer nog bijzondere oorzaken, als jicht, rumathismus, scrofelen, venereische ziekte, enz. medewerken, of zelfs, als gevolgen van den langen duur der kwaal, zulke hervormingen in het weeffel der baarmoeder, of misvormingen in derzelver holten te weeg gebragt zijn,

waardoor de verschijning der maanftonden verhindert werd. Hierom is een onderzoek der scheede en baarmoeder zelve eene der noodzakelijkste vereischen.

§. 717.

Werktuigelijke invloeden op de scheede en baarmoeder, bij voorbeeld van moedersteunfels, sponzen, steenen, of andere vreemde lichamen, moeten verwijderd worden. Moedersteunfels kunnen zeer ligt tot den Witten Vloed aanleiding geven, zoo als de Schrijver gelegenheid gehad heeft vele soortgelijke gevallen te behandelen, en in een vroeger zich genoodzaakt vond, een zeer beklemd moedersteunfel uit te snijden. Meestal ontstaat de kwaal door kwalijk aangelegde of verplaatste, of te gróote en slecht gemaakte, of met scherpe stoffen bekleede moedersteunfels, die, wanneer zij lang gedragen worden, niet alleen eenen zeer hardnekkigen Witten Vloed, maar ook ontstekingen, veretteringen en verzweringen der scheede, ja zelfs verlammingen, beenbederf in het bekken, en eindelijk den dood kunnen veroorzaken. — De behandeling van den Witten Vloed vordert vooral wegneming van het moedersteunfel, en verwisseling tegen een gepaster middel, om de uitzakking der scheede terug te houden. De Schrijver heeft in zulke gevallen, met een gelukkig gevolg, slechts eene spons laten aanwenden; en toch is somtijds de gevoeligheid in het slijmvlies der scheede zoo zeer toegenomen, dat die zelfs niet geduld wordt en de Witte Vloed zich telkens op nieuw voordoet. Veel beter is

is het dan, om volstrekt geen moedersteunfel in te brengen, maar andere voorschriften aan te prijzen, waardoor de uitzakking, zoo niet tegengegaan, echter het meerder uitkomen, verhinderd wordt. Voor het overige houdt de Witte Vloed, ook na het wegnemen van het pesfarium, nog dikwijls aan, uit hoofde er of eene groote zwakte, of reeds ongeregelde hervormingen in het slijmvlies en in de klieren zelve ontstaan zijn, die bij de behandeling eene bijzondere opmerkzaamheid verdienen, en waarover in het vervolg bijzonder zal gesproken worden.

§. 718.

De Witte Vloed door te menigvuldigen bijslaap of Onanie ontstaande, dan prijze men in het eerste geval matigheid, en in het tweede het nalaten dezer ondeugd dringend aan. De betasting der teeldeelen is niet alleen wegens de algemeene en te weeg gebragte plaatselijke zwakte, maar ook hierom zoo na-deelig, dewijl het daardoor met geweld uitgedrevene slijm telkens de teeldeelen prikkelt, en op nieuw daartoe gelegenheid geeft. Voor het overige moet men niet alleen de zwakte, maar ook de, zeer dikwijls verborgene, invloeden, welke door de menigvuldige betasting ontstaan, trachten weg te nemen.

§. 719.

Maden, welke gewoonlijk van den endeldarm naar, en somtijds bij eenen geopenden moedermond, zelfs in de baarmoeder eenen weg banen, vereischen zindelijkheid, het wasfchen met kalkwater, de aqua

phagadaenica, of eene oplossing van het sublimaat, en verwijdering der eenigzins plaatshebbende zwakte.

§. 720.

De Witte Vloed uit eene te zeer verhoogde en onbevredigde teeldrift voortspruitende, zoo moet men vooral op de verwijdering der daartoe aanleidende oorzaken bedacht zijn. Onthouding van den omgang met het Mannelijke geslacht, vermindering eener wel lustige lektuur, het betasten der teeldeelen, het te lang slapen in zachte veërenbedden, te voedzame en verhittende spijsen en dranken wordt vooral vereischt: dezelve moeten door werkzaamheden, die geest en ligchaam doelmatig bezig houden, en eenen meer verdunnenden plantenkost, waardoor de zelfreproductie minder bevorderd wordt, vervangen worden. Voor het overige kan dit onderwerp hier gevoegelijk overgeslagen worden, aangezien daarover bij de Nymphomanie het noodige voorgedragen is.

§. 721.

De Witte Vloed, welke door scirrhus en kanker der baarmoeder ontstaat, vereischt de behandeling der kwaal, welke in het naaste Hoofdstuk volgen zal. — Polypen der baarmoeder, gezwollen, uitwasfen, knobbels en likteekenen in de scheede moeten weggenomen worden. Bij de laatsten worden de kwik- en spiesglansoxyden, het calomel en het sulphur. auratum antimonii, tot inwendig gebruik, en de oplossing van het sublimaat, als inspuiting in de scheede, zeer aangeprezen.

§. 722.

§. 722.

Bijaldien ophooping van drekstoffen, scherpe vastzittende onreinigheden, en te sterke slijmafzonderingen in het darmkanaal plaats hebben, waarop men letten moet, dan zijn aanvankelijk ontlastmiddelen, de wijnsteenzure potasch, zeep, rhabarber, met bittere extrakten, de aloë, de nieswortel, de goudzwavel, met wijnsteenroom bereide hui, en dergelijke klisteren zeer werkzaam: en zoodra er behoorlijke ontlastingen plaats gehad hebben, de opzetting van den buik ophoudt en de stoelgang regelmatig volgt, dan tracht men de zelfreproductie door versterkende geneesmiddelen, bittere extrakten, quassia, calamus aromaticus, cascarilla, cortex cinnamomi — aurantiorum — chinae en ijzer te bevorderen, waarmede men baden van aromatische kruiden, en op het laatst ijzerbaden doet gepaard gaan. Vooral toch lette men op een doelmatig diët, de zieke moet alle taaije en zwaar verteerbare spijsen, versch, slecht bier, zittende leefwijze, enz. vermijden, krachtige, matig gekruide en ligt verteerbare vleeschspijzen, en bitter, genoegzaam uitgegist bier en goeden wijn gebruiken, den buik dikwijls wrijven en veel beweging maken.

§. 723.

De Witte Vloed van eenen rhachitischen en scrofulcuseu aard zijnde, vereischt voornamelijk de opvolging dier geneeswijze, welke met de daartoe aanleidende oorzaken instemmen. — De kwaal, als een gevolg van rhumatieke of arthritische aandoening, ontwikkeld en voornamelijk door verkoudingen

der teeldeelen zelfs veroorzaakt zijnde ; dan prijzen eenen verwarmenden leefregel en zweetdrijvende geneesmiddelen aan : sp. Mindereri, antimoniaal-middelen, kamfer, aconitum, guajacum, bijzonder de tinctura guajaci volatilis, het oleum terebinthini, de spiritus antiarthriticus Elleri, enz. worden hier aangewezen.

§. 724.

De uitwendige schadelijke oorzaak van den chronischen Witten Vloed door eene venerifche besmetting, welke zich door andere verschijnselen te kennen geeft, veroorzaakt zijnde, dan is het kwik, in- en uitwendig aangewend, dienstig; waartoe zich het sublimaat, de mercurius solubilis Hahnemanni, het calomel met goudzwavel, de guajak en het heulsap, aanbevelen. — De ongeregelde afscheiding na mazelen en pokken bijblijvende, dan is dezelve of een gevolg der zwakte, welke door versterkende geneesmiddelen, bijzonder door het gebruik van kina, verdwijnt, of dezelve wordt nog door nablijvende mazel- en pokstof onderhouden; het kwik afwisselend met de goudzwavel en kamfer, een op den vijfden dag toegediend purgeermiddel uit jalappa en calomel, en inspuitingen uit eene oplossing van den sublimaat in de scheede, stuiten weldra de kwaal.

§. 725.

De Witte Vloed na opstopping van andere slijm-afzonderingen, bij voorbeeld eener zinking, na teruggedreven hoofdzeer, van uitslag, van het voetzweet, aanbeijen, dan moet men trachten, de op-
ge-

gestopte af- en uitzonderingen weder te herstellen. Zoo wijkt dikwijls een Witte Vloed door teruggedreven schurft niet eer, voordat dit uitflag door inënting te voorschijn kwam, of die door opgestopte aanbeijen, niet voordat derzelver Vloed weder hersteld was; het spreekt van zelf, dat men naderhand deze ziekten zelve en den aanleg daartoe trachte weg te nemen. — Hysterie, wormen, tusfchenpoozende koortfen, e. d. g. vereifchen insgelijks de daarmede overeenftemmende behandeling, wanneer die tot de kwaal aanleiding geven.

§. 726.

Niet altijd wijkt de Witte Vloed, offchoon de uitwendige fchadelijke invloeden weggenomen zijn; meestal blijft de ongeregelde affcheiding, als een gevolg van het verzwakt baarmoederftelfel, bij, ten gevolge waarvan zelfs de aderen niet tot die werkzaamheid kunnen opgewekt worden, om de flijmafzondering te beperken, en de weiachtige, geregelde affcheiding voort te brengen. Men moet dan nog de, bijzonder het baarmoederftelfel opwekkende, geneesmiddelen aanwenden. Daarvan worden de volgende geroemd: herba roris marini — calendulae — gratiolae, — sabinae — uvae ursi, turiones pini, radix columbo, cortex simarubae, — winteranus, — aurantiorum, lignum quassiae, terra japonica, gummi kino — olibanum, — galbanum — mastichis — myrrhae — aloës, radix rhabarbari in kleine giften, alumen, vitriolum martis, limatura martis, flores salis ammoniaci martiales, de ijzer-mineraalbronnen en baden, cuprum vitriolatum, tinctura cantha-

tharidum, de balsamus de copaiva — cohabensis, pilulae balsamicae Hoffmanni — Stahl's.

Over de uitwendige middelen.

§. 727.

Om den Witten Vloed te genezen, moet men met de inwendige dikwijls ook uitwendige middelen paren, bijzonder wanneer de kwaal door het gebruik der eerstgenoemden niet wijkt, of zelfs meer eene plaatselijke aandoening is. Het doel om uitwendige middelen aan te wenden, is: 1) de slijmafzondering te beperken, en de sereuse afscheiding te bewerken; 2) de teeldeelen te zuiveren; 3) de, bijzonder door een langdurig verblijf in de scheede, ligt aantastende uitwerking der afgezonderde scherpe stof te verzachten.

§. 728.

Met de uitwendige middelen moet echter de nauwkeurigste voorzigtigheid in acht genomen worden, om niet door derzelver aanwending den Witten Vloed spoedig te onderdrukken, en menige hervormingen der baarmoeder en scheede, als een gevolg der tegennatuurlijk vermeerderde voortbrengingskracht te doen ontstaan, of de slijmafzondering zelfs tot nadeel der zieke te vermeerderen. Dit geldt niet alleen van zeer styptische en zamentrekkende middelen, maar ook van het koude water, het kalkwater, en de weekmakende warme middelen, die ten uitwendigen gebruike aangeprezen worden. Zoo kan de vochtige koude bij den acuten Witten Vloed,
in

in het tijdperk der ontsteking, bij eenen venerischen, rhumatieken en jichtigen aard de slechtste gevolgen hebben, waartoe men zelfs de opstopping brengen moet. Aan den anderen kant echter veroorzaakt het aanhoudend gebruik van weekmakende en verflappende inspuitingen en stovingen tegenovergestelde ongunstige resultaten: zwelling en gevoeligheid van het slijmvlies der scheede nemen toe, de slijmafzondering wordt sterker; en juist zijn het deze middelen, die zoo ligt de uitzakking der scheede en baarmoeder bevorderen.

§. 729.

Het is derhalve een der eerste en gewigtigste vereischten bij het gebruik van uitwendige middelen, dat, hoe heviger de Witte Vloed, hoe hooger de graad der ontsteking en de gevoeligheid der scheede en baarmoeder is, hoe langer de Witte Vloed aanhield, en hoe meer tegennatuurlijke her- en misvormingen in de scheede en baarmoeder voortgebracht werden, des te zachter en omzigtiger men met het gebruik van uitwendige middelen wezen moet.

§. 730.

De uitwendige middelen worden op verschillende wijzen aangewend: als stovingen met eene spons, als baden in eene kuip, of met behulp van bidets, terwijl het vocht door beweging met de handen naar de teeldeelen gedreven, en deze daarmede bespoeld worden; als inspuitingen in de scheede en baarmoeder, als berookingen en in den vorm eener zalf. De gewoonlijkste methode is die der inspuitingen, door middel eener cylindervormige, met verscheidene ope-

openingen voorziene scheidespuit, van tin, hoorn, ivoor of eener elastieke masfa vervaardigd, wanneer het slijmvlies der scheede het werktuig der ziekelijke afscheiding is; of door middel eener moederspuit, en van de, naar de rigtingslijn van het bekken gekromde moederpijp, met een kegelvormig, met gaten voorzien einde, wanneer de baarmoeder zich als de zitplaats der kwaal te kennen geeft, en de graad der ontsluiting van den moedermond de aanwending van de pijp toelaat. Bij de aanwending zelve moet men acht geven, of het ingespotene vocht eenigen tijd in de scheede teruggehouden worde, hetwelk men door eene doelmatig verhoogde ligging met de billen, door rust en over elkander gekruiste beenen bereikt. Dikwijls echter heeft de aanwending der inspuitingen bij eenen ongeschonden en physieken maagdom volstrekt geene plaats; en waar slechts de cylindervormige spuiten vereischt worden, daar moet men derzelver dikte naar de wijidte der scheede bepalen. De inspuitingen in de baarmoeder worden door de zieken zelve verrigt, maar deze behoeven eene ervaren helpster, welke in het onderflaan bedreven is, dewijl gene in dit geval, slechts nevens den moedermond in de scheede gebragt, niets baten zouden; dezelve mogen ook niet te dikwijls aangewend worden, om niet door het overtollig affpoelen van het afgezonderde vocht de gevoeligheid der scheede en de slijmafzondering te vermeerderen. — Men prijze ook voorzigtigheid bij het gebruik der spons, als een middel ter aanwending van uitwendige middelen, aan, daar die bij eene hooge aandoenlijkheid der scheede niet verdragen wordt, of de slijmafzondering vermeerdert.

§. 731.

Als in het eerste of tweede tijdperk de slijmafzondering zeer sterk aangetroffen wordt, het gevoel der scheede zeer verhoogd is, hetwelk zich door een hevig branden bij het waterlozen bijzonder doet kennen, en de kwaal reeds langen tijd geduurd heeft, dan wende men alleenlijk zwakke metaal-oxyden in eenen vloeibaren vorm als inspuitingen aan, die men met de zoogenaamde kool-waterstofhoudende middelen, of het kalkwater vereenigt. De eerste zullen de weiachtige afscheiding bevorderen, naardien die eensdeels het aangedane vormsel uitzetten, de laatste de slijmafzondering beperken, dewijl die anderdeels hetzelfde vormsel zamentrekken. Tot gene behooren het extractum saturni, de calx antimonii sulphurata en het vitriolum album; tot deze de kamfer en het kalkwater. Deze middelen worden in eenen vloeibaren vorm voorgeschreven, aanvankelijk in eene kleine hoeveelheid, met veel vocht, en des noods, opdat zij minder aantasten, met slijmige middelen gebonden, in het begin twee of drie malen, naderhand vier malen, en, wanneer de vloeijing minder wordt, allengskens weder twee malen, en op het laatst maar éénmaal daags. Men lost het liefst een drachma extratum saturni in een pond water, bij voorbeeld rozewater, op, waarbij men eene once kamferspiritus voegt, en vermeedert allengskens de gift van beide middelen telkens in dezelfde evenredigheid; behalve dit kan er van het verdunde Goulards- of kalkwater, alleen of met melk, gebruik gemaakt worden, bijzonder wanneer de

de uitvloeijing zeer bijtend is. Men wende deze middelen als inspuitingen, of door middel eener spons aan, om de teeldeelen daarmede te stoven en te reinigen; het is nogtans zeer raadzaam, dat deze, bijzonder bij eene groote aandoenlijkheid der scheede, steeds met eenen warmen zachten doek bedekt gehouden worden, om dezelve voor verkouding te bewaren.

§. 732.

Bij weelderige misvormingen, verhardingen en andere tegennatuurlijke hervormingen der scheede en baarmoeder, bij zeer lijmerige, stinkende uitvloeijingen na eenen zeer langdurigen Witten Vloed, worden het decoctum cicutae en nucum juglandum, bijzonder echter zulke metaaloxiden, welke meer den zamenhang (*Cohäsion*) verminderen, aangewezen. In deze gevallen worden bijzonder het kali causticum, en het kwikoxyde, het hydrargyrum muriaticum corrosivum en nitricum, het argentum nitricum, het cuprum en zincum sulphuricum aangewend, terwijl alle zoogenaamde adstringerende middelen zeer schadelijk zijn (*). Men laat vier tot zes grein kali caus-

(*) Voor het in- en uitwendig gebruik van zamentrekkende middelen heeft ons reeds HOFFMANN voor lange gewaarschuwd, met te zeggen, dat: *in fluore albo sive simplici, sive virulento, vel etiam in mensibus decoloribus, adstringentibus tam internis quam externis, nihil perniciosius est: vidimus enim exinde lentas febres, purpuracea exanthemata, tumores tympaniticas et erodentes infantibus defluxiones uvulam et amygdalas adficientes, nec non alvi scirrhus, apostemata et exulcerationes jam insanabiles.*

causticum of hydrarg. muriat. corrosiv. in een pond gedistilleerd of rozewater oplossen, en dagelijks eenige malen in de scheede spuiten. Beide oplosfingen worden ook aangeprezen tegen den chronisch-venerischen Witten Vloed, bijzonder wanneer dezelve met zweeren en chankers aan de teeldeelen vergezeld gaat; men late daarvan matig warm in de scheede spuiten, of eene zachte spons daarmede natmaken, en de teeldeelen stoven en waschen; waarbij men echter, zoo als in het algemeen bij de aanwending der spons, zorg moet dragen, dat bij het reinigen der teeldeelen niet te veel gespoeld en gewreven worde.

§. 733.

Als de oorzaak van den Witten Vloed volkomen weggenomen is, de teeldeelen zelve in eenen geregelden vorm en samenhang zich bevinden, en de uitvloeiing alleenlijk nog als een gevolg van zwakte nablijft, dan kan men gerust tot die uitwendige middelen overgaan, welke de vereischte zamentrekking der aderen bewerkstelligen, om de slijmachtige afzondering te beperken. De aluin, de borax, het ijzer-vitriool, het mineraal-, het bluswater der smeden, de adstringerende, voornamelijk de extractive middelen uit het plantenrijk, flores rosar, rubr., herb. salv., cortex salicis fragilis, — hippocastani, — ulmi campestris, — simarubae, — quercus, — chinae, de myrrha, de oplossing van loodsuiker in rooden wijn en water, en die van het bijtend loogzout, met het heulsap en het laurierkerswater; de berookingen van succinum, olibanum, mastix, storax en dergelijken, zullen dan met voordeel aangewend kunnen

worden. In dit geval worden, behalve verscheidene reeds genoemde middelen, ook de door Artsen aan-
geprezene eikels in den vorm van een afkookfel,
de radix polygalae amarae, de liquor stipticus Looffi
en het kalkwater met melk vermengd, tevens tot
een inwendig gebruik toegediend, aangewezen.

§. 734.

De uitwendige middelen doen ook nog eene bij-
zonder nuttige uitwerking bij den Witten Vloed,
wanneer dezelve met ontvellingen en hevige pijnen
der teeldeelen gepaard gaat; de eerste strekken zich
zeer dikwijls tot aan de naastgelegene dijen uit. Be-
halve de vereischte zindelijkheid worden ook het
reeds geroemde decoctum nucum juglandum, eene
zalf uit de flores zinci, van het lycopodium, de ro-
zenpomade, eene oplossing van aluin met Syden-
ham's opiumstinktuur, in een meer of min slijmachtig
vocht, aanprezen.

Behandeling van den opgestopten Witten Vloed.

§. 735.

Wordt de Witte Vloed plotselijk opgestopt, dan
moet men 1) op de uitwendige schadelijke oorza-
ken, welke tot de opstopping aanleiding gaven, let-
ten, en deze trachten te verwijderen, bij voorbeeld
verkoudheden, waartoe zich een zweetdrijvende leef-
regel, de spiritus Mindereri, kamfer, een aftreksel
van vlier- en arnicabloemen, laauwwarme baden,
enz. aanprijzen; 2) moet men op de gevolgen, bij-
zonder op de plaatselijke aandoeningen, opmerkzaam
zijn.

zijn. Meestal doen zich ontstekingen in verwijderde organen, bijzonder bij eene plaatshebbende ziekelijke dispositie voor, bij voorbeeld ophthalmitis, enteritis, peripneumonia, phthisis, asthma, hydrothorax, verhardingen der borsten en dergelijken, welke overeenkomstig derzelver aanwijzing moeten behandeld worden; of ontsteking en andere gevolgen vertoonen zich meer in de naastgelegene of zoodanige deelen, welke het werktuig der ziekelijke afzondering zelve zijn, bij voorbeeld ontsteking der baarmoeder, der scheede en pisblaas zonder eenige uitvloeijing (*Leucorrhoea sicca*), of bloedingen, somwijlen liesbuilen (*Bubonen*), voornamelijk bij den venerischen Witten Vloed, pisopstopping, bijzonder als een gevolg van vernauwing der pisbuis, knoesten vleeschgezwollen en polypen der scheede en eijerstokken, waterzucht der baarmoeder, ontstekingen, aanbeijen, verhardingen, vernauwingen en abscesen van den endeldarm, enz.

§. 736.

Het gevolg van den opgestopten Witten Vloed ontsteking der baarmoeder en scheede zijnde, dan wordt de behandeling §. 623—§. 627 aangewezen; bijzonder worden, behalve de eenigermate vereischende bloedontlastingen aan den voet, de bloedzuigers in den omtrek der uitwendige schaamdeelen en van den bilnaad, het kwik, de verzachtende stovingen, inspuitingen en laauwwarme halfbaden aangeprezen. De ontsteking der pisblaas wordt daardoor tegengegaan, dat men inwendig mucilaginoso en amandeldranken met nitrum toedient; alsmede

bloedzuigers aan den bilnaad en op de schaamstreek zet, en, naar omstandigheden, eene algemeene bloedontlasting, weekmakende pappen en lavementen, inwrijvingen van hyosciamus - olie over de schaamstreek, laauwwarme en verslappende baden, voorschrijft. — De Bubonen, welke bij den opgestopten Witten Vloed alleenlijk door medegevoelighed ontstaan en niet afhankelijk zijn van eenen door het venerische gift voortgebragten witten Vloed, behandelt men zóó, dat derzelver lastige en nuttelooze ettering belet, daarentegen derzelver verdeling bewerkt worde. Men neemt de ontsteking der baarmoeder en scheede weg, naar verscheidenheid van den aard, en in het begin, en zoodra er maar blijken van bubo zich voordoen, dan wende men koude omslagen, bijzonder uit loodmiddelen, aan; doch bij eene reeds ontwikkelde ontsteking der klieren worden er bloedzuigers zoo dicht mogelijk op de lijdende plaatsen gelegd, vervolgens de laauwwarme stovingen, waartoe men bij prikkelbare gestellen het liefst de herb. hyosc. en cicut. neme. Gaat de bubo tot ettering over, gelukt zulks voorspoedig en geregeld, dan bevordert men dezelve door warme pappen, en behandelt de tot ettering overgegane Bubonen.

§. 737.

De pisopstopping als een gevolg van den opgestopten Witten Vloed, kan of van een' ontstoken' of van een' krampachtigen aard zijn. In het eerste geval, wanneer de symptomen der cystitis dezelve vergezellen, zijn aderlating, bloedzuigers, verzachtende klisteren, laauwwarme stovingen en pappen, en in-

wen-

wendig bijzonder amandeldranken aangewezen. — Ontstaat de pisopstopping daarentegen als een gevolg van de kramp der blaas, dan worden inwendig antispasmodica, namelijk het opium en kamferemulsiën, laauwe en slijmerige dranken aangewezen, waarmede men antispasmodische inwrijvingen en klisteren met groote giften opium gezet, dampbaden en krampstillende, warme pappen boven de schaamstreek vereenigt. Eindelijk wordt in dit geval de aanwending van het catheter zeer nuttig en onschadelijk, hetwelk bij de pisopstopping als een gevolg van ontsteking meer nadeel doet; men moet hetzelfde echter vóórdát het aangewend wordt met verzachtende oliën bestrijken, en zeer voorzigtig, bij eene gepaste ligging der zieke, inbrengen.

§. 738.

De vernauwingen der pisbuis, welke men wel zelden na den opgestopten Witten Vloed waarneemt, worden, ten gevolge eener verdikking van het binnenste vlies der Urethra, welke na eene weggenomene ontsteking nog blijft, gevormd. Dit toeval vereischt, in zoo ver daarmede meestal eene pisopstopping in eenen meerderen of minderen graad gepaard gaat, het inbrengen van een elastiek catheter, en daarbij ook de wegneming der vernauwing zelve. Dit geschiedt of door het inbrengen van bougies uit elastieke hars, of door wegbijting der vernauwingen. Volgt hierop pisopstopping, dan is dezelve of het gevolg eener kramp van den hals der blaas, of eener verharding van de blaas. In het eerste geval bedient men zich inwendig

van de kamfer, het opium, het Dowers poeder, uitwendig van warme dampen uit aromatische en narcotische kruiden aan den bilnaad gebragt, de krampstillende klisteren uit opium, de antispasmodische pappen, inwrijvingen en de laauwwarme baden; in het laatste geval der cicut., belladonna, digital. purpur., de kwik- en spiesglansmiddelen; uitwendig de inwrijvingen van het linim. volat., van het ungt. hydrarg. ciner., digital. purp. en verflappende baden. Soms eindelijk wordt de blaassteek vereischt. — De ontsteking van den endeldarm, vernaauwingen en verhardingen, als gevolgen derzelve, vereischen eene met de ontsteking en de vernaauwing der pisblaas geheel overeenkomstige behandeling; alleenlijk zullen in het eerste geval, behalve de aderlating, bloedzuigers in een genoegzaam aantal, dicht bij den aars geplaatst, amandelranken en verflappende dampbaden, door middel eener spons aangewend, zeer treffende diensten bewijzen, bijzonder om den overgang tot verhardingen of veretteringen tegen te gaan, welke ligt de zieke kan doen uitteren. De behandeling der knoest- en vleeschgezwellen, polypen der scheede en baarmoeder, als ook de ziekten der eijerstokken worden overgeslagen, daar die in het vervolg in bijzondere Hoofdstukken zullen aangewezen worden.

§. 739.

Niet altijd wordt het doel der genezing, namelijk tegenwerking van den ontwikkelden ziektevorm, door de in §. 735—738 bijgebragte aanwijzingen bereikt; maar

maar fomtijds wordt het zeer dringend, om de belette slijmafzondering zoo spoedig mogelijk weder te herstellen. Tot dat einde wende men de zamentrekking en vereeniging verminderende, meer uitzettende middelen aan. Inspuitingen in de scheede, en, indien het mogelijk zij, in de baarmoeder, uit een afkookfel van den scheerling en het bilzenkruid, der maankoppen, der weekmakende kruiden met lijnzaad, inspuitingen uit eene oplossing van de spiesglans- en kwikoxyde, bij voorbeeld van het sublimaat, warme dampen, door middel eener spons aan de teeldeelen gebragt, stovingen van den onderbuik en der teeldeelen uit een afkookfel van weekmakende kruiden of van zeep, olieachtige, verzachtende inwrijvingen, halfbaden, voetbaden en mosterdpappen of Spaanschevlieg-pleister aan den binnenkant der dijen, zijn de middelen, welke aangewezen worden, en de gestoorde afscheiding weder herstellen.

§. 740.

Het gelukt echter niet altijd, om den Witten Vloed weder te voorschijn doen komen. Het gevaar, dat door deszelfs opstopping te weeg gebragt wordt, kan fomtijds daardoor verwijderd worden, wanneer men andere afscheidingen zoekt te bewerken; bij voorbeeld van zweet, buikloop, enz. Hierom zijn in het laatste geval zelfs zachte purgeermiddelen (*),
 bij

(*) Geen middel is er, hetwelk meer aan dit oogmerk zal voldoen, dan de rhabarber. HOFFMANN zeide reeds: *ex omnibus vero laxantibus, in hoc morbo prescuis, certe eminent rhabarbarina, eo quod praeter laxantem etiam*

bij voorbeeld van tamarinde, middelzouten en foortgelijke, zeer dienstig bevonden; in vele gevallen heeft ook een fontanel deze ziekelijke afscheiding hersteld. Voor het overige blijve het aan het oordeel van den Arts overgelaten, in hoe ver deze of gene afscheiding zonder gevaar kan vermeerderd worden, waartoe niet zelden de Natuur zelve door vroegere verschijnselen den weg aanwijst.

LITTERATUUR.

§. 741.

GUERN. ROLFINCK, *de fluore albo mulierum*. Jen. 1661. 4°

GEORG. WOLFFG. WEDEL, *de fluore albo*. ib. 1682. 8°.

JUST. VESTI, *de fluore albo*. Erford. 1697. 4°.

THEOPH. BONETUS, *Sepulchretum*. Libr. III. Serm. 31. obs. 6.

JUCH, *diss. sistens virginem fluore albo laborantem*. Erford. 1730. 4°.

Dezelfde, *de fluore albo*. ib. 1731. 4°.

LUTHER, *de fluoris albi indole et cura*. ib. 1731. 4°.

KALTSCHMID, *de fluore albo benigno*. Jen. 1739. 4°.

ALLEN, *de fluoris albi caractere, et notis quibus cum gonorrhoea convenit vel differt*. Lugd. Bat. 1751. 4°.

JOAN.

blande balsamicam et amaricantem recondunt virtutem, quae acidum vitiosum corrigit, partes dejectas egregie roborat.

Onder de uitwendige middelen is er geen, hetwelk mij in den Witten Vloed, vooral in het eerste begin van denzelven, meerder nut bewezen heeft, dan het sublimaat, in eenen vloeibaren vorm, bij voorbeeld de aqua phagad. met of zonder water verdund, en eenige malen daags de teeldeel en daarmede gewasschen.

- JOAN. JUNCKER, *de fluore albo, titulo et ortu benigno, curatione autem saepius malignâ. Hal. 1752. 4°.*
- JOANN. MORGAGNI, *de sedibus et causis morborum. Epist. XLVII. art. 12, 14, 16, 17, 18, 19, 27.*
- RAULIN, *traité des fleurs blanches. Par. 1766. 12°.*
- VAN DER HESP, *de leucorrhoea. Lugd. Bat. 1771.*
- SHORE, *de fluore albo. Edinb. 1777.*
- KEATING, *de leucorrhoea. ib. 1780. 4°.*
- STRICKLING, *de fluore albo climacterico vetularum. Duisb. 1781. 4°.*
- TRNKA DE KRZOWITZ, *Historia leucorrhoeae. Vindob. 1781. 8°.*
- STOLL, *praelect. II. N°. 382. 409.*
- Dezelfde, *Rat. medend. P. VII. pag. 155.*
- FR. HOFFMANN, *Consultat. Cent. II. et III. N°. 106. seq.*
- BALDINGER, *N. Magaz. III. B. p. 265. IX. B. p. 135.*
- CHAMBON DE MONTAUX, *von den Krankheiten unverheiratheter Frauenzimmer.*
- JOHNSTON, *de leucorrhoea. Edinb. 1785. 4°.*
- SIMPSON, *de leucorrhoea. ib. 1787. 4°.*
- ARENTZ, *leucorrhoeae historia. Duisb. 1788. 4°.*
- ZIMMERMAN, *de fluore albo. Goett. 1788. 4°.*
- Erkenntnisfe, Warnungen und Hülfsmittel gegen eine, sich immer mehr ausbreitente Frauenzimmerkrankheit. Leipz. 1789. 8°.*
- HEROLD, *de fluore muliebri. Altd. 1790. 4°.*
- OTTO, *de fluore albo benigno. Franc. ad Viadr. 1792. 4°.*
- GELPKE, *de fluore albo. Goett. 1793. 4°.*
- WOLFF, *de fluore muliebri. Marb. 1795.*
- BOEHMER, *diss. sistens leucorrhoeae pathologiam. Vittenb. 1798.*
- ESCHENBACH, *de medorrhoea muliebri. Lips. 1798. 4°.*
- FREIJER, *leucorrhoea seu fluor albus. Wurceb. 1799. 4°.*
- HEILMANN, *leucorrhoea, seu fluor albus. ib. 1799.*

J. L. DUSSEIN - DUBREIL, *vom Tripper ohne venerisches Gift und vom weissen Flusse. Mannh. 1799. 8°.*

M. G. THILENIUS, *etwas über den weissen Flusf. In HUFELAND'S Journal VIII. Bd. 1 St. N°. 1.*

J. B. BLATIN, *du catarrhe utérin, ou des fleurs blanches. Par. an X. (1801) 8°.*

C. G. HEINSSE, *kurzer Unterricht über den weissen Flusf. Chemn. 1803.*

CHARL. MANSF. CLARKE, *Beobachtungen über die Krankheiten des Weibes, welche von Ausflüssen begleitet sind. Hannov. 1818. 8°.*



 VIJFDE HOOFDSTUK.

Over den Scirrhus en Kanker der Baarmoeder.

§. 742.

Scirrhus der Baarmoeder noemt men gewoonlijk een onpijnlijk, zeer hard gezwel van dit orgaan, hetwelk den aanleg heeft, om tot Kanker over te gaan, de kegelvormige gedaante der Baarmoeder verteert, en dan met menigvuldige bloedingen, pijnen en eene uitvloeijing van eenen stinkenden en bijtenden etter vergezeld gaat. Voor het overige is het zeer moeilijk, een voldoende en omvattend denkbeeld van den Scirrhus der Baarmoeder te geven, daar er nog andere gezwellen en verhardingen van dit orgaan aangetroffen worden, die meer of minder hard zijn, onpijnlijk blijven, en, ook bij eene vorige hardheid van eenen minderen graad, toch tot de kankerzweer overgaan.

§. 743.

De Scirrhus bestaat zelden de geheele Baarmoeder. Het meest echter en bijna eigenaardig is de mond en de hals van dit orgaan de zitplaats der kwaal; en dit wel niet zonder grond, daar beide, om derzelver vorming, ligging en verrigting, bij voorkeur aan die invloeden blootgesteld zijn, welke het ontstaan dezer vreesfelijke ziekte begunstigen. Aan het ligchaam en den bodem van den Uterus kunnen enkele plaatsen verhard zijn; in de zeldzaam.

zaamste gevallen doet zich de scirrheuse verharding aan de voelbare deelen der Baarmoeder plaatselijk beperkt voor, zonder dat ook het overige weeffel van dit orgaan ziekelijk veranderd, gezwollen, verdikt of verhard is.

§. 744.

Dezelfde veranderingen, welke men bij den door Scirrhus aangedanen Uterus aantreft, worden ook zeer dikwijls te gelijker tijd aan de tot dezelve onmiddellijk behoorende, of daar naastgelegene vormfels waargenomen, hetzij die uit algemeene oorzaken, welke tot de ziekte der Baarmoeder aanleiding gaven, of als gevolgen van den door scirrheusen ziekelijk veranderden Uterus ontstaan. Zoo kunnen de trompetten van Falloppius in grootte toegenomen, ongemeen hard, of aan derzelver voorste opening tegennatuurlijk gezwollen en hard, alsmede de franjeswijze verlengingen zoodanig in de massa van het geheel doorweven zijn, dat ook slechts het geringste gedeelte in den vorm van dunne draden overig blijft, of de opening van het kanaal is gezwollen, dik, hard en gesloten, de franjeswijze verlengingen als blazen gezwollen en ziekelijk verwijd. Beide eijerstokken, of een derzelve, het meest de linker, zijn ziekelijk (*), in grootte toe-

(*) Drie door den Schrijver waargenomene gevallen van zwangerheid met Kanker van den Uterus gepaard, vertoonde bij de Lijkopening geene zieke eijerstokken, hetgeen ook twee malen door denzelven bij eene steatomateuse verharding waargenomen is. Over het geheel schijnt

toegenomen, gezwollen en hard, fomtijds ongewoon hard en in derzelver geheele masfa verdikt; of met een meer of min dik of vloeibaar lympe gevuld. — De pisblaas is zeer dikwijls gelijktijdig, bijzonder aan derzelver achterften wand, verdikt, de tusfchenruimte van derzelver weeffel met uitgestort lympe gevuld: fomtijds, gelijk de Schrijver eerst twee jaren geleden waarnam, geheel met kalkaardige zamengroefels omgeven en bijna fteenhard op het gevoel, de blaas zelve verhard, fomtijds flechts de pisbuis of de geheele blaas, waarbij, gelijk bij eene andere door den Schrijver waargenomene zwangerheid met verharding van den Uterus, zelfs de pisleider en de nieren gezwollen, verhard of op eene andere wijze ziekelijk veranderd kunnen zijn.

§. 745.

Daar ook andere gezwollen en verhardingen in de Baarmoeder ontftaan kunnen, die noch het karakter van den Scirrhus, noch eenen, aan dezen flechts eigendommelijken aanleg hebben, om tot Kanker over te gaan, zoo wordt er derhalve een naauwkeurig onderzoek vereifcht, om die goedaardige en dikwerf geheel onfchadelijke verhardingen en ge-

fchijnt eene gezonde vorming der eijerftokken voor de mogelijkheid ter bevruchting belangrijker dan die van den Uterus te zijn; de Schrijver heeft, bij de in den hoogften graad door den Kanker en het vleefchgezwel geftoorde gezonde vorming van den Uterus, nogtans de zwangerheid met geheel en al voldragene kinderen waargenomen.

gezwollen van den Scirrhus der Baarmoeder te onderscheiden, gelijk men soortgelijke ziekelijke verhardingen aan de borsten waarneemt, die somtijds voor scirrheuse verhardingen gehouden en als de zoodanige behandeld worden.

*Kenteekenen van den Scirrhus en Kanker
der Baarmoeder.*

§. 746.

De Scirrhus der Baarmoeder wordt, zoo lang dezelfde nog Scirrhus is, aanvankelijk zeer ligt miskend; de teekenen zijn zeer bedriegelijk, en het ontstaan en de vorming van denzelfden doen zich meestal met zulk eene geringe hevigheid en onbeduidende toevallen voor, dat de zieke — het haar dreigend gevaar niet vermoedende — daarop geene acht slaat, en ook gewoonlijk dán eerst de hulp van den Arts begeert, wanneer de Scirrhus tot Kanker tracht over te gaan.

§. 747.

De Diagnosis regelt zich 1) naar soortgelijke verhardingen in andere vormfels, 2) naar het onderzoek, 3) naar verscheidene verschijnselen, welke de kwaal vergezellen en waarover de zieke klaagt.

§. 748.

Verhardingen in andere vormfels van eenen scirrheusen aard brengen niet zelden ter diagnosis van den Scirrhus der Baarmoeder bij, en be-

bewijzen, dat de Scirrhus alsdan niet als een plaatselijk gebrek, maar als het gevolg eener ziekte van het watervaatstelsel in het algemeen moet beschouwd worden. Meermalen reeds heeft de Schrijver ongehuwde personen, die nimmer gekraamd hadden, en Vrouwen met Scirrhus aan beide borsten behandeld, die te gelijker tijd Scirrhus der Baarmoeder hadden.

§. 749.

Het onderzoek moet met de meeste nauwkeurigheid aan de buitenste bekleedfelen van den onderbuik, door de scheede en den endeldarm, verrigt worden (*).

§. 750.

Bij het uitwendig onderzoek vindt men den onderbuik eenigzins gezwollen, en de zieke geeft een gevoel van volheid te kennen; uit de scheede doet zich eene uitvloeijing voor, die, zoo lang de Scirrhus nog niet tot kankerzweer is overgegaan, niet stinkende is, zich als een gewone chronische witte vloed verhoudt, en dikwijls geene andere pijnlijke gewaarwordingen veroorzaakt, dan in een gewoon geval. De uitwendige tēeldeelen vindt men
meer

(*) Dr. W. J. SCHMITT's *Erfahrungsergebnisse über die Exploration bei dem Scirrhus und Krebse und andern krankhaften Zuständen des Uterus*. In HARLESS *Jahrbüchern der deutsch. Medicin und Chirurgie*. Nürnberg. 1813. I. Bd. N^o. II. S. 74, en gedrukt in des Schrijvers *obstetr. Schriften* enz. Wien. 1820 8^o. S. 100.

meer of min gezwollen; zeldzamer voelt men de harde Baarmoeder boven de schaambeenderen, ten zij dezelve gezwollen was en de kwaal in den bodem derzelve oorsprong genomen had.

§. 751.

Bij het inwendig onderzoek is het in de scheidde vooruitstekende gedeelte van den hals der Baarmoeder in het tijdperk van den Scirrhus niet heet, maar meer of min hard, vast, oneffen, rimpelig, ruw, met omgekrulde en als ingekerfde lippen van den moedermond; deze is bij Vrouwen, die reeds gekraamd hebben, meer of min geopend, bij onbezwangerden meer gesloten, de moedermond gemeenlijk rond, en de lippen zeer naar buiten gezwollen en verheven, knobbelig en zeer hard op het gevoel. In het tijdperk van den Scirrhus kan het scheiddedeel, bijzonder bij ongehuwden, en wanneer er geene bijzondere schadelijkheden medewerken, die den overgang van Scirrhus tot Kanker begunstigen, vele jaren lang, als bij dergelijke scirrheuse verhardingen der borsten, zonder pijn wezen; bovendien begint dezelve spoedig gevoelig en pijnlijk te worden. Heeft zich de scirrheuse verharding ook verder in de Baarmoeder verspreid, of is het werktuig van die ziekelijke verandering tevens de bodem en het ligchaam der Baarmoeder geweest, dan gevoelt men ook pijn en hardigheid in het scheiddegewelf; in dat geval kan het scheiddedeel ook volkomen gezond en in deszelfs ongestoorden vorm zijn, of het is hoogstens, als een gevolg van den gestoorden omloop der vochten, maar eenigzins gezwollen;

een

een geval, dat zelfs in het tijdperk van de kankerzweer, en als gevolgen van dikwijls ontstane Metrorrhagiën zeer misleiden en den Arts in den waan kan brengen, dat er geen Scirrhus en Kanker van den Uterus aanwezig zij (*); deze Scirrhus is, wel is waar, zeldzamer, en neemt niet zoo spoedig toe, als die, welke aan het scheidedeel der Baarmoeder het eerst ontstaat, en waarop de schadelijke invloeden meestal werkzaam zijn. Voor het overige moet men ook elke groote gevoeligheid der scheede en van het scheidegewelf niet voor die van den scirrhousen baarmoederhals houden: eerst na eene aanhoudende drukking tegen het scheidedeel of tegen het in het scheidegewelf voelbare onderste segment der

(*) Ik had (zegt de Schrijver) eerst voor eenigen tijd bij eene Dame de gelegenheid, om dezen Scirrhus en Kanker der Baarmoeder waar te nemen; de bloedvloeijing hield nimmer geheel op, en de Huisarts — geen Vroedmeester zijnde — mijne diagnosis in twijfel trekkende, liet buiten mijn weten het onderzoek door eenen der Vroedkunde uitoefenenden Heelmeester verrigten, die verklaarde, dat het scheidedeel zeer gezond, niet hard noch gezwollen, en er noch Scirrhus noch Kanker aanwezig was. Ik kreeg mijn afscheid, de zieke scheen mijne diagnosis zeer euvel op te nemen en koesterde nieuwe hoop. Dan, deze blijdschap duurde niet lang; ik was van mijne zaak zeker, daar ik, onmiddellijk na de maandelijksche periode, welke steeds in overvloed plaats had, door eenen binnen den geopenen moedermond ingebragten vinger, den vermelden zieken toestand van den Uterus ontdekt had; de treurige gevolgen dezer vreesfelijke ziekte bleven niet weg.

der Baarmoeder, en fomtijds eerst na gedaan onderzoek, doet zich eene doffe pijn in de Baarmoeder voor. Ook is bij den Scirrhus van dit orgaan de aandoenlijkheid alsdan op zich zelve verhoogd, of dezelve wordt al spoedig door het onderzoek opgewekt, wanneer de Baarmoeder met derzelver bodem, bijzonder naar achteren gedrukt, het heilighen raakt, waar de groote zenuwen gelegen zijn. De Baarmoeder is, zoo als men reeds aangemerkt heeft, bij den volkomen ontwikkelden Scirrhus dikwijls lang geheel onpijnlijk, deels wegens de bijgebragte omstandigheden, deels wijl derzelver zenuwen door de in haar weeffel uitgestorte, gestolde en verharde Lympe bedekt, en deswege in derzelver regelmatige verrigting gestoord zijn, zoo als het pijnlijk gevoel onmiddellijk in de Baarmoeder eerst bij den overgang tot Kanker of als een gevolg der eigendommelijke ontsteking, welke door de ziekelijke verandering van het orgaan veroorzaakt wordt, ontstaat. — Met betrekking tot de hette der scheede en van het scheededeel merke men aan, dat die, zoo lang de verharding der Baarmoeder nog in het tijdperk van den Scirrhus zich bevindt, niet alleen niet toeneemt, maar zelfs dikwijls veel geringer dan bij eenen gezonden Uterus is, wijl de in den geregelden toestand ter voeding van dit orgaan bestemde vaten, door de aanwezige ziekte en derzelver eigendommelijk wezen, in hunne verrigtingen gestoord zijn. Het verharde deel der Baarmoeder wordt alleenlijk door de in de uitgewasemde stolbare Lympe nieuw voortgebragte vaten beziel, en als de scirrheuse plaats eenen zeer grooten omvang of

of de geheele Baarmoeder beslaat, waardoor derzelver groote vaten, bijzonder de wijngaardsvlecht (*plexus pampiniformis*), zeer gedrukt, en in derzelver verrigtingen gestoord worden, dan doen zich de verschijnselen des eigendommelijken levens van het verharde gedeelte in dienzelfden graad levende voor, naar mate de middelerwijl nieuw gevormde vaten derzelver volkomene ontwikkeling verkregen hebben. — Met betrekking tot den stand van het scheededeel merke men op, dat dezelve hoog ligt en moeilijk te bereiken is, wanneer de gezwollene Baarmoeder ver buiten het kleine bekken rijst, en boven de schaambeenderen gevoeld wordt; anders treft men dezelve bij eene plaatshebbende daling en onvolkomene uitzakking van den Uterus diep tusfchen de middelste en onderste opening, en zelfs zeer dicht bij deze aan; fomtijds geheel naar buiten, gelijk de Schrijver bij eene volkomene uitzakking waargenomen heeft. De scirrheuse verharding van den Uterus kan men ook zeer dikwijls bij het inbrengen van den vinger door den endeldarm ontdekken, en men verzuime bijzonder bij de twijfelachtige diagnosis der uit den bodem en het ligchaam voortfpruitende kwaal het onderzoek langs dien weg niet. De endeldarm is niet zelden vernaauwd, gezwollen, en met zakaanbeijen bezet, die reeds vóór de ziekte van den Uterus aanwezig waren, of eerst als een gevolg der toenemende verharding en van den gestoorde omloop des bloeds hebben kunnen ontstaan.

§. 752.

Als de Scirrhus tot Kankerzweer overgaat, dan begint dezelve meestendeels gevoelig en pijnlijk te worden ; dit is het oogenblik , dat de eigendommelijke zweer van het zieke orgaan door de zoo gevaarlijke ontsteking, welke door de opgewekte levenskracht der in de uitgewasemde en verharde Lymphe nieuw voortgebragte vaten ontstaat, wordt voorafgegaan. Vóór het verschijnen der maanstonen, wanneer deze verrigting nog niet, ten gevolge van de jaren of den Landaardtypus, heeft opgehouden, nemen de pijnen bijzonder in het kruis, en de steken door het bekken zeer toe, en verminderen zeer dikwijls met de verschijnende bloedontlasting; buitendien wordt er een sereuse, of dun waterachtig vocht, meestal van eene witgele, of naar bloedwater zweemende kleur ontlast; dit vocht heeft voornamelijk bij het toenemen van de kankerzweer eenen eigendommelijken zeer viezen en stinkenden reuk, waardoor zoo dikwijls de Arts reeds de vreesfelijke kwaal, welke de zieke dikwerf aan den rand van het graf brengt, bemerken kan. Intusschen is dit doorgaans niet altijd het geval, de specifieke reuk kan ook wegblijven, zoo als de Schrijver zoo dikwijls heeft waargenomen, en nogtans kondigt de uitvloeiing den overgang van den Scirrhus tot Kanker aan, waardoor de Uterus of in den bodem en het ligchaam, of aan den hals der baarmoeder, reeds van belang kan aangetast zijn. Men late zich derhalve niet misleiden, offchoon, wegens den wegblijvenden reuk, der zieke en den omstanders de kwaal minder lastig wordt en de zieke langer kan blijven voortleven.

ven. Bij vele Vrouwen, die de maanftonden hebben, heeft het uitvloeiende ftondenbloed geen reuk, bij anderen ftinkt het van de eerfte verfchijning af onverdragelijk, en zij bevinden zich wel; doch het is altoos een flecht teeken, wanneer de maanftonden bij Vrouwen, die te voren nimmer geftonken hebben, zulks beginnen te doen. — Bij den overgang der scirrheufe verharding tot kankerzweer, bijzonder wanneer de ziekte uit den bodem en het ligchaam van den Uterus voortspruit, doet zich aanvankelijk het fcheededeel nog gaaf voor; allengskens en als zij in het tijdperk van den Scirrhus zeer hard was, wordt hetzelve vaster, meer oneffen en ruwer, de lippen van den moedermond zwellen meer op en worden pijnlijk bij de aanraking; deze opent zich van tijd tot tijd meer of min; uit denzelven komen allengskens fungeuze uitwasfen voort, die benevens de moedermond zelfs bij de geringfte aanraking met den vinger bloeden, en als de scirrheufe verharding in den baarmoederhals begint te ontftaan, dan wordt het fcheededeel allengskens geheel aangetast. Intusfchen verdient het opmerking, dat fomtijds in het tijdperk van de kankerzweer het fcheededeel wel zeer gezwollen, maar ongemeen week, fponsachtig en met vele in- en uitwendige welige uitwasfen (fponsachtige uitwasfen) omgeven bevonden wordt, welke de geheele fcheede aanvullen, bij de minfte aanraking en ook buitendien zeer fterk bloeden. Deze is de zoogenaamde Fungus haematodes (*), die, naar des Schrijvers

(*) Belangrijk en lezenswaardig zijn de waarnemingen

vers waarnemingen, zoo ligt na verhandingen van den Uterus, welke door de zwelling der aderspattige vaten van den Uterus veroorzaakt worden en een gevolg der aanbeijen zijn, ontstaat. Hier is het geval, dat de Uterus nimmer zoo hard wordt in het tijdperk der verharding, maar spoediger tot verzwering overgaat, en dat de zitplaats der ontsteking in dit tijdperk meer in de aderen, dan in de nieuw voortgebragte slagadervaten schijnt plaats te hebben.

§. 753.

Het beloop van de kankerzweer wordt door de volgende verschijnselen vergezeld: aanhoudende persing op de teeldeelen, even als bij de uitzakking der Baarmoeder; pijnen bij den stoelgang, pislozing en bijslaap; verlamming van de eene of andere dije en aderspatten (*varices*), hevige, brandende en aanhoudende pijnen diep in het bekken, die, op het gebruik van sommige middelen, wel verminderen, maar nimmer geheel wegblijven, en des avonds het hevigste zijn; deze brandende pijnen wisselen zeer dikwijls met hevige steken af, welke door den omtrek der Baarmoeder heen vliegen. De uitvloeiing eener vochtigheid van zeer verschillende kleur en zelfstandigheid uit de scheede neemt meer en meer toe; reuk van zich gevende, is die zeer doordringend en stinkend, wisselt nog menigvuldiger met bloed af, ontvelt de naastliggende deelen, dijen en schaamlippen, en veroorzaakt pijnen.

§. 754.

desaangaande door den Engelschen Heelmeester JAMES WARDROP opzettelijk in het werk gesteld en in het licht gegeven, onder den titel van: *Waarnemingen over den Fungus haematodes*. Amst. 1819. 8°. met pl.

§. 754.

Als de ziekte nog langer aanhoudt, dan komen de volgende verschijnselen er bij: 1) de verrigtingen der reproductie worden in eenen hoogen graad gestoord, gebrek aan eetlust, verstopping, drukking op de maag, neiging tot en werkelijk braken, zuchtige zwelling, groengele gelaatskleur, kwaadsappigheid, uitteringen en sluipende koortsen, zijn de verschijnselen, waaraan men die storingen kan herkennen; 2) de maanstonen, wanneer zij niet reeds vroeger zijn opgehouden, blijven gemeenlijk weg, of komen met de hevigste pijnen te voorschijn; 3) de zieken krijgen eenen hinkenden gang, stellen gaarne de handen in de eene of andere zijde, en gevoelen, al hinkende, de pijnen in eenen hooger graad; 4) des avonds klagen de zieken over zware hoofdpijnen, trekkingen en pijnen in den hals, in de armen en voeten, in de vingers en teenen, waarmede hoesten gepaard gaat; 5) de kankerachtige verzwering tast de naastliggende deelen, de scheede, de pisblaas (*) en den endeldarm aan, en in zeldzame gevallen heeft men zelfs het colon doorknaagd bevonden (†); hierbij komen

(*) De Schrijver bezit in zijne verzameling een preparaat, waarvan de pisblaas digt bij derzelver hals zoodanig doorknaagd is, dat men den vinger uit den voorsten wand der scheede in de holte der blaas brengen kan.

(†) HUFELANDS *Journal der praktischen Heilkunde*. IX. B. 2 St. S. 164. De waarneming is ook uit dien hoofde belangrijk, wijl dezelve een bewijs oplevert, hoe ligt de Kanker der Baarmoeder miskend wordt, en hoe noodzakelijk het is om een onderzoek te doen.

men zweren in het bekkenhol, de beenderen worden door caries aangetast en bros; 6) sluipende koortsen en uittering van het ligchaam, de uitvloeijing van stinkenden etter en bloed, stank en pijn nemen toe. Dikwijls worden er geheele stukken sponsachtige uitwassen en wanstaltigheden der Baarmoeder ontlast, ja men heeft waargenomen, dat deze zich eindelijk geheel losmaakte en uit de scheede viel. Eindelijk volgt de dood, of allengskens door uittering, door eene plotselijk ontstane bloedstorting, of door stuiptrekkingen.

§. 755.

De Scirrhus en Kanker der Baarmoeder kunnen, schoon zelden, met de zwangerheid, menigvuldiger echter met de te overvloedig, en met pijnen verschijnende, maanstonen verwisfeld worden.

§. 756.

Van de zwangerheid onderscheidt zich de Scirrhus der Baarmoeder, dat bij gene volstrekt geene aanleidende oorzaken voorafgingen, waardoor deze konde voortgebracht worden. De maanstonen blijven gewoonlijk in de zwangerheid weg, of verschijnen nog eenige malen zonder pijn, en houden den bepaalden typus. Bij den Scirrhus der Baarmoeder vloeijen aanvankelijk nog de maanstonen, maar gewoonlijk met pijn in den rug, lenden en schaamstreek, en de uitvloeijing is of zeer spaarzaam, of sterker dan anders bij de overvloedige maanstonen, en daarop wordt de zieke zeer krachteloos; zelden blijft de maandelijksche zuivering bij den Scirrhus weg. In de zwangerheid zwellen de bors-

borsten, maar het gezwel is week; de tepels ondergaan veranderingen, worden grooter en de kring is veranderd. Bij den Scirrhus blijven de borsten of geheel slap, en ondergaan volstrekt geene veranderingen, of men treft dezelve over het geheel, of aan de eene of andere plaats verhard aan. De schaamstreek is bij den Scirrhus der Baarmoeder meestal pijnlijk, voornamelijk bij de aanraking; in de zwangerheid niet. De moedermond wordt wel dikwijls, gelijk de Schrijver waarnam, rond bevonden; doch de kegelvormige gedaante der Baarmoeder zelve is meestendeels hard, misvormd, kraakbeenig en ongelijk, en op het einde van het tweede en derde tijdperk geheel verteerd. Bij de zwangerheid is de moedermond altoos van eenen ronden vorm, week, niet pijnlijk, en wordt, naar mate de zwangerheid duurt, weeker. In de zwangerheid doen zich aanvankelijk onderscheidene aandoeningen voor; naderhand verdwijnen deze, en de zwangere bevindt zich wel. Bij den Scirrhus der Baarmoeder wordt in den beginne de gezondheid niet gestoord, zulks geschiedt later, en hoe langer de Scirrhus duurt hoe meer; de zwangerheid duurt korter, de Scirrhus veel langer. Voor het overige kan de zwangerheid met den Scirrhus en Kanker gepaard gaan, gelijk Profesfor BOER in zijne vroedkundige verhandelingen, Doctor SOMMER in STARCK's *Archiv für Geburtshülfe* (III. B. 2 St. bl. 288) en de Schrijver belangrijke waarnemingen daarover medegedeeld hebben (*). De diagnosis is in dat ge-

(*) Des Schrijvers *Journal für Geburtshülfe, Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten*. III. B. 1 St. §. 50—57.

geval zeer moeilijk, en er is niet altoos, maar nogtans dikwijls, eene ontijdige verlossing te duchten.

§. 757.

Van de met pijnen verschijnende maanftonden (*) en maankolijk onderscheidt men den Scirrhus en Kanker der Baarmoeder, voornamelijk door een gedaan onderzoek. De bij §. 750—§. 753 bijgebragte kenteekenen zullen niet aanwezig zijn, wanneer het geen Scirrhus en Kanker der Baarmoeder is; en bij deze doen zich de pijnen niet geregeld alle vier weken, maar dagelijks gevoelen. — Nog ligter kan de Kanker der Baar-

(Twee door den Schrijver te Berlijn gedane en ook met betrekking tot de Diagnosis zeer leerzame waarnemingen).

C. GOTTL. STRICKER, *de uteri scirrhus et carcinomate cum graviditate complicatis*. Berol. 1820. 8°. (Op bl. 20 vindt men eene uitvoerige beschrijving van een door den Schrijver te Wurzburg waargenomen belangrijk geval). De Schrijver nam de verbinding van den Scirrhus met de zwangerheid, aan het Verlossings-Institut te Berlijn in den vóórlaatsten winter, wederom waar, welke door de zwangerheid en de verlossing volkomen hersteld scheen te wezen.

(*) Ik (zegt de Schrijver) behandelde voor eenige jaren te Wurzburg eene lijderes aan den Kanker der Baarmoeder, welke te voren eenen Chirurijn daar ter plaatse tot haren Arts had. Deze hield nog in het tijdperk van den Scirrhus haren toestand voor menstrua dolorifica et difficilia, en schreef middelen voor, die den overgang tot Kanker zeer verhaastten, welke dan ook dadelijk bij het onderzoek door mij herkend werd.

Baarmoeder voor te fterk verfchijnende maanftonden gehouden worden, juist om de bloedftorting, welke gewoonlijk daarmede gepaard gaat; doch deze onderscheiden zich hierdoor, dat de zieke reeds eenigen tijd te voren dikwijls over pijnen in de fchaamftreek en eene trekking en pijn in het bekken klaagde, de bloedvloeijing zelve met pijnen en andere, den Scirrhus en Kanker der Baarmoeder kenmerkende, symptomen gepaard gaat, het afvloeiende met etter vermengde bloed eene vieze kleur en eenen flinkenden reuk heeft, en bij het onderflaan het kankerachtige, harde en pijnlijke fcheededeel, met den vinger even aanrakende, terftond weder begint te bloeden.

§. 758.

Ook de Baarmoederpolyp konde, wat aanbelangt de diagnosis, tot dwaling aanleiding geven. Het niet aanwezige, verharde of tot kanker overgegane fcheededeel, hetwelk bij den polyp der Baarmoeder, zoodra dezelve buiten den moedermond gekomen is, meer week en verdwenen gevoeld wordt, de niet aanwezige aandoenlijkheid en bloeding derzelve bij het aanraken met den vinger, de afwezigheid van den geheel eigenaardigen, flinkenden reuk en verfcheidene symptomen, die de kwaadaardigheid van den Kanker zoo zeer kenfchetfen, zullen denzelven naauwkeurig doen herkennen. Over de diagnostifche teekenen zal, voor het overige, bij den baarmoederpolyp zelve, in het vervolg breedvoeriger gefproken worden; voorloopig merken hier flechts aan, dat de scirrheufe verharding

met

met eenen polyp kan gepaard gaan, die in den hals of in den bodem of het ligchaam der Baarmoeder kan ontstaan wezen. Twee malen heeft de Schrijver zulks waargenomen, en de polypen wel gelukkig weggenomen; maar de zieken stierven aan de gevolgen van eene tot Kanker overgegane scirrheuse verharding; eene derzelve eerst anderhalf jaar daarna.

§. 759.

Doch de Scirrhus en Kanker der Baarmoeder wordt het ligtst met derzelve goedaardige zwelling en verdikking verwisfeld, welke, uit zeer begrijpelijke gronden, even zoo goede gevolgen van den abortus, der ontijdige en moeilijke, natuurlijke verlosfingen, als deze derzelve oorzaak zijn kunnen (*). De baarmoederhals en moedermond worden namelijk, gezwollen zijnde, nog eens zoo dik als in den gezonden toestand, en voor de Vrouw, door de zwaarte en de drukking der geheele Baarmoeder, lastig; en dit veroorzaakt een gevoel, alsóf dezelve buiten het lijf vallen wilde. Dit dikker worden is een gevolg van aanhoudende, sterke ophooping van bloed in en om de Baarmoeder, en hierom meestal met toevallen van aanbeijen vergezeld, en wel dikwijls met aanbeijen der scheede (*per vaginam*), welke alsdan bij Artsen en Leeken, zelfs bij in het onderflaan geoeffende Vroedmeesters, des te eerder aanleiding ge-

(*) OSIANDER, in de *Göttingische gelehrte Anzeigen*. Jahrg. 1808. S. 1294.

geven tot gisfing, alsof deze toestand een bloedende Kanker der Baarmoeder ware. Deze zwelling en verdikking der Baarmoeder kan het gansche leven door onveranderd blijven, zonder kwaadaardig te worden, wanneer er geene andere oorzaak bijkomt. Dezelve kan door middelen, die de plaatselijke ophooping van bloed verminderen, weggenomen worden; en ook tot wezenlijken Scirrhus en Kanker overgaan, wanneer zekere invloeden daartoe medewerken.

§. 760.

Leerzaam zijn de resultaten, welke SCHMITT (*) ons omtrent het onderflaan mededeelt; deze zijn, volgens hem, dikwerf zeer onderscheiden, somtijds duidelijk, somtijds duister; en geven ons menigvuldige bevindingen aan de hand: de Uterus is in deszelfs omtrek gelijkmatig vergroot, zonder verandering van deszelfs oorspronkelijken vorm. Daarbij is dezelve of hard of week, op het gevoel met of zonder pijn. Zulk een' Uterus, wiens omtrek in een geval zesvoudig vermeerderd was, kon men eenige malen boven de schaambeenderen, als een groot kinderkhoofd door de wanden van den buik heen, voelen. Gemeenlijk ligt dezelve nogtans in dit geval als eene zware massa tamelijk diep in het bekken, en neemt meer of min de geheele ruimte van het bekken in. Wanneer dezelve hoog ligt, dan is het onderzoek door de scheede en de diagnosis zeer moei-

(*) Dr. W. J. SCHMITT, t. a. pl. bl. 79, en deszelfs *obstetr. Schriften*, bl. 100.

moeijelijk; zoo die tevens scheef, voor- of achterwaarts ligt, dan is de gewone stoelgang of pislozing of beiden te gelijk verhinderd en met pijnen en perſing vergezeld. In lichtere graden beſtaat de vergrooting ſlechts in eene geringe toeneming van den omtrek, en is gelijk aan die eener Kraamvrouw van drie of vier weken, of van eene reeds meermalen gekraamd hebbende Vrouw, die de ſtonden heeft, of ook nog geringer. Is de vergroote Uterus tevens hard, dan is de diagnosis gemakkelijk, vooral wanneer die zoo hard als bij den Scirrhus is, of wanneer dezelve volkomen ſcirrheus en bij aanraking gevoelig of zelfs pijnlijk is; is dezelve week, dan is de herkenning veel moeilijker, en men kan (zoo als SCHMITT zelven wedervaren is) dezen toestand voor zwangerheid houden, vooral wanneer tevens de maanſtonden wegblijven of wel ongeregeld vloeijen, en er dringende weeënaardige pijnen aanwezig zijn. De Uterus is in zulke omſtandigheden, als men bij het onderſlaan op het gevoel aſgaat, juist zoo geſteld, als in de derde of vierde maand eener wezenlijke zwangerheid; het ſcheede-deel is gezwollen en week, zelfs de moedermond en hals eenigzins geopend en voor den vinger buigzaam (*dilatabel*). Ook heeft hierbij dikwijls eene ongeregelde bloedvloeijing plaats, welke nu eens ſterker, dan geringer, nu aanhoudend, dan tuſſchenpoozend, nu enkel bloed, dan wederom, gelijk bij den abortus, met ſlijm en bloedklompen vermengd is. In één geval was de zaak zoo bedriegelijk, dat men elk oogenblik eene miskraam, welke echter niet volgde, te gemoet zag; en nadat onder weeënaardige pijnen

ve-

vele bloedklompen afgescheiden waren, braken er binnen in den Uterus van tijd tot tijd abcesfen door, die eene etterachtige met bloed vermengde stoffe gelukkig ontlastten. — Men kan deze verscheidenheden (*Varianten*) ook eene zwelling, opzetting, verdikking van den Uterus noemen, zoo het zeker is, dat noch eene zwangerheid, noch anders eene uitzetting van den Uterus van eenen anderen aard, bij voorbeeld door eenen polyp, de oorzaak is, hetgeen echter meestal eerst onderzocht moet worden, en zich niet altijd, ten minste niet voor 's hands, met zekerheid bepalen laat. — Niet altijd ondergaan alle deelen van den Uterus de beschrevene stofverwisseling. Zulks bepaalt zich dikwijls alleen tot sommige gedeelten van denzelfven. Het scheidgedeelte is hierbij somtijds volkomen vrij, somtijds zeer blijkbaar ziekelijk aangedaan en veranderd. In het eerste geval ontstaat ligt het vermoeden eener plaatshebbende zwangerheid. Wanneer de vergrooting van den Uterus, zelfs bij eene beduidende hardheid van denzelfven, algemeen is, dan zijn de maanstonen meestal zeer sterk, ongeregeld en vóór den tijd, of ook wel zonder tijdperk te houden, dikwijls wederkeerende, in ware, somtijds het grootste gevaar dreigende, bloedstortingen ontaardende, waarbij groote stukken geronnen bloed, onder weeënaardige persende pijnen, afgaan. Somtijds vloeit met het bloed zelfs zeer veel water af, hetwelk des te meer het vermoeden tot eene verborgene zwangerheid geeft, en mischien niet zonder grond, daar verscheidene verschijnselen, die

an-

anders aan de zwangerheid eigen zijn, de vraag billijken, of er onder zulke betrekkingen niet somtijds eene wezenlijke zwangerheid plaats heeft, en de abortus het gevolg der ziekelijke stofverwisseling van den Uterus is, waarbij het ei ontaardt en van de vrucht niets waargenomen wordt. Zeer dikwijls is er ook een wit-, geel-, ook wel bruinachtige slijmvloed, die echter zelden een' flank van zich geeft, tevens aanwezig. — De ziekelijke stofverwisseling bepaalt zich, volgens waarneming, bij uitfluiting en duidelijk tot den hals en het scheedegedeelte van den Uterus, en bestaat in den vergrooten omtrek van dit vormsel, onregelmatige hardheid, of de gezwollene deelen zijn zacht, als opgeblazen, of ook wel sponsachtig op het gevoel, of in een fungus bloemkool- of vijg- of polypaardige uitwas (*Vegetationswucherung*) met of zonder pijn bij de aanraking. Meestal is de voorste, maar zeer dikwijls ook de achterste lip van den moedermond aangetast, wanneer dan bij eene tevens buitengemeen hooge en scheeve ligging van den Uterus het onderflaan moeilijk en somtijds onmogelijk wordt, en wanneer het onderflaan door den endeldarm, (dat men eigenlijk nimmer verzuimen en alleenlijk in zeldzame gevallen uitstellen moest) slechts de noodige opheldering geven kan. In dit geval vindt men met verwondering op eene bepaalde hoogte van den endeldarm door den voorsten wand van denzelven een hard gezwel, dat, gedrukt wordende, gewoonlijk pijn veroorzaakt en menigmaal zoo sterk vooruitsteekt, dat men gedeeltelijk, of ook wel in het geheel niet,

(ten

(ten minste in zekere standen van het ligchaam en op eenen bepaalden tijd) in den endeldarm kan komen, en het ook somtijds zoo dicht, vrij en onbewe- gelijk bij denzelven gelegen is, dat men hetzelfde ligt voor eene ziekte van den endeldarm houden kan. Het moeilijkste is de diagnosis, wanneer het scheidedeel slechts weinig van deszelfs gezonden toestand afwijkt, dewijl de Natuur ten opzigte van dit vormfel, ook bij eene plaatshebbende ongeschondenheid, vooral bij diegenen, welke meermalen gekraamd hebben, menigvuldige spelingen veroorlooft. Pijnlijke gewaar- wordingen in den buik, in het bekken, in het kruis bij den bijslaap, de maanstonen, pislozing en stoel- gang; veranderingen van het weder; gemoedsbewe- gingen, enz., en onderscheidene soorten van uitvloei- jingen zullen hier de noodige ophelderingen moeten geven, of de verscheidenheid van het scheidedeel eene ziekelijke beteekenis hebbe of niet. De Schrijver kent geen vormfel aan het Vrouwelijk ligchaam, dat door toevallige invloeden veranderlijker en wis- selvalliger in deszelfs vorm ware, dan het scheidede- deelte van den Uterus of den zoogenaamden moeder- mond. Bijna alle werktuigelijke verrigtingen, hetzij ziekelijke of natuurnatige, hebben op de gedaante van dit vormfel invloed; maar welke, inderdaad, dikwijls zoo zwak en onmerkbaar is, dat er eene fijne en welgeoefende behendigheid toe behoort, om het veranderde kenmerk daarvan goed te onderscheiden. De maanstonen, de bijslaap, de zwangerheid en voornamelijk het baren, schijnen van de toevallig- heden des Vrouwelijken levens, die hiertoe kunnen

betrokken worden (want over vormingsafwijkingen en gedaanteverwisselingen, welke van de jaren en van den wasdom afhangen, wordt hier niet gesproken), de voornaamsten en vermogendsten te zijn. Onder de ziekelijke toestanden bekleeden gewis (behalve de Scirrhus en Kanker) de venusziekte, de jicht en scrofelen den eersten rang. Er blijft voor de latere onderzoekers een groot vraagstuk over, om, namelijk, het specifiek onderscheid van elke dezer stofverwisselingen op te sporen, en naar een onfeilbaar en de bevatting van het vroedkundig gevoel overeenkomstig kenteeken te bepalen, daar er, volgens de wetten der werktuigelijke stofverwisseling, moet aangenomen worden, dat ieder eigenaardig, d. i. naardat de verschillende afwijkende verrichtingen in een orgaan zijn, deszelfs stoffelijk werktuig op eene eigene wijze veranderd, en door deszelfs vorm een bepaald kenmerk te kennen geeft. — Het ligstste is de diagnosis bij een fungeus bloemkool- vijf- of polypachtig vleeschuitwas van het scheidgedeelte, zonder telkens bij de aanraking pijn te veroorzaken, gewoonlijk gepaard met chronische bloedvloeijingen, die met slijm- en waterachtige uitvloeijingen, onregelde meestal sterke maanstonen en met andere ongemakken afwisselen. Deze vorm is de ongunstigste. Dezelve geeft niet alleen te kennen, dat de kwaal over het geheel ongeneeslijk, maar niet eens ook voor eene beperking vatbaar is. Ook de meer zeldzame vorm, wanneer de stofverwisseling van het scheidgedeelte in eene weeke, gladde zwelling bestaat, bijzonder wanneer de gezwollene lippen

van

van den moedermond daarbij omgekruld, omgebogen of buitenwaarts gekeerd en zeer vochtig zijn, is zeer bedenkelijk: de exulceratie, dat is, de overgang tot openen Kanker, is dan niet ver meer. — Een hoofdvorm bestaat in die verscheidenheid, welke eigenlijk de kankerachtige mogt genaamd worden, de laatste stofverwisseling, wanneer de kwaal tot Kanker overgaat of reeds overgegaan is. Deszelfs aanwezen is kenbaar: aan eene buitengewone grootte van het ten duidelijkste aangedane scheidgedeelte; aan gezwollene, op verscheidene wijze gekrulde lippen van den moedermond; aan twee wisselvallige, nu eens gladde, gelijke, somtijds en meestal ongelijke, hobbelachtige uitgroefels, welke dikwijls veel overeenkomst met eenen sponsachtigen of verzwerenden polyp of Fungus haematodes hebben, uitpuilende gezwollen vormende, of die, zonder zulke uitwasfen, als verscheurde en menigvuldig gevormde lappen zich voordoen; aan eene dikwijls verdikte, harde, hobbelige, vernauwde scheede, ontaarde endeldarm en pisblaas, welke somtijds geheel doorknaagd worden, en drek- en pisfistelen doen ontstaan; aan eene ichoreuse, wankleurige, met bloed vermengde, dikwijls met bloedvloeijingen afwisselende en steeds stinkende, scherpe, dikwijls aasachtige uitvloeijing uit de scheede, waarbij de afvloeiende vochten dikwijls geheel helder en waterig als Lympe, ja ware Lympe zijn, welke uitvloeijing, om het groot verlies van vochten alleen, bijna toereikende is, om de zieken ten grave te doen dalen, en waarmede, nu en dan,

dan, vooral ten tijde der maanftonden, een gevaar dreigende bloedstroom afwifelt, aschgrauwe, bij wijze van maden met de uitvloeijing fomtijds afgaande, ondragelijk stinkende klonters, die men als oude kaas kan plat drukken, en het fcheedegedeelte fomtijds geheel verteren; aan eene groote aandoenlijkheid der billen en van den nabijgelegenen omtrek van het bekken, welke, wel is waar, geen pathognomisch teeken van den Kanker der Baarmoeder is, maar toch ook menigmaal waargenomen wordt; aan eenen eigenaardigen, de geheele atmosfeer rondom de zieke, alsmede hare kleeding en dekking doordringenden stank, benevens aan een karakteristiek voorkomen en gelaat, welke toch niet, naar het gevoelen van sommige Artsen, van zulk eene eigendommelijkheid is, dat niet ook kachexien en kakochymien van eenen anderen aard even zoo goed daarmee zouden kunnen gekenmerkt worden. Met deze ontaarding der tastbare vormfels gaat ook dikwijls eene verandering der bovenste, met den vinger niet bereikbare deelen en derzelver toebehooren, als der eijerstokken, trompetten van Falloppius, baarmoederbanden, enz. gepaard, die meestal in eene vergrooting van den omtrek met hardheid bestaat, en door een naauwkeurig onderzoek van den onderbuik en de bovenste bekkenstreek gemeenlijk herkend wordt. In een geval waren ook bij eene zeer oude, mummieaardig uitgedroogde Vrouw, met verharde buiksingewanden en liesklieren, de uitwendige teeldeelen tot kanker overgegaan; bij dezelve vond men de aderen aan de groote
en

en kleine fchaamlippen en aan den kittelaar variceus gezwollen; de geheele omloop van in het bekken gelegene en der fpeenvaten was op het laatst gefremd, en de uitwendige fchaamdeelen ontaardden eindelijk en vervielen, onder de hevigfte pijnen, in eene aasachtige ontbinding.

Oorzaken.

§. 761.

De naaste oorzaak van den Scirrhus der Baarmoeder is een ontstekingsprikkel, of eene ziekelijk vermeerderde congestie van bloed, waardoor uitstorting van een' meer of min tot stolling en voor vele veranderingen vatbare Lymphe in het baarmoederweeffel ontstaat. Door de eene of andere van beide oorzaken wordt telkens de ontwikkeling van den Scirrhus voorafgegaan, alleenlijk ontstaat dezelve in het eerste geval fpoediger dan in het tweede. Arterieuze ontstekingen zijn buiten de zwangerheid, de verlosfing en het kraambed zeldzamer; dezelve gaan eerder tot abces, tot koudvuur of tot waterzucht over, of nemen in het vervolg het veneuse karakter aan, en dien ten gevolge kan ook eene arterieuze ontsteking tot Scirrhus overgaan. Buitendien is echter de Uterus deels om deszelfs weeffel, deels ook om de congestiën, tot veneuse ontstekingen reeds zeer geneigd, die, wel is waar, in den gezonden toestand der Vrouw, en wanneer de maanftonden niet geftoord of opgestopt zijn, tot geen nadeel ftrekken. Slechts dán zal de vermeerderde en ziekelijk toegenomene congestie van het bloed met ziekelijke gevolgen voor den Uterus ge-

paard gaan, wanneer, door welke oorzaken het ook wezen moge, de aandrang van het bloed in dit orgaan en de werkzaamheid der slagaderen verhoogd, die der aderen echter wezenlijk verminderd is; zonder deze voorwaarde wordt, volgens het natuurlijk zamenstel, bestendig het evenwigt in de verrigtingen der beide vaatstelsels des te ligter hersteld, naar mate het overgroot aantal aderen tot de slagaderen in fraat is, de gestoorde verrigtingen van sommige derzelven gemakkelijk te vervangen. Volgt er eens eene doorwaseming van stolbare Lymphe in het weeffel van den Uterus, dan zou daardoor trapsgewijze de verrigting der aderen merkbaar meer dan die der slagaderen lijden.

§. 762.

De ontstekingsprikkels der Baarmoeder, en daaruit ontstane aderlijke ontstekingen zelve doen zich nu eens met meerdere, dan wederom met mindere pijnen, ja zeer dikwijls met zoo weinige hevigheid voor, dat die door de zieken veelal volstrekt niet geteld worden. Vrouwen klagen dikwijls vele maanden, ja vele jaren over steken in de schaamstreek en in het bekken, over trekkingen in de lenden, over maankolijk en pijnlijke maanstonden in het algemeen; het is dit tijdperk, hetwelk meestal den overgang tot verharding te kennen geeft. Allengskens ontwikkelt zich de Scirrhus volkomen, de omtrek der Baarmoeder, welke voortaan het werktuig der verharding wordt, vergroot zich, hetgeen een gevolg van den vermeerderden toevloed van vochten met eene langzaam toenemende uitstorting van

van stolbare Lymphe in het weeffel der Baarmoeder is. De Baarmoeder vergroeit ook wel een van tijd tot tijd met de aangrenzende, bijzonder vliesachtige vormfels, naardien ook hier eene plastische Lymphe, welke organisch wordt, doorwafemt. Bij ziekelijk vermeerderde congestiën van bloed, waardoor insgelijks eene doorwafeming van tot stolling en voor vele veranderingen vatbare Lymphe in het weeffel van den Uterus ontstaat, kan zich de Scirrhus in de Baarmoeder geheel zonder pijn en steken, die den ontstekingsprikkel en de veneuse ontsteking kenmerken, ontwikkelen. In beide gevallen kan alsdan de Scirrhus op dezen eersten vormingstrap, zonder bijkomenden prikkel, lang zonder nadeel der zieken staan; deze gevoelen ook in eenen langen of korten tijd niets meer, en zijn dikwijls opgeruimd, totdat eene nieuwe stofverwisseling — de overgang van den Scirrhus tot de kankerzweer — een nieuw lijden en gevaren te weeg brengt, die des te vroeger ontstaan, hoe meer het gestel, grondoorzaken, en schadelijke, bijzonder prikkelende en ontstekingwekkende invloeden den overgang van Scirrhus tot Kanker begunstigen, waarbij de Baarmoeder tot derzelver veringtingen telkens ongeschikter wordt, zoodat allengskens zeer dikwijls het geheele klierstelsel ontaard, en klieren in andere organen en vormfels verhardeden, voornamelijk de zoodanigen, tot welke de opflorpemde vaten der Baarmoeder gaan, die met dit orgaan in een wezenlijk verband staan; weshalve men zoo menigmaal de zwellings of werkelijke verhardingen der borsten, der okselklieren,

die der scheede , der schaamlippen en liezen waarnaemt.

§. 763.

De schadelijke invloeden, welke deels door eenen ontstekingsprikkel, deels door eene ziekelijk te weeg gebragte congestie van bloed, of door beide uitwerkselen te gelijk tot het ontstaan van den Scirrhus aanleiding geven, zijn werktuigelijk geweld, waardoor de Baarmoeder, bijzonder het scheidedeel, gedrukt, gekwetst en geprikkeld wordt, zoodat er eene ontsteking van den Uterus ontstaat, waarbij door de opvulling met stolbare Lympe het weeffel van dit orgaan tegennatuurlijk uitgezet, en in deszelfs verrigtingen zoodanig gestoord wordt, dat zelfs de ware etterontsteking geene plaats kan hebben; daartoe behooren: de drukking van een moedersteunfel, bijzonder wanneer het flecht gemaakt, met eene scherpe stof overtrokken, en flecht aangelegd is (*), menigvuldige verlosfingen en kwetsfingen van den moedermond, bijzonder bij de verlosfingen met de tang, keeringen na lang ontlast vruchtwater, en zulke verlosfingen, waarbij inzonderheid met werktuigen, om dezelve te verhaasten, de moedermond kunstmatig uitgezet werd, misbruik van
moe-

(*) De Schrijver behandelde bij eene Vrouw van het platte land te *Wurtzburg* de kankerzweer der Baarmoeder met eene volkomene uitzakking, welke door een flecht persarium ontstaan was. Het scheidedeel was reeds geheel weg, en het onderste segment der Baarmoeder door het scheidegewelf aangetast.

moederkranfen, het gebruik van werktuigelijke middelen bij de Onanie, dikwijls ruw onderflaan, menigvuldige miskramen en door de kunst veroorzaakte ontijdige verlosfingen, gewelddadige afhaling van het ei en van den moederkoek, bijzonder bij ontijdige verlosfingen en bij onregelmatige hechting der Decidua, en bij de plaatfing op den moedermond, enz. Andere door ontstekingsprikkel te weeg gebragte invloeden zijn: onvoorzigtige aanwending van zeer bijtende en zamentrekkende infpuitingen, ter ftilling van bloedvloeiingen, bij voorbeeld van koud water, van te fterken azijn, de oplofing van vitriool en van aluin, van met ijzer bezwangerd mineraal water, e. d. g.; het gebruik van te warme infpuitingen, menigvuldige ftoringen der maanftonden, vooral menigvuldige maankolijken, opftopping der maanftonden (*), bijzonder na gevatte koude, menigvuldig aanhoudende verkoudheden, voornamelijk door eene dunne kleeding, of een aanhoudend verblijf in een' kouden dampkring, bij het ftaan en bij zeer verwijde uitwendige teeldeelen, plotsfelijke opftopping van den witten en kraamvloed, dikwijls voorafgegane ontstekingen der Baarmoeder na kraambedden, wanneer dezelve verzuimd of aan zich zelve overgelaten worden, scrofulen en venerifche befmetting, enz. Eene ziekelijke congestie van bloed kan te weeg gebragt worden: door te dikwijls uitgeoefenden bijfleep, menigvuldige betafing der teeldeelen, polypen en andere misvormingen, welke in de Baarmoeder ontftaan zijn; het misbruik

van

(*) Men zie de waarneming in HUFELANDS *Journal*. IX. B. 1 H. S. 149.

van afdrijvende middelen ; opgestopte en te spaarzame maanstonen ; onbevredigde teeldrift , uit welken hoofde ongehuwden en kloosterlingen zoo zeer aanleg tot Scirrhus der Baarmoeder hebben ; onvruchtbaarheid of kinderloosheid ; uitzakking ; voor- en achterwaartsbuiging der Baarmoeder , bijzonder wanneer die na verlosfingen bijblijven ; eene zittende , te stille , onwerkzame en zorgelooze leefwijze ; aanhoudende verstoppingen van den stoelgang ; ophooping van aanbeijen ; variceuse gezwellen ; het sterk rijgen van den buik ; zogverplaatfingen ; vrees , droefheid en kommer , enz.

Voorzegging.

§. 764.

Van deze ziekte is de voorzegging zeer ongunstig ; dezelve blijft tot heden nog altijd eene zeer kwaadaardige en moeilijk te genezene ziekte. Deze voorzegging is wel op den Scirrhus en bijzonder op deszelfs overgang tot de kankerzweer , maar geheel bijzonder , wanneer deze kwaal de Baarmoeder aantast , toepasselijk ; waartoe de eigendommelijke organisatie van dit orgaan , deszelfs belangrijke verigtingen en gemeenschap met andere vormfels , de vele , daarop gemakkelijker inwerkende , schadelijke invloeden , en de moeilijke aanwending en werking der geneesmiddelen , zeer veel mogen bijdragen. Meer hoop kan men voeden , wanneer men dadelijk bij den aanvang geroepen wordt , als de kwaal nog niet lang ontstaan is ; minder hoop heeft men , als de Scirrhus zich volkomen ontwikkeld heeft ; en het meest dan nog , wanneer dezelve van eenen

sy-

syphilitischen aard is, gelijk zulks bereids door FRANK is aangemerkt; het minst echter, wanneer zich de scirrheuse verharding reeds zoo zeer verspreid heeft, dat die het grootste gedeelte der Baarmoeder, alsmede de aangrenzende vormfels, aangestast heeft. Hoe langzamer de ontwikkeling van het verharde gedeelte van den Uterus plaats heeft, te weeg gebragt door de verhoogde werkzaamheid van die nieuw gevormde vaten, welke door de in het weeffsel der Baarmoeder uitgestorte Lympe bezielde worden, des te langer blijft de Scirrhus onveranderd, en de overgang tot de kankerzweer uitgesteld. Bij ongehuwden, en zoodanige Vrouwen, die zich in acht nemen, en aan geen der schadelijke invloeden, welke den overgang tot de kankerzweer verhaasten, zich blootstellen, is de voorzeggung gunstiger, daar de Scirrhus eenen zoo gevaarlijken voortgaanden trap niet zoo ras, en dikwijls in het geheel niet, bereikt, zoodat zij de kwaal als scirrheuse verharding mede in het graf nemen, gelijk men zulks bij den Scirrhus der Borsten, der schildklieren en andere verhardingen waarneemt. — Zoo lang de maanstonen nog aanhouden, bijzonder bij ongehuwde of kinderlooze Vrouwen, is het gunstiger, dewijl men waarneemt, dat de scirrheuse verharding niet altijd tot Kanker overgaat, somtijds bij de ontlasting van bloed afneemt, in den tusschen-tijd van twee maandelijksche perioden toeneemt, zoodat er eene periodieke zwelling schijnt plaats te hebben. Soms tijds verdwijnt de periodieke uitvloeiing, bij toenemende jaren, ten gevolge van den Landaardtypus; maar dikwijls wordt tot in den

hoog-

hoogsten ouderdom de voormalige, door eenen onregelmatischen en hevig wederkeerenden bloedvloed, vervangen, en de scirrheuse verharding heeft geen kwaadaardig gevolg, wanneer pijnen noch stank daarmede vergezeld gaan. De vaten van den Uterus zijn dán meestal zeer verwijd, de binnenste moedermond geopend, zoodat men zich van de inwendige gesteldheid van den Uterus overtuigen kan; de zieke sterft dan bij toenemende jaren meer aan de gevolgen van bloed- en vochtverlies. Een' voortgelijken dood ondergaan ook die Vrouwen, welke aan verharding lijden, die uit eene ongeregelde aneurismatische uitzetting der baarmoedervaten ontstaat, en tot de zoogenaamde fungus haematodes overgaat, tot welks karakter het ontstaan der weelderige sponsuitwasfen en de hevige bloedingen behooren. Is de Scirrhus tot de kankerzweer overgegaan, dan is dezelve gewoonlijk geheel ongeneeslijk, en de kortelings voorgestelde operatie door de uitsnijding, welke hoop op herstel gaf, kan ten minste, volgens de waarnemingen van den Schrijver, het leven rekken, maar niet behouden. De zwangerheid heeft niet altijd eenen nadeeligen invloed op den Scirrhus, zoo lang hij nog op dezen trap van deszelfs ontwikkeling staat; gene voorkomt niet alleen somtijds den overgang tot kankerzweer, maar kan ook denzelven genezen (*). De zwangerheid is

(*) De Schrijver zal eene door hem gemaakte zeer belangrijke waarneming, welke hij in het bijzijn van vele getuigen deed, op eene andere plaats mededeelen; de Scirrhus was vroeger voor geen middel, zelfs niet voor

is voor den tot kankerzweer overgeganen Scirrhus gevaarlijk, en verhaast den dood.

Geneeswijze.

§. 765.

De geneeswijze rigt zich naar de onderscheidene ontwikkelingsgraden der kwaal, namelijk, of de Scirrhus nog in het opkomen is, of dezelve zich volkomen ontwikkeld heeft, of reeds tot kankerzweer is overgegaan.

§. 766.

De periode van een' nog kiemenden Scirrhus der Baarmoeder blijft altijd de belangrijkste en gunstigste ter genezing; jammer maar, dat derzelver waarneming den Artsen zoo zelden vergund is. De periode van het ontstaan van den Scirrhus is telkens, gelijk bij §. 761 is aangewezen, een ontstekingsprikkel, of eene ziekelijk vermeerderde congestie van bloed. Als in het eerste geval de ontsteking, welke tot Scirrhus overgaat, zich ontwikkelt, dan is dezelve geene arterieuse, maar eene meer veneuse ontsteking, deels om de in §. 761 bijgebragte, deels om de navolgende gronden: 1) ontwikkelt zich de Scirrhus der Baarmoeder zoo dikwerf met de toenemende jaren der Vrouw, wanneer, met afnemende der prikkelbaarheid, zuivere arterieuse ont-

ste-

voor het kwik, geweken; de daarop volgende zwangersheid en verlossing van een voldragen kind genaas den-
zelven.

stekingen zeldzamer zijn; 2) ontstaat dezelve meermalen bij zwakkelijke, cacochymische gestellen, en wordt ook zoo dikwijls door zulke invloeden veroorzaakt, welke meer tot veneuse dan zuivere arterieuse ontstekingen aanleiding geven; 3) de Scirrhus der Baarmoeder ontwikkelt zich meestal onmerkbaar, en er worden geene zulke beduidende verschijnselen als bij eene arterieuse ontsteking waargenomen. Gene doet zich met mindere hevigheid voor; en juist dit is der veneuse ontstekingen bijzonder eigen.

§. 767.

Meermalen neemt men waar, dat ook eene zuivere arterieuse ontsteking den Scirrhus ten gevolge hebben kan, nogtans meestal slechts bij den overgang tot eene veneuse ontsteking. Is derhalve de zieke nog in den oogenblik, waarin de ontsteking der Baarmoeder nog eene zuiver arterieuse ontsteking is, een voorwerp van geneeskundige behandeling, dan wordt de, in het eerste Hoofdstuk dezer Afdeeling, voorgeschrevene behandeling der Metritis aangeprezen. Het gestel der zieke, voorafgegane invloeden en verschijnselen, waartoe ik voornamelijk de hevigste pijnen en steken in de schaamstreek breng, moeten beslissen, of eene algemeene aderlating aan den arm, of slechts plaatselijke bloedontlastingen door bloedzuigers, op de schaam- en lendenstreek, of bilnaad gelegd, vereischt worden, om de ontsteking te beperken. Hiermede vereenigen men emulsiën met nitrum, zachte ontlastmiddelen uit wijnsteenroom, manna en magnesia, klisteren uit een

een afkookfel van slijmachtige en verzachtende kruiden, van den scheerling en het bilzenkruid met melk, in de scheede en den endeldarm; dergelijke strovingen en pappen op den buik, verzachtende smeersels, enz.

§. 768.

De ontsteking van een veneus karakter zijnde, dan worden zeer bijzonder het kwik, de calomel, met de goudzwavel en de kamfer aanbevolen. Hiermede vereenige men inwrijvingen met het unguent. Neapolitan. op de schaamstreek, pappen van den scheerling en het bilzenkruid, en inspuitingen uit eene oplossing van het extr. cicut. met het heul-sap. Algemeene aderlatingen komen hier zeldzamer te pas; maar bloedzuigers kunnen bij hevige pijnen en steken eene zeer weldadige werking doen.

§. 769.

Als de Scirrhus der Baarmoeder het gevolg eener ziekelijk vermeerderde congestie van bloed is, dan moet men eerst op de oorzaken acht geven; derzelver wegneming, zoo zulks naar de bijzondere betrekkingen der zieke kan ten uitvoer gebragt worden, moet de eerste zorg van den Arts zijn. Zoo staat het, bij voorbeeld, niet in de magt van den Arts, om den te hevigen aandrang der vochten door eene bevrediging der teeldrift en bevordering der zwangerheid te verminderen, den ongetrouwden staat en de eenzame in hare cel opgesloten, en met berouw, kommer en verdriet over

over de keuze van haren stand vervulde Non weg te nemen, of eene andere leefwijze aan te bevelen, wanneer deze bestaat in de broodwinning eener bekommerde moeder voor hare kinderen, enz. Buitendien worden er algemeene en plaatselijke bloedontlastingen aangewezen, de eerste bijzonder aan de voeten, verkoelende zouten, de wijnsteenroom en bijzonder de middelzouten, het arcanum duplicatum, de tartarus tartarisatus, het sal mirabile Glauberi, het karlsbadzout, bij zeer plethorische gestellen dikwijls antiphlogistifche ontlastmiddelen uit tamarinden, e. d. g., het Seidlitzer en Seltzer water, de zure- en voornamelijk werkzame, bij aanvankelijke verhardingen doorgaans niet genoeg te prijzen Ragozi-bronnen te Kisfingen bij Wurtzburg, totdat er zachte ontlasting volgt, daar dezelve niet alleen de ziekelijk vermeerderde congestiën van bloed in den buik, bijzonder in het poortader- en baarmoederstelsel, vermindert, maar ook, wegens het met derzelve loogzoutige, aardachtige en ziltige bestanddeelen zoo naauw verband van het ijzer en van het in eene zoo groote menigte ontwikkelende koolzuur, de opfloringswerkzaamheid der watervaten zeer verhoogt, aanvankelijke verhardingen des te eer geneest, en tevens, door den in hetzelfde zich bevindende vlugtigen bronnengeest, het zenuwstelsel op nieuw opwekt en krachtdadig versterkt. De bronnen en minerale wateren te Nenndorf, Ems, Karlsbad, Wisbaden, Aken, Baden enz. kunnen ook werkzaam zijn; echter moet derzelve keuze door den Arts, naar de jaren en het gestel der zieken, zeer voorzigtig bepaald

paald worden, daar eene onvoorzigtige keuze van verscheidene dezer zeer sterk werkende baden de kwaal ligt vermeederen, of congestiën naar andere organen, duizeling, bloedvloeijingen en zelfs beroerten te weeg brengen zoude. — Bij de ziekelijk vermeederde congestie van bloed komt het zeer veel op een doelmatig diëtetisch gedrag aan. De zieke moet eenen niet te voedzamen, meer dunnen en plantenkost nuttigen, vele verdunnende en verkoelende dranken gebruiken, bijzonder wanneer hare digestie daardoor niet lijdt, veel water drinken, sterke bewegingen maken, eene werkzame leefwijze houden, en zoo mogelijk opgeruimd en vrolijk zijn.

§. 770.

Om de geneeswijze echter volkomen te doen slaagen, zoo behoort men daarbij nog omzigtig te wezen, of de kwaal niet door verscheidene der in §. 763 bijgebragte invloeden kon veroorzaakt zijn. Deze moeten niet alleen, indien mogelijk, uit den weg geruimd, maar ook de, met derzelfver aard passende, geneesmiddelen aangewend worden; bij voorbeeld: een zich ontwikkelende Scirrhus, die uit venerische besmetting, uit scrofelen of jicht, als uitwendige oorzaken, voortspuit, vereischt daartoe eene bijzondere opmerkzaamheid. Ontwikkelt zich de Scirrhus als een gevolg der opgestopte maanston- den of van eenen witten vloed, dan moeten de belette afzonderingen hersteld worden; en aan een pessarium, of aan een ander, op de Baarmoeder schadelijk werkend, vreemd ligchaam toegeschreven wordende, dan moet men zulks wegnemen. Zeer

belangrijk is de opmerking, of niet door eene gebrekkelijke ligging, door voor- of achterwaartsbui-
ging, daling of uitzakking der Baarmoeder, de zie-
kelijk vermeerderde congestie als een gevolg van
den gestoorden omloop van bloed onderhouden worde.
Daar gene alleen tot verhardingen der Baarmoeder
aanleiding kunnen geven, is het noodzakelijk, de
geregelde ligging te herstellen. De ondersteuning
van den voor- of achterwaarts gebogenen mond der
Baarmoeder door middel eener spons, met linnen
omwonden, en in een aftreksel van flor. rosar.
rubr., herb. salv., cortic. querc. gedoopt, of het
dragen van een zakje, hetwelk met de voornoemde
middelen gevuld, en vooraf in rooden wijn, voor-
ondersteld, dat de zieke dien verdragen kan, ge-
doopt werd, dienen ter bereiking van het doel, en
zullen tevens de werkzaamheid der zeer verzwakte
en uitgezette aderen van den Uterus, naar gelang
der slagaderen, verhoogen. De Schrijver heeft zeer
dikwijls, alleen door het gebruik dezer middelen,
gezwollen en aanvankelijke verhardingen der Baar-
moeder zien verdwijnen.

§. 771.

Zoodra de Scirrhus zich volkomen ontwikkeld
heeft, dan is de hoop tot herstel zeer gering, bij-
zonder daar de overgang tot kankerzweer zoo
ligt mogelijk is. Om den Scirrhus te verdeelen, op
te lossen en te verzachten, heeft men onderschei-
dene middelen aanbevolen en geprezen. Hiertoe
behooren uit het plantenrijk de radix sarsaparillae
(in afkooksel en met het kalkwater), de cicuta of
het

het *conium maculatum*, de *calendula* (*), *bella-donna*, de *aqua laurocerasi* (†) *sabina* en de meeste dier middelen, welke bij de genezing van den *Scirrhus* der borsten opgegeven werden; uit het mineraalrijk het kalkwater, de bitteraarde, de bronnen van Nenndorf, Aken, Baden, Ems, Wisbaden, Karlsbad e. a. m., de spiesglanskalk, de goudkalk, of de oplossing van het goud in salpeter-zuur met zoutzuur ammonium verzaadigd, en door koolzure potasch nedergeploft (§), de *limatura martis* met den *sal tartari*, het *ferrum carbonicum* (*), het kwik en het arsenicum. Dit werd onlangs tot inwendig gebruik aangeprezen door den

(*) WESTRINGS *Erfahrungen über die Heilung der Krebsgeschwüre, a. d. Schwed. mit Zusätzen von SPRENGEL. Halle 1817.* De *calendula* is door den Schrijver onwerkzaam bevonden. Men zie des Schrijvers *Journal für Geburtshülfe, Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten. III. Bd. 1 St. S. 49.*

(†) B. OSIANDER, in de *Gött. gelehrten Anzeigen. Jahrg. 1816. 13e. St.* De *aqua laurocerasi* ware van de heerlijkste uitwerkselen geweest, want het zou den volkomenen *Scirrhus* der Baarmoeder met al de teekenen van den nabijzijnden overgang tot den openen Kanker volkomen genezen hebben.

(§) Men zie WESTRING, t. a. pl. *R. auri muriat. gran. j. amyl. 3j M. exact. F. pulv. subtiliss. divid. in xij part. aequal. D.* — Men moet 'smorgens en 's avonds na het inspuiten het twaalfde gedeelte van een grein met stijffel de schaamlippen en ook in de scheede inwrijven.

(*) Ook van het *ferrum carbonicum* ondervond de Schrijver de gewenschte uitwerking niet. Men zie zijn

den Heer C. WENZEL (*), als een werkdadig middel ter verligting van zware pijnen in den Uterus en der op gezette tijden, nu eens zeldzaam, dan wederom dikwijls wederkeerende pijnlijke steken in het binnenste van den Vrouwelijken schoot, welke zoo dikwijls den zoo zeer te vreezen overgang van Scirrhus tot kankerzweer te kennen geven. Hij bediende zich van FOWLER's oplossing met naar gelang klimmende giften. De Schrijver heeft, behalve dat de Scirrhus der Baarmoeder eens door de zwangerheid volkomen genezen werd, nog in sommige gevallen van het kwik met de cicuta de meeste uitwerking gezien (†). Het kwik is voor deze kwaadaardige verharding der Baarmoeder, als een bij uitsteking veneus, fereus en lymfatisch vormsel, uitnemend geschikt; hetzelve is geheel ingerigt, om de verstoppingen, den tegennatuurlijken samenhang en de scirrheuse verhardingen van het orgaan weg te nemen, terwijl het tevens de verminderde werkzaamheid der aderen en opslorpende vaten opwekt. De Schrijver geeft het calomel, of de mercurius solubilis Hahnemanni, in kleine giften van een kwart tot een half grein, twee of drie malen daags, met de cicuta, en met het heulsap, wanneer het deszelfs hevige werking op het lymphatisch stelsel moet beperken.

Daar-

Journal für Geburtshülfe, Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten. III. Bd. 1e. St. S. 49.

(*) In deszelfs Werk: *über die Krankheiten des Uterus*, Mainz. 1816. kl. fol. bl. 187. met pl.

(†) Zie des Schrijvers *Journal für Geburtshülfe*, enz. III. Bd. 1e. St. S. 49. Scirrhus et carcinoma uteri.

Daarbij wordt vereischt, dat de genezing door de bij §. 769 aangeprezene diëtetische voorschriften bevorderd worde, en dat men de schadelijke invloeden, welke tot het ontstaan van den Scirrhus bijzonder aanleiding gegeven hebben, verwijdere.

§. 772.

De werking der inwendige middelen moet ook door uitwendige ondersteund worden. Laauwarme halfbaden, voornamelijk uit een aftreksel van het bilzen- scheerling- of belladonnakruid en zwavel- of halfbaden uit eene oplossing van zwavellever bereid. Vooral prijze men inspuitingen in de schede, uit een aftreksel van het conium maculatum, der calendula, belladonna en sabina, de aqua laurocerasi, de oplossing van het ferrum aceticum, sublimaat, arsenicum, enz. aan. De meeste dezer middelen werken, als de Scirrhus der Baarmoeder zich volkomen ontwikkeld heeft, volstrekt niet op het zieke, verharde, levenlooze en eenigermate buiten organische gemeenschap gestelde vormsel, of prikkelen te sterk, tasten te zeer aan, en bewerken derhalve zeer gemakkelijk den overgang tot kankerzweer. Hierom is het raadzamer, of volstrekt geen gebruik van inspuitingen te maken, of de zoodanigen te kiezen, welke, bij eene meerdere inachtneming (*Diätetik*) van den Uterus, bijzonder ten tijde der maanstonen, en bij eenen aanwezen fluor albus, — die niet in elk geval den overgang tot kankerzweer te kennen geeft, maar vroeger aanwezig konde geweest zijn, wiens werktuig welligt alleen het met klieren omgevene slijmvlies

der fcheede is, — door geheel zachte, onschadelijke middelen, tevens de zindelijkheid bevorderen, en zelfs de genoemde uitvloeijing, waaraan de Natuur eenen geruimen tijd konde gewoon zijn, met de meest mogelijke voorzigtigheid beperken.

§. 773.

Bij de weinige hoop tot herstel van den Scirrhus der Baarmoeder, waar de kunst, helaas! nog geen geheel zeker middel ter verdeeling kent, is het dus raadzamer, hetgeen ook bij den Scirrhus der borsten, die of niet ter uitsnijding geschikt zijn, of wanneer de zieken de Operatie weigeren, geldt, om de grootste zorg te dragen, dat de Scirrhus niet den aanmerkelijken zoo zeer te vreezen ontwikkelings-trap van kankerzweer bereike. Te beletten, dat Scirrhus niet tot Kanker overga, blijft dus de gewigtigste aanwijzing. De middelen zijn deze: 1) een gestreng en doelmatig diët in het algemeen en met betrekking tot den Uterus en het teeltstelsel in het bijzonder, hetwelk door de Artsen naar den ouderdom, het gestel, de leefwijze, de individueele betrekkingen der zieken en de aanleidende oorzaken der kwaal, enz. moet bepaald worden; omtrent de inachtneming van den Uterus is het gewigtigste voorschrift, dat de zieke geheel afstand van den bijslaap doe, als welke ontwijfelbaar den overgang tot kankerzweer zeer bevordert; tot inspuitingen in de fcheede wende men slechts een laauwwarm aftreksel van cicuta of van wortelen met melk aan. 2) Zoodra de zieke over steken en pijnen in de
len-

lenden- en schaamstreek klaagt, dan late men in den omtrek van het kruis, op beide de liezen digt bij den band van Poupart en op de schaambeenderen bloedzuigers leggen, bevele de strengste rust aan, zorgē voor open lijf, geve eene verkoelende Emulsie uit Ricinus- en amandelolie, waarbij men, in geval hette en koorts aanwezig is, wat nitrum of sal mirabile Glauberi voegt; als de koorts afgenomen is en er eenige ontlastingen gevolgd zijn, ga men dadelijk tot het inwendig gebruik van het kwik over, naar het voorschrift §. 771, en late des avonds vóór het slapen gaan vijftien tot vijf en twintig en van tijd tot tijd meerdere droppels aqua laurocerasus nemen. In hoe verre bij het gebruik van het kwik de zelfreproductie dient bevorderd te worden, bijaldien' deze te veel mogt geleden hebben, moet aan het oordeel van den Arts overgelaten worden. Als de Scirrhus niet zeer hard, en het kwik over het geheel eene tegenaanwijzing is, dan late men, na het afnemen der pijnen door de bloedzuigers, gedurende eenigen tijd eene oplossing van den tartarus tartarisatus met het extract. graminis of taraxaci, en van het aqua laurocerasi gebruiken, welk laatste ten minste ook bij verstoppingen en verhardingen der lever, volgens THILENIUS, zulk eene voortreffelijke uitwerking doet. 3) Met het gebruik der baden zij men voorzigtig; een laauwwarm halfbad uit het afkooksel van zemelen konde men alleenlijk aanbevelen. 4) Eene gebrekkige ligging der Baarmoeder moet op die wijze als in §. 770 opgegeven is hersteld worden, hetgeen van het grootste belang is, om den overgang van Scirrhus tot kankerzweer

te voorkomen. WENZEL (*) prijst nog tot dit einde kunstmatige zweren aan, in den omtrek waar de zitbeenszenuwen uit het bekken gaan, of ter plaatse, waar men bij de heupjicht (*Coxalgie*) de kunstmatige zweren pleegt voort te brengen, waarvan men bijzonder bij eene aanhoudende congestie van bloed en bij een' ontstekingsprikkel een goed gevolg te wachten heeft.

§. 774.

De Scirrhus tot Kanker overgegaan zijnde, dan is de hoop tot herstel nog geringer, bijzonder wanneer reeds eene sluipende koorts daarmede vergezeld is, de zelfreproductie zeer geleden, en de kwaal niet alleen in de Baarmoeder zeer ver om zich heen uitgestrekt heeft, maar ook de aangrenzende vormfels daardoor aangetast zijn. Behalve de geneeswijze, om den overgang van Scirrhus tot kankerzweer, zoo als in §. 773 opgegeven is, te voorkomen, moet men nog op vermindering der uitvloeijing, zuivering van de kankerzweer en beperking van derzelver voortgang, zoowel in het eerst aangetast orgaan zelf, als in de aangrenzende vormfels, acht geven.

§. 775.

Als de uitvloeijing zeer menigvuldig en stinkende is, dan late men drie of vier malen daags inspuitingen in de scheede doen; waartoe een aftreksel van den scheerling, het uitgeperste sap of afkooksel van

WOR-

(*) WENZEL, t. a. pl. bl. 189.

wortelen (*carotta*), de oplossing van het extr. nuc. jugl. en cort. salic. in kalkwater, die van het ferr. acetic., een afkooksel van den kinabast, bij hevige pijnen met het heulfap vereenigd, en ook verdunde zoutzuren, zeer aangeprezen worden.

§. 776.

Voor al toch moet ook bij den Kanker der Baarmoeder de reproductie, welke zoo zeer lijdt, en, naar mate de kwaal en de pijnen toenemen en de uitvloeijing sterker wordt, hoe langer hoe meer daalt, op alle mogelijke wijzen bevorderd worden. Een voedzame, ligt verteerbare leefregel en het inwendig gebruik van zoodanige geneesmiddelen, welke met de zoo zeer verzwakte reproductie overeenstemmen, en waarvan de kina altijd den eersten rang bekleedt, zijn onontbeerlijke hulpmiddelen.

§. 777.

Echter bereikt men, helaas! bij de ontwikkeling van den Kanker, door de bijgebragte geneeswijze, het doel niet, voornamelijk wanneer de kankerzweer toeneemt, en de reproductie der zieke zoo zeer gezonken is, dat er reeds cachexie, tering en eene sluipende koorts mede gepaard gaan. In deze treurige gesteldheid kan men, wel is waar, niet meer doen, dan de meer en meer dieper zinkende reproductie door eene voedzame, ligt verteerbare diët, en daarmede insgelijks overeenkomende geneesmiddelen, door kina, heulfap en IJslandsche mos, opbeuren; de het Organismus storende werking van den opgeslorpten, kankerachtigen etter door het voorschrijven van slij-

merige dranken en afkookfels verzachten; de kankerzweer en de teeldeelen zelve door de bij §. 775 aangeprezene middelen zindelijk houden; de hevige pijnen verzachten en de symptomen tegengaan.

§. 778.

Geen middel verzacht meer de hevige pijnen, dan het heulsap: en men moet niet zelden over de groote giften verbaasd staan, welke zulke ongelukkige zieken alléngskens daarvan verdragen kunnen! Aanvankelijk laat men des avonds één of twee greinen opium in substantie, of vijftien droppels Thebaïsche of Sydenhamfche tinktuur nemen en met de giften opklimmen. De Schrijver behandelde vrouwen aan deze kwaal, die het tot twee of drie drachmen in ééne gift bragten. Buitendien verdienen nog vermeld te worden het bilzenkruid, de belladonna en geheel bijzonder het aqua laurocerasi, hetwelk alleen of met het opiumstinktuur toegediend kan worden, wanneer er van het heulsap geene verstopping vanden floelgang te duchten is, of de zieke werkelijk daaraan lijdt. Intusfchen vereischt het gebruik van het opium en van alle pijnstillende middelen bij de ontwikkeling van de kankerzweer eene zekere omzigtigheid, en ligtelijk fchijnt die daardoor vermeerderd, of een nieuwe overgang van verharde plaatsen in de zweer veroorzaakt de hevigste fteken, pijnen, koorts en hitte; hier geve men volftrekt geen opium, of ten minfte niet alleen. Hier heeft geene zuivere aandoening der zenuwen, maar eene nieuwe ontfteking in het scirrheufe orgaan plaats, hetwelk tot kankerzweer dreigt over te gaan; dezel-

zelve is dikwijls zoo hevig, dat alle uitvlocijng op houdt, en de teeldeelen zeer heet en droog worden. Men legge bloedzuigers, schrijve verkoelende Emulsiën, bijzonder die in §. 773 bijgebracht zijn, met nitrum en aqua laurocerasi, voor, zorg voor open lijf, prijze verdunnende en verkoelende dranken aan, late het aftrekfel van cicuta of van wortelen met melk inspuiten, en wanneer de pijnen en steken opgehouden hebben, maar er nog eene vaatkoorts aanhoudt, eene zeer verdunde oplossing van het wijnsteen zuur in een slijmerig afkookfel gebruiken.

§. 779.

Een bijzonder toeval, waarmede de aan Kanker der Baarmoeder lijdende Vrouwen in dezen graad aangetast worden, is, gelijk de Schrijver meermalen gelegenheid had waar te nemen, eene chronische braking, welke des te meer opmerkzaamheid verdient, daar de zieken niet alleen door de inspanning, maar ook door de verhinderde voeding door dezen weg — naardien zij al het genotene wederom uitbraken — buitengemeen verzwakt worden, en bij gevolg den dood te gemoet treden. — Hyosciamus en heulsap, zoowel uit- als inwendig aangewend, de bruispoeder e. d. g. beantwoorden niet altijd aan de verwachting. In de belladonna, slechts inwendig, in kleine giften, van een half tot één grein toegediend, vond de Schrijver alleen het middel, om het braken volkomen te stuiten.

§. 780.

Eene bijzondere opmerkzaamheid verdienen nog de bloedstortingen der Baarmoeder, en zulks des te meer, wijl daardoor de zieke telkens meer en meer verzwakt wordt, en dezelve haar ook plotselijk van het leven berooven kunnen. Daar deze bloedstortingen meestendeels de gevolgen der gestadig meer aantastende, kankerachtige verftoring van het orgaan en van deszelfs vaten zijn, zoo is het des te noodzakelijker, om de, volgens de bij §. 774 opgegevene bepaling, verdere verspreiding te beperken, waartoe, behalve de aanbevolene middelen, de kinabast en het Haller's zuur, in eenen slijmerigen drank, voornamelijk aangeprezen worden: gelijk de beide middelen ook bijzonder dan eene zeer weldadige uitwerking doen, wanneer de sluipende koorts in eenen hoogen graad plaats heeft, en na het eten en des avonds het voor de zieke dikwerf zoo onverdragelijk gevoel eener brandende hitte en heete handen zich voordoet. Soms tijds ontstaat ook bij de ontsteking van een verhard gedeelte des orgaans, hetwelk tot kankerzweer overgaat, eene bloedstorting, vooral wanneer men de ontsteking niet tegengaat, of in de plaats daarvan, tot stilling der pijnen, aanzienlijke giften van opium c. d. g. toedient. In dit geval kunnen bloedzuigers en de bij §. 779 opgegevene antiphlogistische geneeswijze de bloedstorting zeer krachtdadig tegengaan. Bijaldien er werkelijk eene aanmerkelijke bloedstorting mogt ontstaan, dan prijze men eene horizontale ligging aan, late het Haller's zuur, in sterke giften, afwisselend met

met de kaneel- en opiumtinktuur gebruiken, en bediene zich van eene, uit poeder van Arabische gom en aluin gedoopte spons als tampon, welke men in de scheede brengt, en stijf tegen de Baarmoeder aan drukt. Ook heeft de Schrijver eene sterke oplossing van het ferr. acetic. zeer werkzaam bevonden.

§. 781.

Bij de opgegevene behandeling, waarbij tevens vervrolijking van gemoed, de zorgvuldigste zindelijkheid en oppassing, als ook het genot eener zuivere lucht, niet mogen verzuimd worden, kan men eenigen tijd het leven der zieke rekken, totdat in het vervolg eene bloedstorting of uittering allengskens een einde daarvan maakt.

*Over de Uitsnijding (Exstirpatio) van den
Kanker der Baarmoeder.*

§. 782.

Tot eene mogelijke genezing van den Scirrhus en Kanker der Baarmoeder deed zich in de laatste tijden een gewenscht vooruitzicht door de Uitsnijding voor, welke de Hoogl. BENJAMIN OSIANDER te Göttingen, eenige malen, met het beste gevolg, aan levenden zoude ondernomen hebben. De voortgangen, waartoe hij reeds deze Operatie wil gebragt hebben, om eene der vreeselijkste en, helaas! tot heden meestal ongeneeslijke kwalen der menschheid te bestrijden, zijn zoo belangrijk, dat men dezelve ook in dit Handboek niet kan voorbijgaan.

§. 783.

§. 783.

Eer men echter tot de Operatie overgaat, moet men vooraf de volgende vragen met zekerheid beantwoorden: Is de Uitsnijding zonder levensgevaar mogelijk? Onder welke omstandigheden kan dezelve plaats hebben? En kan men zich daarvan ook dán eene volkomene genezing beloven, wanneer dezelve gelukkig verrigt is geworden?

§. 784.

Eene volkomene genezing is slechts in zulke gevallen te verwachten: 1) wanneer de kwaal zuiver plaatselijk, en niet door bijzondere, algemeene, uit- en inwendige oorzaken ontstaan is; 2) wanneer niet reeds eene ziekte van het geheele water- vaatstelsel gevolgd, en zulks niet tevens door scirrheuse verhardingen in andere klierachtige vormfels bepaaldelijk bewezen is; 3) wanneer de plaatselijke kwaal zich nog in den ontwikkelingsgraad van Scirrhus bevindt; 4) wanneer er wel eene kankerachtige stofverwisseling ontstaan is, doch deze niet te lang geduurd, aanleiding tot eene opslorping van kankerachtigen etter gegeven, en de Kanker der Baarmoeder niet de naast aangrenzende vormfels aangetast heeft, welke niet uitgesneden kunnen worden; bij voorbeeld de scheidde, de eijerstokken, het net, den endeldarm en andere ingewanden; 5) wanneer niet reeds eene sluipende koorts, tering en verzwakking tot zulk eenen hoogen graad gestegen zijn, dat de zieke deze Operatie niet meer ondergaan kan, en zij gevaar loopt, om voor de gevolgen der pijnen

nen en bloedingen te zullen bezwijken. Buiten deze voorwaarden kan de Operatie niets baten, en mag in sommige gevallen alleenlijk als het uiterste middel, op eigen gevaar en op uitdrukkelijke begeerte der zieken, ondernomen worden, welke in haren, buitendien hoogst ellendigen, toestand bereid zijn, alles, ook het uiterste, te wagen, dikwijls zelfs den dood verlangen, om van hare ellende ontslagen te worden, of in sommige gevallen den eenigsten troost genieten, van haar leven voor eenigen, hoezeer slechts korten, tijd te verlengen, en dan eenen zachteren dood te sterven (*).

§. 785.

(*) Men zie des Schrijvers *Bemerkungen über die Exstirpation der Gebärmutter, als neuerdings empfohlenes Heilmittel*. In deszelfs *Lucina*. I. Bd. 3 Hefte. Leipz. 1804. 8°. S. 403—7.

Dr. J. BEIJERLE, *über den Krebs der Gebärmutter*. 8°. Mannheim 1818. S. 90—129.

C. WENZEL, *über die Krankheiten des Uterus*. S. 139—177.

J. CHR. G. JÖRG, *Aphorismen über die Krankheiten des Uterus und der Ovarien zur Würdigung zweier von Herrn OSIANDER in Leipzig unternommenen Operationen*. Leipz. 1820. S. 60.

Den Hoogleeraar JÖRG moet des Schrijvers hier bijgebrachte aanmerkingen geheel ontgaan zijn, dewijl hij geloofde, de Litteratuur over dit onderwerp uitgeput te hebben. De Schrijver heeft — of hij moest zich zeer vergissen — zich het eerst onder de Duitsche Vroedkundigen over dit nieuwe voorstel van den Hoogleeraar OSIANDER openlijk verklaard, en zijne aanmerkingen alleenlijk beknopter medegedeeld, dan zulks eerst in 1816 uitvoerig in het gemelde Werk van den Heer C. WENZEL geschied is.

§. 785.

Dien ten gevolge worden dan, met betrekking tot de Operatie zelve, nog de volgende gevallen onderscheiden: 1) of de Scirrhus en Kanker der Baarmoeder gaan, zoo als de Schrijver in zijne praktijk waargenomen heeft, met eene uitzakking gepaard, of 2) dezelve is niet aanwezig. In het eerste geval is de Operatie met minder, in het tweede nogtans met gewigtige zwarigheden vergezeld.

§. 786.

Wanneer de Scirrhus en Kanker der Baarmoeder met geene uitzakking gepaard gaan, heeft OSIANDER (*) het eerst, en na hem STRUVE (†), voorgesteld, om eene uitzakking der Baarmoeder te bewerken. Het kunstmatig daarstellen eener uitzakking is echter slechts dán mogelijk, wanneer de hals en de bodem der Baarmoeder niet met de scheede en met de aangrenzende vormfels vergroeid zijn, en de kankerachtige stofverwisseling zich niet zeer verspreid heeft. De nieuwste waarnemingen van OSIANDER hebben echter geleerd, dat de Uitsnijding in het geval van eene niet tevens aanwezige of kunstmatige uitzakking uitvoerbaar zij, waarvan echter, indien de Operatie al met eenen gelukkigen uitflag bekroond werd, slechts dán eene volkomene ge-

(*) Men zie zijn Geschrift in den *Reichsanzeiger. Jahr* 1803. N^o. 300. S. 3926.

(†) Deszelfs *Ideën über die Exstirpation des Uterus*. In HUFELAND'S *Journal*. IX. Bd. 4 St. S. 123.

genezing te wachten is: 1) wanneer men overtuigd is, van al het kankerachtige en scirrheuse der Baarmoeder en aangrenzende vormfels te hebben weggenomen; 2) wanneer de, bij §. 784 opgegevene, gunstige voorwaarden plaats hebben. In geval, wanneer bijzonder door blijkbare verschijnselen, waaronder men vooral verharde en gezwollene klieren in andere vormfels tellen moet, eene ziekte van het lymphatisch stelsel bewezen is, en belangrijke misvormingen en gebreken in aangrenzende deelen aanwezig zijn, kan men zich geene volkomene genezing van de Operatie voorstellen.

§. 787.

De wijze, hoe de Operatie zelve te verrigten, hangt voornamelijk dáárvan af, of de Baarmoeder al dan niet uitgezakt is.

§. 788.

Bijaldien eene uitzakking der Baarmoeder, hetzij dezelve, op het voorstel van OSIANDER en STRUVE, door de kunst bewerkt geworden is, met Scirrhus en Kanker gepaard gaat, dan onderzoeken men vooraf naauwkeurig, hoe ver de kwaal zich verspreid heeft. Is de Baarmoeder geheel, of grootstendeels scirrheus en kankerachtig, dan handelt men het zekerst, van de geheele Baarmoeder uit te snijden. Te dien einde make men eerst met eenen, tot op de helft met eenen band omwonden, krommen Bistouri, achter den linker- of regterschaambeenstak eene infnijding, en scheid op die plaats de Baarmoeder geheel van de scheede af. Ingeval

er onder het snijden eene bloedstorting mogt ontstaan, zoo onderschepte men, voordat men de snede vervolgt, de bloedende vaten, terwijl de helper zorg draagt, dat er geene darmen uitzakken. Als nu de Baarmoeder aan den voorsten wand gescheiden is, dan tracht men de scheede op die plaats door eene naaldhechting te vereenigen, en aan den achtersten wand met de Operatie op dezelfde wijze voort te varen. Ware echter de Baarmoeder zeer ver uitgezakt en het scheedegewelf door den langen duur der uitzakking zeer verlengd, gelijk zulks door den Schrijver waargenomen is, dan zoude het, in geval de geheele Uitsnijding noodzakelijk ware, raadzaam zijn, eene hechting achter den bodem der Baarmoeder aan te leggen, die men, zoo veel de zieke het verdragen kan, moet aantrekken, waarna men eindelijk de geheele Baarmoeder met den bistouri van POTT, met het Savignysche fistelmes, of met de door STRUVE opgegevene instrumenten uitsnijdt; hierdoor zal men het zekerst eene bloedstorting voorkomen. LANGENBECK (*), die eenen, gedurende langen tijd, uitgezakten Uterus geheel had uitgesneden, scheidde den hals der Baarmoeder van de scheede, zonder deze door te snijden, scheidde dan insgelijks het ligchaam en een gedeelte des bodems van het buikvlies, zonder dit door te snijden, zoodat hetzelfde met de scheede eenen blinden zak naar de buiksholte toe vormde, en liet zelfs nog een stuk van den bodem aan het buik-

(*) Zie deszelfs *neue Bibliothek für die Chirurgie und Ophthalmologie*. I. B. 3e. St. S. 558. 8°.

buikvlies zitten; met den uitgesneden' Uterus zouden de ovaria en de afgesneden ligamenta rotunda nog vereenigd zijn geweest. (?)

§. 789.

Zoo het echter niet noodzakelijk ware, om de geheele uitgezakte Baarmoeder uit te snijden, bijzonder wanneer de kwaal zich slechts tot de Baarmoeder bepaalt, dan snijdt men deze alleen met den bistouri door, en wanneer zich de scirrheuse stofverwisseling verder verspreid heeft, dan scheidt men de Baarmoeder van het, met dezelve aanhangende scheidewelf, snijdt het verharde en kankerachtige deel uit, en zoekt alsdan de scheede door eene naaldhechting te vereenigen.

§. 790.

Als er met den Scirrhus en Kanker der Baarmoeder geene uitzakking te gelijk aanwezig, en volstrekt niet, of ten minste niet zonder gevaar, te bewerkstelligen is, dan trekke men, volgens OS-ANDERS eerste methode (*), zoodra de teeldeelen door inspuitingen gezuiverd en met zalven verzacht, en de kankerachtige uitwasfen, met de vingers of een exstirpeer - instrument, weggenomen zijn, door buigzame naalden, die niet hard of krom zijn, fijn gewast garen, en steke deze, met de grootste voorzigtigheid, in en door de scheede en de Baarmoeder aan al de vier zijden, van voren, van achteren en van weërskanten, kromme de
pun-

(*) *Göttingische gelehrte Anzeigen*. S. 1300.

puntèn der naalden om, vatte dezelve met eene kleine tang en trekke ze aan. Hierbij moet men de grootste voorzigtigheid in acht nemen, dat de naalden niet te diep gaan, noch in de scheede blijven haken, of eene der slagaderen of groote aderen achter het scheedevlies treffen. Door de draden wordt nu de geheele Baarmoeder tot aan de scheede ter afsnijding vastgemaakt, en dan, terwijl een helper de schaamlippen van elkander houdt, het scirrheuse en kankerachtige met eenen smallen en sterken, scherpsnijdenden en van voren stompen bistouri tot aan het gezonde uitgesneden. Dit moet men op het gevoel, door de gladdere oppervlakte en elastieke vastheid, van de ruwe scirrheusiteiten onderscheiden, en de kromme bistouri dicht bij den hals, zoo hoog als mogelijk is, gebragt worden. De snede wordt boogsgewijs eerst ter dege, dan langzaam gedaan, om de scheede niet te kwetsen.

§. 791.

De tweede methode van OSIANDER is de volgende (*): wanneer de hals reeds voor het grootste gedeelte door den Kanker verteerd, wijd uitgezet, en de holte vol bobbelige, kankerachtige uitwasfen is, de Baarmoeder zich niet meer met de naalden vatten en aftrekken laat, dan plaatst men de zieke in eene bijkans horizontale ligging, laat eenen helper, met de vuist op den omtrek van den bodem gelegd, de Baarmoeder neêrdrücken, bevestigt derzelver bodem in de holligheid van het heiligbeen met den

(*) t. a. pl. bl. 1302—3.

den wijsvinger der linkerhand , den middelsten- en ringvinger in de Baarmoeder , en snijdt nu , terwijl deze vingers de snede besturen , met eene kromme schaar en het exstirpeermes , al het fungueuse , ongelijke en scirrheuse bij kleine stukken uit. Zoodra dit geschied is , vult men de holte met eene spons , die in wijn met een bloedstelpend poeder , dat uit gelijke deelen aluin , Arabische gom en harst bestaat , gedoopt wordt ; brengt , nadat de bloeding gestild is , eene spons , met Goulardwater en azijn natgemaakt , er in , om de ontsteking tegen te gaan. Zoodra er nu etter aan de spons gezien wordt , dan bevordert men die door gepaste middelen , waartoe OSIANDER een bijzonder mengsel uit het extr. nuc. jugl. , honig en rood precipitaat aanprijst , hetwelk op eene spons tegen de uitgesneden deelen zoo naauwkeurig geplaatst wordt , dat daarvan de scheidde , naar voren toe , bijna geheel onaangeraakt blijft. Is de ettering zeer sterk , dan neme men daarvan eene geringere hoeveelheid , en zonder precipitaat ; te gering bevonden wordende , dan wordt hetzelfde er bijgedaan en de hoeveelheid naar bevinding vermeerderd. De genezing moet tevens door inwendig versterkende middelen , bijzonder door kina , bevorderd worden.

§. 792.

De Schrijver , die gelegenheid had , zoo dikwijls den Scirrhus en Kanker der Baarmoeder , bijzonder in Berlijn , waar te nemen en te behandelen , heeft zich nog in geen geval van de mogelijkheid eener volkomene Uitsnijding der scirrheuse en kan-

kerachtige Baarmoeder kunnen overtuigen. Drie malen had hij echter reeds het scirrheuse en tot kankerzweer overgegangene scheidedeel geëxstirpeerd, waartoe hij zich eens van OSIANDER's en zijner eigene scharen ter wegneming der baarmoederpolypen bediende. In één geval werd het polypeuse uitwas met een gedeelte van het scirrheuse en kankerachtige scheidedeel uitgesneden (*); waarop eene zeer gevaarlijke bloeding volgde, welke nogtans gelukkig gestild werd. Twee malen werden door den Schrijver de bloemkool aardige, fungeuze, kankerachtige tot in de scheidde zich uitstrekkende uitwasfen insgelijks met een gedeelte van het scheidedeel uitgesneden, en de daarop gevolgde bloedingen weldra gestild; naderhand, op den raad van OSIANDER, inspuitingen met de aqua laurocerasi aangewend, en deze ook tot een inwendig gebruik toegediend. De zieken bevonden zich eenigen tijd merkelijk beter, namen in beterschap toe, vloeijing en koorts bleven weg; zij kregen meer eetlust, werden sterker en opgeruimder van geest. Eene derzelve was zoo zeer in krachten en gezondheid toegenomen, dat zij eene tamelijk verre reis aanvaardde kon. Dan bij beide, en wel bij de laatstgenoemde, keerden een jaar daarna steken, pijnen, koorts en vloeijing, als ook de geheele vreesfelijke kwaal weder, waaraan zij stierven.

L I T-

(*) Men zie des Schrijvers *Journal für Geburtshülfe, Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten*. III. B. 1e. St. S. 49.

LITTERATUUR.

§. 793.

MART. FABRICIUS, *de cancro non ulcerato seu apostematoso*.
Basil. 1602.

HOLSTEN, *de scirrho. ib.* 1608. 4°.

SCHILLING, *Καρκινώματος ενιαγγαφία*. Argent. 1649. 4°.

BLONDEL, *Epistola ad ALLIOTUM, de cura carcinomatis
absque ferro vel igne*. Par. 1665.

HOCHREUTINERUS, *generalis scirrhi descriptio*. Basil.
1682. 4°.

ADR. HELVETIUS, *Lettre sur la guérison du cancer; achter
deszelfs Traité des pertes de sang*. Par. 1691. 12°.

J. B. ALLIOT, *traité du cancer. ib.* 1698. 12°.

GENDR. DESHAYES, *sur la nature et la guérison des cancers*.
ib. 1701. 12°.

TISSOT, *de scirrho. Lugd. Bat.* 1718. 4°.

BURCHARD, *de tumoribus scirrhis*. Rostoch. 1727.

MELCHIOR, *de scirrho. Lugd. Bat.* 1729. 4°.

GEORG. WOLFFG. WEDEL, *de scirrho. Jen.* 1731. 4°.

MICH. ALBERTI, *de cancro. Hal.* 1731. 4°.

KAAUW, *de scirrho. Lugd. Bat.* 1738. 4°.

THOM. BECHET, *de cancro. Lond.* 1740.

J. GRASHUIS, *exercitatio medico chirurgica de scirrho et
carcinomate. Amst.* 1741. 8°. *cum fig.* Ook onder den
titel: *Verhandeling over den Scirrhus en Kanker, of
Knoest- en Kreeftgezwellen. Ald.* 1764. met pl. 8°.

ANT. LOUIS, *observations et remarques sur les effets du virus cancéreux, et sur les tentatives qu'on peut faire pour découvrir un spécifique contre ce vice. Par.* 1747.

POUSSE, *an tumoris cancosi radicitus ablati regeneratio rursus chirurgiae tradenda? ib.* 1750.

GEORG. ERH. HAMBERGER, *de scirrho. Jen.* 1751. 4°.

TRILLER, *de nociva cancri inveterati exstirpatione, novis exemplis demonstrata. Witeb.* 1752. 4°.

J. G. ROEDERER, *de scirrho uteri. Goett.* 1754. Ook in deszelfs *Opusc. medic.* geplaatst.

GRAM, *de scirrho et carcinomate. Lugd. Bat.* 1755. 4°.

HALLER, *Collect. diss. Pr. IV. N°.* 141.

Dezelfde, *Comment. de uteri scirrho. Goett.* 1756. *Comm. Lips. Vol. II. p.* 42.

J. PHIL. BERCHELMANN, *Abhandlung vom Krebs. Frankf.* 1756.

GASSMANN, *de scirrho uteri. Argent.* 1758.

RICH. GUY, *essays on scirrhus tumours and cancers. Lond.* 1759. 8°.

GLADBACH, *de scirrho in genere. Jen.* 1759. 4°.

CAR. FRID. KALTSCHMID, *de scirrho in genere. ib.* 1759. 4°.

KEMME, *de genesi scirrhorum simplicium. Hal.* 1760. 4°.

BOEHMER, *de cancro occulto et aperto. Hal.* 1761. 4°.

RAPH. BIENV. SABATIER, *observation anatomique sur deux ovaires squirrheux; V. Académie des sciences de Paris.* 1766. *Histoire*, p. 57.

BERN. PEYRIÏHE, *diss. de cancro quam duplici praemio donavit illustris academia scientiarum humaniorum, litterarum et artium Lugdunensis. Par.* 1774. 12°.

GAËT. MERULA, *riflessioni sulla natura, cagione e cura dei cancri. Flor.* 1775. 8°.

MELM. GUY, *select number of scirrhus an cancerous cases.* Lond. 1777.

WESTER, *de signo scirrhi caracteristico.* Erford 1777. 4°.

Handelingen van het Geneeskundig Genootschap: Servandis Civibus. 4e. D. Amst. 1779. 8°.

WAGNER, *de scirrho et cancro.* Vienn. 1783. 4°.

WILL. NORFORD, *essay on the general methode of treating cancerous tumours.* Lond. 1783.

J. BURROWS, *new practical essays on cancers.* ib. 1783.

HAHN, *de cancro occulto et aperto.* Giess. 1784. 4°.

HENR. SAFFORY, *treatise on the cause and effects on scirrhus tumours and cancers.* Lond. 1786.

ZENCKER, *de scirrho et cancro.* Hal. 1786. 4°.

BARFORTH, *de criteriis et remediis cancri adhuc dubiis.* Lond. 1787.

DOWNMAN, *physico-mechanical dissertation on the scirrhus.* ib. 1788. 8°.

SOMMER'S *Geschichte eines Mutterkrebses mit, während der Krankheit, entstandener Schwangerschaft.* In STARCK'S *Archiv für die Geburtshülfe*, im III. Band. 3 St. S. 288.

R. B. CHESTON, *over Knoestgezwellen en Waterzucht van den Uterus en der Eijerstokken.* In deszelfs *path. inq.* Cap. IV. p. 44.

AD. CRAWFORD, *experiments and observations on the matter of cancer.* Lond. 1790. 8°.

J. H. JAENISCH, *von dem Krebs and dessen Heilart.* Petersb. 1793.

JOHN PEARSON, *practical observations on cancerous complaints.* Lond. 1793. 8°.

BOELHOWER, *de scirrho vero.* Duisb. 1793. 4°.

JOHN HOWARD, *the plan adopted by the governors of the Middlesex Hospital for the relief of persons afflicted with cancer.* Lond. 1793.

W. LEURS, *Verhandeling over den Kanker.* In de Prijsverhandelingen van het Heelk. Genootschap te Amsterdam. 2e. deel. Amst. 1793. 8°.

BRACH, *cur resecto scirrhus aut carcinomate in iisdem aut vicinis partibus malum saepissime redeat.* Colon. 1794.

WILL. NISBETH, *inquiry into the history, nature, causes and differens modes of treatement of scrophula and cancers.* Edinb. 1794. 8°.

CHR. GATTFR. WHISTLING, *ältere and neuere Kurmethode des offenen Krebses.* Altenb. 1796. 8°.

JÖRDENS, *über den Scirrhus und das Carcinoma der innern weiblichen Geburtstheile.* In HUFELAND's Journal. IX. B. I St. N°. 7.

DOMLING, *Beobachtungen über die Heilung der Verhärtungen und der anfangenden Krebsgeschwüre in der Gebärmutter.* In HORN's Archiv für medicinische Erfahrung, bl. 610.

HORN, *Bemerkungen und Beobachtungen über den Krebs des Uterus.* In deszelfs Archiv für prakt. Medic. und Klinik. I. B. I St. bl. 9.

STRUVE, t. a. pl.

OSIANDER, t. a. pl.

KRAUEL, *de signis canceri uteri, observationibus illustrati.* Jen. 1796. 4°.

NAEF, *de scirrhus.* Goett. 1802. 4°.

STAHL, *de tumoribus atque ulceribus, scirrhi et canceri nomine notis.* ib. 1802. 4°.

CLAUD. NORMAND, *observation sur la transformation d'un ovaire en une masse squirrheuse du poids de cinquante-cinq livres*; V. *Recueil périodique de la Société de médecine de Paris*. T. LVI. p. 145.

J. B. AUBLANG, *diss. sur le cancer*. Par. an XI. 8°.

J. C. BEGUIGNOT, *diss. sur les différens moyens employés pour la cure du cancer*. ib. an XI. 8°.

ET. JAC. LEGOUX, *diss. sur le cancer*. In het derde Deel van DESAULT, *Oeuvres chirurgicales*. ib. 1803. 8°.

G. J. GARNIER, *diss. sur le cancer*. ib. an XII. 4°.

ANT. FOURCADE, *sur le cancer de l'utérus, précédé de quelques considérations générales sur celui de toutes les parties*. ib. an XIII. 4°.

W. BUSCH, *observations on the cause and formation of cancers*. Lond. 1804.

HENR. FEARON, *Treatise on cancers*. ib. 1804, waarvan sedert den jare 1784 vijf uitgaven in het licht verschenen zijn.

SAM. YOUNG, *enquiry into the nature and action of cancer, with a view to the establishment of a regular mode of cure by natural separation*. ib. 1805.

WILL. THOMAS, *commentaries on treatement of scirrhi and cancer*. ib. 1805.

EVER. HOME, *observations on cancer*. ib. 1805.

F. TERRIER, *observations et considérations sur le cancer*. Par. 1806. 4°.

RICH. CARMICHAEL, *essay on the effect on carbonat on iron upon cancer*. Lond. 1806.

A. V. A. VIEL-HAUTMESNIL, *considérations générales sur le cancer*. Par. 1807. 4°.

E. J. F. LEGER, *sur les affections cancéreuses*. ib. 1811. 8°.

G. L. BAYLE, *vues théoriques et pratiques sur le cancer.*
In *Bibl. médicale.* Vol. XXV. ib. 1812.

C. WENZEL, *über die Induration und das Geschwür in indu-*
rirten Theilen. Mainz. 1815. 8°.

C. G. F. ODEN, t. a. pl.

Dr. F. J. BEYERLE, *über den Krebs der Gebärmutter. Ein*
historisch-klinischer Versuch. Mannh. 1817. 8°.

JAM. WARDROP, t. a. pl.

H A N D B O E K
O V E R D E
K E N N I S E N G E N E Z I N G
D E R
Z I E K T E N
V A N H E T
V R O U W E L I J K E G E S L A C H T ;

D O O R
E. V O N S I E B O L D,
Consulterenden Arts en Hoogleeraar te Berlijn.

Uit het Hoogduitsch,
naar de *tweede vermeerderde en verbeterde* Uitgave,
door


J. J. G A A S W I J C K,
Praktizerenden Arts te Amsterdam.

TWEEDE DEELS TWEEDE EN DERDE STUK.



TE AMSTERDAM, BIJ
C. L. S C H L E I J E R.

1 8 2 3.



T W E E D E

V E R V O L G

V A N D E

NAAMLIJST DER INTEEKENAREN.

Abrahams, (Gebr.) Boekhandelaren, te Middelburg,
4 Exemplaren.

Alter, (S.) Boekhandelaar, te Utrecht, 2 Exemplaren.

Baalen, (J. van) Boekhandelaar, te Rotterdam.

Berghe, (A. van den) Med. Doct., te Oude Gastel.

Brave, (W.) Boekhandelaar, te Amsterdam.

Donk, (P.) Boekhandelaar, te Amsterdam.

Es, (P. E. van) Chirurgijn, te Ridderkerk.

Giltaaij, (D.) Chirurgijn, te Sliedrecht.

Haak & Comp., Boekhandelaren, te Leyden.

Heller, (A.) Med. Doct., te Steenberg.

Heller, (J.) Med. Doct., in de Willemstad.

Hendriksen, (J.) Boekhandelaar, te Rotterdam, 6 Exemplaren.

Hendriksen, (T. J. Wynhoven) Boekhandelaar, te Rotterdam, 2 Exemplaren.

Her-

Hermes, (M.) Med. Doct., te Zevenbergen.

Hölsan, (J. C.) Med. Stud., te Leyden.

Muisson. (J.) Chirurgijn, te Papendrecht.

Pesant, (A.) Lid van het Geneeskundig Onderzoek en
Toevoorzigt van Zuid-Holland, Chirurgijn enz., te
Strijen.

Sigtenhorst, (A. van den) Boekhandelaar, te Deventer.

Velden, (A. van der) Chirurgijn, te Ooltjensplaat.

Wyt, (M.) Boekhandelaar, te Rotterdam.



I N H O U D.



T W E E D E H O O F D S T U K.

Bladz.

OVER DE POLYPEN IN DE BAARMOEDER EN SCHEEDE.	173.
KENTEEKENEN, BELOOP EN GEVOLGEN VAN DEN BAARMOEDERPOLYP.	176.
OORZAKEN.	187.
VOORZEGGING.	ald.
GENEESWIJZE.	188.
OVER DE POLYPEN IN DE SCHEEDE.	204.
LITTERATUUR.	205.

D E R D E H O O F D S T U K.

OVER HET VLEESCH- EN SPEKGEZWEL EN DE BEEN- EN STEENACHTIGE VERGROEIJINGEN DER BAARMOEDER.	209.
I. OVER HET VLEESCH- EN SPEKGEZWEL DER BAARMOEDER.	ald.
KENTEEKENEN.	211.
OORZAKEN.	215.
VOORZEGGING.	216.
GENEESWIJZE.	218.
LITTERATUUR.	220.
II. OVER DE BEEN- EN STEENACHTIGE VERGROEIJINGEN DER BAARMOEDER.	ald.
LITTERATUUR.	222.

V I E R-

VIERDE HOOFDSTUK.

Bladz.

OVER DE VOOR- EN ACHTERWAARTSBUIGING	
DER BAARMOEDER.	223.
OORZAKEN EN GEVOLGEN.	224.
GENEESWIJZE.	225.
OVER DE ACHTERWAARTSBUIGING DER BAAR-	
MOEDER.	226.
LITTERATUUR.	228.

VIJFDE HOOFDSTUK.

OVER DE UITZAKKING DER BAARMOEDER.	229.
KENTEEKENEN.	ald.
GEVOLGEN.	231.
OORZAKEN.	233.
VOORZEGGING.	234.
GENEESWIJZE.	235.
LITTERATUUR.	247.

ZESDE HOOFDSTUK.

OVER DE UITZAKKING DER SCHEEDE.	249.
KENTEEKENEN.	ald.
OORZAKEN.	251.
GEVOLGEN.	252.
GENEESWIJZE.	ald.
LITTERATUUR.	255.

ZEVENDE HOOFDSTUK.

OVER DE SCHEEDEBREUK.	256.
KENTEEKENEN.	257.
OORZAKEN.	258.
GENEESWIJZE.	259.
LITTERATUUR.	262.

A C H T-

 ACHTSTE HOOFDSTUK.

	Bladz.
OVER DE BREUK VAN DEN BILNAAD. .	264.
KENTEEKENEN.	ald.
OORZAKEN.	265.
GENEESWIJZE.	ald.
LITTERATUUR.	266.

NEGENDE HOOFDSTUK.

OVER DE ZIEKTEN DER EIJERSTOKKEN. .	267.
ONTSTEKING DER EIJERSTOKKEN. . .	268.
KENTEEKENEN.	ald.
OORZAKEN.	269.
GENEESWIJZE.	ald.
VERETTERING VAN DEN EIJERSTOK. .	270.
KENTEEKENEN.	ald.
GENEESWIJZE.	271.
OVER DE VERHARDING EN WATERZUCHT DER EIJERSTOKKEN.	272.
KENTEEKENEN.	274.
LIJKOPENINGEN.	276.
OORZAKEN.	278.
VOORZEGGING.	281.
GENEESWIJZE.	ald.
LITTERATUUR.	283.

T W E E D E A F D E E L I N G.

OVER DE ZIEKTEN VAN HET REPRODUCTIEF
STELSEL.

E E R S T E H O O F D S T U K.

Bladz.

OVER DE WALGING, MISSELIJKHEID EN BRA- KING DER ZWANGERE VROUWEN.	285.
OVER DE EIGENDOMMELIJKHEID EN HET BE- LOOP DEZER ONGEMAKKEN.	ald.
OORZAKEN.	287.
VOORZEGGING.	289.
GENEESWIJZE.	290.
LITTERATUUR.	300.

T W E E D E H O O F D S T U K.

OVER DE BELUSTHEID, EN SODE DER ZWAN- GERE VROUWEN.	301.
I. OVER DE BELUSTHEID.	ald.
VERSCIJNSELEN.	—
GENEESWIJZE.	302.
II. OVER DE SODE.	303.
VERSCIJNSELEN.	ald.
GENEESWIJZE.	304.
LITTERATUUR.	305.

D E R D E H O O F D S T U K.

OVER DEN BUIKLOOP DER ZWANGERE VROU- WEN.	307.
VERSCIJNSELEN.	ald.
OORZAKEN.	—

VOOR-

	IX
	Bladz.
VOORZEGGING.	308.
GENBESWIJZE.	310.
LITTERATUUR.	315.

VIERDE HOOFDSTUK.

OVER DE HARDLIJVGHEID DER ZWANGERE	
VROUWEN.	316.
OORZAKEN.	ald.
GENEESWIJZE.	317.

VIJFDE HOOFDSTUK.

OVER HET KOLIJK DER ZWANGEREN. . .	322.
DIAGNOSIS VAN HET DARMKOLIJK. . .	323.
KENTEEKENEN VAN HET GALKOLIJK. . .	324.
KENTEEKENEN VAN HET NIERENKOLIJK. .	325.
HET DARMKOLIJK VAN DE WEEËN EN EENE OP HANDEN ZIJNDE ONTIJDIGE GEBOORTE ONDERSCHIEDEN.	326.
OORZAKEN VAN HET DARMKOLIJK BIJ ZWAN- GEREN.	327.
VOORZEGGING.	329.
GENEESWIJZE.	ald.

ZESDE HOOFDSTUK.

OVER DE GEBREKKIGE PISLOZING BIJ ZWAN- GEREN.	333.
STRANGURIE EN DERZELVER OORZAKEN. .	ald.
ISCHURIE EN DERZELVER OORZAKEN. . .	334.
ONWILLEKEURIGE PISLOZING EN DERZELVER OORZAKEN.	336.
VOORZEGGING.	ald.
GENEESWIJZE.	337.

STRAN

STRANGURIE.	339.
ISCHURIE.	341.
ONWILLEKEURIGE PISLOZING.	346.

Z E V E N D E H O O F D S T U K .

OVER HET ZUCHTGEZWEL DER ZWANGEREN.	350.
VERSCIJNSELEN.	ald.
OOZAKEN.	351.
VOOZEGGING.	352.
GENEESWIJZE.	354.
LITTERATUUR.	358.

A C H T S T E H O O F D S T U K .

OVER DE ZIEKTEN DER HUID.	359.
OOZAKEN.	ald.
VOOZEGGING.	365.
GENEESWIJZE.	ald.
LITTERATUUR.	369.



TWEEDE HOOFDSTUK.

Over de Polypen in de Baarmoeder en Scheede.

§. 794.

Tot de zeer merkwaardige misvormingen, die in de Baarmoeder voortgebracht worden, behooren de Polypen.

§. 795.

Vorm, gedaante, grootte en weeffel der baarmoederpolypen is onderscheiden. Men vindt dezelve rond, anderen kegelvormig, langwerpig, naar eene peer of eenen bloembol gelijkende, de gewoonlijkste vorm, welken zij door de Baarmoeder zelve bekomen. Derzelver uitwendig voorkomen is of geheel glad, met een vlies omgeven of meer vlokig, ruig en oneffen. Dezelve zijn nu eens van eenen dunnen, dan wederom van een' dikken steel voorzien, of somtijds met eenen breeden basis aan de Baarmoeder gehecht. De omtrek van den wortel staat tot dien van het ligchaam als een tot drie, of dezelve is wel half zoo groot. De wortel van den

Polyp bestaat niet altijd uit een' dunnen steel, daar die dikwijls eerst door het afbinden ontstaat. De kleur is rood en naar eenen vleeschklomp gelijkende. Deszelfs weeffel vormt eene vezelachtige vlecht, uit celwysweeffel bestaande, en is nu eens digter, dan dunner en weeker, dikwijls slijm- of sponsachtig, naar dat van den moederkoek gelijkende, en met doorlopende holten en buizen voorzien. Men treft Polypen van eene vliesachtige zelfstandigheid aan, met bloedvaten doorweven, waaraan men slagaderlijke openingen duidelijk zoude waargenomen hebben, hetgeen echter door L'AUMONIER tegengesproken wordt (*). LEVRET zag in eenen door hem afgebonden Polyp eene slagader van eene tamelijke wijdte (†). Dezelve bevatten dikwijls eene vetachtige stoffe of bloed, nu en dan loopen er vliesachtige of, bij derzelver vorming, naar banden gelijkende striemen door. De Schrijver bond eenen Polyp af, welke geheel glad was, en over het geheel eene hoornachtige masfa voorstelde, welke men in bijzondere lagen, gelijk het hoornvlies van het oog, ontleden kon; men zag geene bloedvaten. Grootte en zwaarte der polypen zijn onderscheiden. De Schrijver zag dezelve ter grootte van een duiven- en ganzenei af, tot aan die van een klein kinderhoofd toe; dezelve wogen van een tot twee lood, en de grootste was van een en een half pond. Anderen hebben dezelve van de grootte eens kinderenhoofds en ter zwaarte van zes of zeven ponden waargenomen.

W. M.

(*) Zie FOURCROY, *de la médecine éclairée*. T. IV. 1792.

(†) Zie *Sammlung auserles. Abhandl.* XX. B. 3e. u. 4c. St.

W. M. RICHTER (*) gewaagt van eenen Polyp, welke vier en een half pond, en A. G. RICHTER (†) van eenen buitengemeen zwaren, die tien en een half pond woog.

§. 796.

De Polypen ſchijnen in het ſpons-vaatachtig tuſchenweeffel der Baarmoeder te ontſtaan, en uit derzelver ſlijmholen en vaten hun voornaamſte voedsel te bekomen. Derzelver vorm en dikte bepaalt zich gedeeltelijk door de zamentrekking en de drukking van het ſpierachtig weeffel, waardoor derzelver uitwendige gedaante met die van de Baarmoeder het meeste overeenkomt. Voor het overige zijn de Polypen van dien aard, dat zij of met het binnenſte vlies der Baarmoeder, die buitengemeen uitgeſtrekt en verdund kan worden, bedekt blijven; als wanneer dezelve gewoonlijk op het gevoel zeer glad zijn, en het meest in den waan kunnen brengen, om dezelve aanvankelijk voor eene omgeſtulpte Baarmoeder te houden. Of het vlies barst, wanneer het de al te ſterke uitzetting van den te ſchielik groeienden Polyp niet wederſtaan kan; of deze dringt door hetzelve heen, zonder hetzelve uit te zetten, in welke beide gevallen derzelver oppervlakte niet glad, maar ruwer, meer oneffen en ſponsachtig zich voordoet.

§. 797.

(*) G. M. RICHTER *Synopsis praxeos medico-obstetriciae Mosquae*. 110. 4. p. 115. Tab. VI.

(†) A. G. RICHTER *medic. chir. Bibl.* IX. B. 252.

§. 797.

De Polypen der Baarmoeder kunnen in derzelver bodem, ligchaam of hals ontstaan. De Schrijver heeft een geval waargenomen, dat de Polyp inwendig aan het, in de Scheede vooruitstekende, scheede-deel was ontstaan. Men vindt somtijds twee te gelijk aanwezig, bij voorbeeld den eenen op den anderen, kunnende de eerste den uitgang van den tweeden beletten. In één geval bemerkte de Schrijver, nog niet lang geleden, na het uitsnijden van den eersten grooten, tot in de Scheede en bijna door het verwijde Hymen reeds gezakten Polyp, dat er nog twee kleine, zeer dicht bij elkander liggende, Polypen aanwezig waren, welke hij door een bijtmiddel wegnam. Men heeft ook eenen Polyp aan den hals der Baarmoeder aanwezig gevonden, terwijl de andere zich aan derzelver bodem gehecht had.

§. 798.

De Polyp bevindt zich of nog in de Baarmoeder, of is uit den moedermond in de Scheede overgegaan. Voor het overige kan die ook in de Scheede zelve ontstaan.

*Kentceken, beloop en gevolgen van den
Baarmoederpolyp.*

§. 799.

Zoo lang de Polyp nog in de holte der Baarmoeder zich bevindt, en nog niet tot in den moedermond en de scheede gezakt is, dan blijft deszelfs Diagnosis bedriegelijk en moeilijk. Deze
doet

doet ook ligt eene zwangerheid vermoeden: ten zij de zieke, ten gevolge van haren ouderdom, de vatbaarheid ter bevruchting verloren hebbe.

§. 800.

De Polyp, nog klein zijnde, veroorzaakt geene de minste aanmerkelijke storing, noch in de teeldeel-
len, noch in de verrigtingen of vormfels van het Organismus in het algemeen. In grootte toene-
mende, bespeurt men meermalen misfelijkheid, bra-
king, trekkingen in de lenden en den omtrek van
het kruis, steken en jeuken in de borsten: verschijn-
felen, die het begin eener zwangerheid kenmerken.
De maanstonen kunnen bij den Polyp wegblijven,
of er doet zich eene bloedstorting voor. Nog groo-
ter wordende, volgt er eene uitzetting der Baarmoe-
der, en de Polyp veroorzaakt een gezwel achter de
schaambeensvereening: de moedermond is geopend,
derzelver lippen zijn aanvankelijk nog hard; het on-
derste gedeelte is hard, breed, dik, en de Baar-
moeder in derzelver omvang, zoo ver men die met
de vingers bereiken kan, grooter dan gewoonlijk
en overeenkomstig de uitzetting in de zwangerheid.

§. 801.

Om den Baarmoederpolyp van de zwangerheid te
onderscheiden, wordt er naauwkeurig onderzoek en
oplettendheid vereischt, of de persoon zich nog in
den ouderdom eener mogelijke bevruchting bevinde
en of er werkelijk bijslaap voorafgegaan zij. Spreken
deze bijzonderheden tevens ook voor de mogelijk-
heid eener zwangerheid, dan onderscheidt men deze

van den Polyp door de volgende verschijnselen: 1) de ziekteverschijnselen, welke zich in de eerste maanden der zwangerheid voordoen, nemen in deze meer en meer af, en de zwangere gevoelt zich, naar mate hare verlossing nadert, gewoonlijk beter en gezonder; terwijl die, welke aan den Baarmoederpolyp lijden, met deszelfs toeneming zieker worden; 2) de borsten zwellen in de zwangerheid meer en meer, en het meest tegen het laatste tijdperk van dezelve: bij den Baarmoederpolyp zijn de borsten nu eens vol, dan wederom flap, en bereiken in het eerste geval nimmer dien graad van uitzetting, gelijk in de zwangerheid; 3) de maanstonen verschijnen, wel is waar, somtijds ook nog in de zwangerheid, maar houden toch eenen meer geregelden Typus, zonder overvloediger te worden, of de gewone kleur te veranderen: bij den Baarmoederpolyp verschijnen dezelve ongeregeld, menigvuldiger en niet zelden met pijn vergezeld; het afvloeiende bloed zelfs is helderder, waterachtiger en met vezelachtige deelen vermengd; 4) in de zwangerheid is de uitzetting van den buik grooter en gelijkvormiger: bij den Baarmoederpolyp is de buik meer ongelijk, en ter plaatse waar de Polyp gehecht is, veelal verhevener; ook bereikt de buik nimmer die dikte gelijk in de zwangerheid, en neemt, op zekere tijdperken, met den Polyp in omvang toe; 5) in de zwangerheid zet zich het scheededeel der Baarmoeder van tijd tot tijd uit, dezelve is elastiek en week op het gevoel en de moedermond gesloten; deze opent zich slechts, wanneer de vrucht of eene mola uitgedreven wordt, hetgeen zich te voren door

pij-

pijnen — weeën — aankondigt: bij den Polyp opent zich de binnenste moedermond zonder ware weeën, en blijft open, ja kan, volgens waarnemingen van den Schrijver, verscheidene jaren open blijven, zonder dat het scheidedeel zoo regelmatig uitgezet, zoo week en verdund is, en de lippen van den moedermond zoo geheel verdwijnen; 6) het scheidedeel met deszelfs moedermond is in de zwangerheid weeker; bij den Polyp harder: en wanneer de Polyp in de Scheede zakt, gevoelt men een peerachtig ligchaam; 7) in de zwangerheid doet zich de beweging van het kind gevoelen: bij den Polyp niet; 8) in de zwangerheid wordt de zwangere gezonder, hoe meer het einde van dezelve nadert: bij den Polyp bemerkt men juist het tegendeel; er doet zich, hoe langer de Polyp duurt, eenen hooger graad van onpasfelijkheid voor; 9) de duur der zwangerheid is tot op eenen gestelden tijd bepaald: niet zoo bij den Polyp; 10) bij de aanwezigheid van eenen Polyp ontlast zich een vocht, met afgebrokene stukken van den Polyp vermengd, welke nu en dan zeer stinkende is.

§. 802.

Zoo lang de Polyp nog in de holte der Baarmoeder zich bevindt, is dezelve moeilijk te voelen; ten zij men bij het onderzoek de geheele hand in de Scheede, en de vingers dieper in den geopenden moedermond, en, wanneer het mogelijk is, in de holte der Baarmoeder steke, om dien te ontdekken.

§. 803.

De Polyp kan, volgens de waarneming van den Schrijver, zich in de holte der Baarmoeder langen tijd ophouden, zonder zeer gevaarlijke storingen te veroorzaken, en Vrouwen nemen dien somtijds mede in het graf, zonder dat dezelve als de oorzaak van haren dood beschouwd wordt; of de storingen doen zich vroeger voor, als de Polyp uit den moedermond in de scheede zakt. Alsdan hebben er gewoonlijk hevige bloedstoringen, duizelingen, flauwten, eene aanmerkelijke verzwakking en sluipende koortsen plaats.

§. 804.

De Polyp, zoo lang dezelve zich nog in de holte der Baarmoeder bevindt, geene gevaarlijke storingen te weeg brengende, neemt in grootte en lengte toe, opent den moedermond, en zakt eindelijk door denzelfen in de scheede. Dit volgt of plotselijk op eenmaal, en dan meestal na zekere voorafgegaane invloeden, als hevige schudding van het ligchaam, stooten, drukking, val en dergelijken; of dezelve zakt allengskens, en wordt dan gemeenlijk door trekkingen in het kruis en in de lenden, door pijnen in de schaamstreek en in den buik, weeën-aardige kramppijnen, aandrang op de teeldeelen, een gevoel als wilde een ligchaam er uit vallen, en door eene herhaalde hardlijvigheid en belette pisolozing voorafgegaan.

§. 805.

§. 805.

Zoodra de Polyp deszelfs verblijf in de Scheede genomen heeft, dan begint dezelve spoediger in grootte en lengte toe te nemen, en ook verschijnselen te veroorzaken, die een dringend gevaar aankondigen: de stoelgang en de pislozing worden gestoord; de zieke gevoelt dikwerf huivering en koude, met heviger pijnen in het kruis, de lenden en heupen afwisselende; er doen zich vele, zeer belangrijke bloedingen en de gewone verschijnselen der daaruit ontstane verzwakking voor. Deze bloedingen worden ligt door uitwendige invloeden, bij voorbeeld door de minste schudding van het ligchaam, vermeerderd. Het afloopende bloed is nu eens zwart, dan wederom hoog rood, nu eens waterachtig, bruinachtig, met vele vlokken en vezels vermengd, en riekt somtijds buitengemeen, bijzonder wanneer de Polyp reeds de buitenste opening der Scheede genaderd is, en er dan de buitenlucht des te eer bijkomen kan. Sometijds loopt het bloed strooms- en stuksgewijze af; dikwijls vallen er ook half vergane, zeer stinkende stukken uit de Scheede. — Doch niet altoos komt er rood bloed, maar veel slijmerig en weiachtig vocht voor den dag, waardoor de zieke niet weinig verzwakt wordt.

§. 806.

Als de Polyp zich eenigen tijd in de Scheede ~~op~~gehouden heeft, dan treedt die eindelijk ook uit deze te voorschijn, hetzij allengskens of plotselijk, na eene voorafgegane schudding van het ligchaam.

Hierop ontstaan wederom andere storingen van eenen hooger en graad: de zieke gevoelt, gaande of staande, gewoonlijk eene pijnlijke trekking en spanning in den buik; de pisblaas en pisbuis worden meer of min uit derzelve natuurlijke ligging verdrongen, hetgeen ook eene veel grootere storing in de pisolozing veroorzaakt; de zieke klaagt over een gevoel van uiterste afmatting en zwaarte in de onderste extremiteiten, bijzonder in de lenden en dijen; het lijf wordt meer opgezet, hard en weder pijnlijk; de ademhaling gaat met meerderen angst gepaard en wordt door een' droogen hoest afgebroken; er doet zich eene sluipende koorts, rilling, afwisselend met hitte en brandende handen, voor; de eetlust neemt af; de slaap wordt onrustig en door vele droomen afgebroken; de pols is klein en zeer snel; de krachten nemen zichtbaar af, en de dood volgt door eene zenuwkoorts, door eene sluipende koorts, door waterzucht, of zeldzamer door eene bloedstorting, welke plotselijk een einde aan het leven maakt.

§. 807.

Hoogst zeldzaam bespeurt men, dat de Polyp door eigene werkzaamheid der Natuur van deszelfs zamenhang met de Baarmoeder gescheiden, en, nadat dezelve, van alle organische gemeenschap verfloken, tot rotting overgegaan is, uitgedreven wordt. Als dit zeldzaam geval al plaats heeft, dan is de zieke in dit tijdperk meestal reeds zeer verzwakt, en de afzondering van den Polyp zelve gewoonlijk met eene voor het leven gevaarlijke bloedstorting vergezeld.

§. 808.

§. 808.

De Polyp kan ook nog gemakkelijk met eene uitzakking der Baarmoeder, met of zonder omstulping derzelve, verwisfeld worden. Slechts een naauwkeurig onderzoek kan en moet beslissen; waarbij men nog bijzonder acht moet geven, of de Polyp zich binnen of buiten de Scheede bevindt, ten einde dien niet voor eene volkomene of onvolkomene uitzakking der Baarmoeder te houden.

§. 809.

Van eene onvolkomene uitzakking der Baarmoeder onderscheidt men den Polyp door de volgende teekenen: 1) de Polyp is weeker, toegevender, en minder gevoelig bij de aanraking: de uitgezakte Baarmoeder niet zoo week, maar gevoeliger; 2) als het eene uitzakking der Baarmoeder is, dan voelt men den moedermond: bij den Polyp niet; doch men vindt somtijds eene diepte aan den Polyp, welke men voor den moedermond zoude kunnen houden; maar in den eersten zal niet, gelijk in den laatsten, eene Sonde doorgaan; 3) de Polyp heeft de gedaante eener omgekeerde peer of uije; dezelve wordt aan het benedeneinde het dikst, doch bovenaan, naar den moedermond toe, het dunst gevoeld: de uitgezakte Baarmoeder is van onderen dun, en wordt naar boven allengskens dikker; 4) de uitzakking der Baarmoeder gaat zelden gepaard met eene bloedvloeijing, waardoor zich de Polyp bijzonder onderscheidt; 5) den Polyp kan men niet terugbrengen, elke poging daartoe baart pijn: de uitgezakte Baarmoeder kan men inbrengen, en de zieke gevoelt zich

zich naderhand verligt, pijnen en andere ongemakken houden op; 6) men kan eene Sonde, naast den Polyp, diep in de Scheede tot aan den bodem der Baarmoeder brengen: doch wanneer men dezelve naast de uitgezakte Baarmoeder inbrengt, dan stoot die zeer ligt tegen het, naast den baarmoederhals uitgezakte, bovenste gedeelte der Scheede.

§. 810.

De uit de Scheede gezakte Polyp is van eene volkomene uitzakking der Baarmoeder gemakkelijker te onderscheiden; want 1) gevoelt en ziet men bij dezen den moedermond: bij den Polyp niet; 2) naast de uitgezakte Baarmoeder kan geene Sonde diep in de Scheede gebragt worden, maar wel naast den Polyp; 3) de gedaante van den Polyp is anders dan die der Baarmoeder; 4) bij den Polyp buiten de Scheede neemt men de bij §. 805 bijgebragte verschijnselen waar, welke bij de volkomene uitgezakte Baarmoeder meestal in het geheel niet plaats hebben.

§. 811.

Van de omstulping der Baarmoeder, binnen de Scheede, onderscheidt zich de nog niet uit deze gezakte Polyp door de volgende teekenen: 1) de omstulping der Baarmoeder is gewoonlijk het gevolg eener kort te voren plaats gehad hebbende verlossing; de gedaante van den Polyp is van boven smal en van onderen breed: die der omgestulpte Baarmoeder is juist het tegendeel; 2) bij eenen zeer grooten Polyp in de Scheede gevoelt men altijd maar zeer weinig van den moedermond: bij de omstulping, zonder uitzakking

king der Baarmoeder van eene geringe grootte, is de moedermond zeer uitgezet en verwijd; 3) de terugbrenging der omgestulpte Baarmoeder verligt de ongemakken, terwijl die van den Polyp dezelve doet toenemen; 4) krabt men met den nagel des wijsvingers aan de omgestulpte Baarmoeder, of raakt men dezelve met eene ingebragte spitse Sonde aan, dan gevoelt de zieke het eerste, terwijl zij in het tweede geval gevoel van steken en pijn heeft; de Polyp veroorzaakt bij de genoemde proefnemingen pijn noch steken.

§. 812.

Gemakkelijk kan men zich ook bij den, buiten de Scheede hangenden, Polyp vergisfen, en dien voor eene omstulping der Baarmoeder buiten de Scheede of voor eene uitzakking houden, dewijl de gedaante van den Polyp met die der omgestulpte Baarmoeder gelijk staat — beiden zijn van onderen dik en van boven dun, — en omdat bij de omgestulpte Baarmoeder, zoo min als bij den Polyp, aan het benedenste gedeelte eene opening te ontdekken is. Slechts het zorgvuldigste onderzoek kan hier beflissen: 1) de omgestulpte Baarmoeder bestaat van boven, vooral in de Scheede, den moedermond in de gedaante eener plooi, of liever van eenen ring, langs welken de binnenste vlakke van den bodem der Baarmoeder gezakt is: deze plooi wordt bij den Polyp niet aangetroffen; 2) aan de zijde van den Polyp kan men den vinger of eene Sonde diep in de Scheede brengen, en niet aan die der omgestulpte Baarmoeder; 3) de steel of het boven dunner gedeelte van den

den Polyp is op het gevoel hard en vast: doch die der Baarmoeder is week, toegevend en slap, dewijl dezelve hol is; 4) de omstulping der Baarmoeder wordt door eene voorafgegane verlossing veroorzaakt; 5) de omgestulpte Baarmoeder is bij de aanraking pijnlijk, de Polyp niet.

§. 813.

Over de Moederpolypen, welke in den omtrek van den hals der Baarmoeder, of aan den rand van den moedermond ontstaan, valt aan te merken, dat dezelve dadelijk bij den aanvang in de Scheede zakken. Dezelve worden derhalve vroeger en ligter herkend; en behalve dat deze het ligchaam der Baarmoeder niet zoo sterk uitzetten, veroorzaken dezelve, in omvang en grootte toenemende, dezelfde ongemakken, waarmede de, aan het ligchaam of den bodem der Baarmoeder vasthechtende Polypen gepaard gaan, slechts met deze uitzondering, dat de Bloedstoringen zeldzamer of in eenen minderen graad ontstaan, daar de steel van den Polyp niet door den moedermond bekneld wordt. Zoo dezelve zich tot aan den ingang der scheede verlengen, en uit deze te voorschijn komen, dan verwekken zij, behalve de in §. 805 bijgebrachte storingen, wel eene uitzakking der Baarmoeder, echter zonder omstulping derzelve.

§. 814.

Met den Polyp kan eene ziekelijke zwelling, eene werkelijke spekaardige of scirrheuse verharding der Baarmoeder gepaard gaan; de eerste is wel meestal van eenen zachteren of hooger en graad, som-

somtijds ook nimmer aanwezig, gelijk de Schrijver door een naauwkeurig onderzoek bevestigen kan; het meest heeft er eene scirrheuse verharding plaats, welke dan eens de oorzaak, somwijlen ook het gevolg van den ontstanen Polyp zijn kan. Behalve de teekenen van den Polyp neemt men alsdan tevens die der zwelling en verharding van den Uterus waar.

Oorzaken.

§. 815.

De uitwendige oorzaken, welke tot het ontstaan van den Polyp aanleiding kunnen geven, zijn: venerische besmetting, bijzonder de venerische witte vloed, buitensporigheden in den bijslaap en in de zelfbevlekking, vreemde lichamen in de Baarmoeder, verwondingen derzelve, voornamelijk bij kunstmatige verlosfingen, ruwe behandeling der nageboorte, hevige kramppijnen der Baarmoeder en aanhoudende naweeën, veelvuldige bloedvloeijingen en te overvloedige maanstonen.

Voorzegging.

§. 816.

Polypen, die aan den hals der Baarmoeder derzelver zitplaats hebben, en gemeenlijk vroeger en ligter herkend worden, zijn minder nadeelig; veel gevaarlijker zijn de zoodanigen, welke aan het ligchaam, maar voornamelijk op den bodem der Baarmoeder vastgehecht zijn, en met eene zeer sterke bloedstorting gepaard gaan. Zoo lang deze geene plaats heeft,

heeft, is de voorzegging veel gunstiger; buitendien moet men daarmede voorzigtig zijn. — Hoe langer de kwaal duurt, hoe meer bloed de zieke verliest, en hoe hooger de graad der sluipende koorts is, des te twijfelachtiger wordt de genezing. In een tegenovergesteld geval kan men oneindig meer hoop voeden. — Polypen, die eenen dunnen steel hebben, worden ligter weggenomen, en zijn minder gevaarlijk, dan die, welke met eenen dikkeren steel, of met eenen breeden grond aan de Baarmoeder vastzitten. — Polypen verhinderen wel zeer dikwijls, maar in alle gevallen, der zwangerheid niet (*), doch bevorderen dan zeer ligt den abortus. — Zeer bedenkelijk is het, wanneer er met den Polyp tevens eene scirrheuse verharding gepaard gaat; als men den Polyp weggenomen heeft, dan volgt spoedig of langzaam de dood op eene kankerzweer, waarin de Scirrhus der Baarmoeder nu spoediger schijnt over te gaan.

Geneeswijze.

§. 817.

De Polyp der Baarmoeder kan het zekerste alleen door eene Operatie weggenomen worden, welke men echter in vele gevallen niet vroeger mag bewerkstelligen, voordat men tevens op deszelfs uitwendige oorzaak en op den toestand der zieke be-

(*) Men zie WIGAND in STARKS *neuem Archiv für die Geburtshülfe, Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten*, u. s. w. I. Bd. 1e. St. S. 130. Jena 1799.

behoorlijk gelet heeft. In dat geval kan, bij voorbeeld, venerifche befmetting de daarmede overeenkomende geneeswijze bevorderen; in het andere moet meermalen, bijzonder na reeds lang aanhoudende bloedvloeijingen, de ondersteuning der krachten door versterkende geneesmiddelen voorafgaan, voornamelijk wanneer reeds eene fluipende koorts daarmede gepaard gaat.

§. 818.

Om den Polyp der Baarmoeder weg te nemen, kent men verscheidene middelen: 1) het afdraaijen en uittrekken; 2) de afbinding; 3) het bijtmiddel of gloeiend ijzer; 4) het uitsnijden.

§. 819.

Het afdraaijen en uittrekken van den Polyp, indien mogelijk met de hand of met eene Polyp-tang, is geene aanprijzenswaardige methode, wijl zulks dikwerf zeer pijnlijk is, en tot ontsteking en bloedvloeijingen, tot uitzakking en omstulping der Baarmoeder aanleiding geeft.

§. 820.

Meer voorkeur verdient de afbinding, of met eenen, uit gewaste draden vervaardigden, strik, door middel van de hand alleen (*), of met een instru-

(*) De Schrijver heeft twee Baarmoederpolypen op deze wijze zeer gelukkig afgebonden, zonder zich van eenen Polypafbinder te bedienen. De eene Polyp was zelfs dicht aan den bodem der Baarmoeder geplaatst,

strument, hetwelk onder den naam van Polypafbinder bekend is.

§. 821.

Men kent verscheidene uitvindingen van Polypafbinders. Daartoe behooren de instrumenten van LEVRET, KECK, HERBINIAUX, CONTIGLI, DENMANN, JOHN HUNTER, SCHARP, DAVID, DESSAULT, RICHTER en GÖRZ; KLETT, NISSEN en JÖRG; STARK, LÖFFLER, WOLF, CULLEVIER, BOUCHER en SAUTER; ZANG, CLARKE, RIBKE, en meer andere. De Polypafbinders van NISSEN, KLETT, LÖFFLER, RIBKE en BOUCHER, met de door SAUTER gemaakte verbetering, prijzen zich door derzelyver bruikbaarheid het meeste aan.

§. 822.

Bij de afbinding van eenen Baarmoederpolyp gaat men op de volgende wijze te werk: Nadat men desnoods, om de Operatie gemakkelijk te maken, vooraf een ontlastmiddel toegediend, of eene klisteer gezet heeft, plaatse men de zieke half liggende en half zittende dwars in het bed, en drage men zorg, dat bijzonder de bilnaad en den omtrek van het zitbeen vrij blijve, om de hand en de instrumenten ongehinderd te kunnen inbrengen. De Arts, die zich voor de zieke plaatst, onderzoekt nog eens naauwkeurig, om zich van de gesteldheid, grootte en lengte van den Polyp, alsmede van de plaats van deszelfs aanhechting, naauwkeurig te overtuigen. Daarop brengt hij, bij voorbeeld, het met olie bestreken Nissen'sche instrument, vereenigd, en met een' draad, zonder daaraan gemaakten strik, zoo diep in de scheede,

de, totdat het bovineinde aan de plaats gebragt is, waarover hij den ftrik gemakkelijk aanleggen kan. Nu neemt hij de ftift er uit, waardoor beide buizen vereenigd zijn, houdt de eene buis ftijf en onbewegelijk vast, doch de andere brengt hij om het ligchaam van den Polyp heen, zoodat derzelver kromte altoos naar den Polyp gekeerd is, en de buis eindelijk weêr op derzelver eerste plaats komt, waar die, door middel van de ftift, met de andere buis vereenigd wordt. Alsdan worden de draden als naar gewoonte en zoo lang aangetrokken, totdat de lijderes pijn gevoelt. In het vervolg kan men om het lijf een' band, of een breed lint aanleggen, waaraan, door twee, in de nabijheid der liesftreek aangelegde, smalle bandjes, de buizen van het instrument vastgemaakt worden. Naderhand moet men drie of vier malen daags de draden fterker aanhalen, om den Polyp gefladig meer en meer zamen te binden, en deszelfs fcheiding van de organifche gemeenfchap te bevorderen. Daar men echter bij het aanhalen van den draad ligt te fterk trekken kan, zoo heeft JÖRG aan dit instrument eene verandering gemaakt, ten gevolge waarvan de beide buizen door eenen daaraan bijgebragten ring en klem, nadat dezelve om den Polyp heen gelegd zijn, zich niet weder van elkander verwijderen kunnen, en het spannen van den draad door eene fchroef allengskens en met meerdere voorzigtigheid kan bewerkftelligd worden.

§. 823.

Een foortgelijk gebruik, als met het Nifsenfche instrument, heeft bij de werktuigen van KLETT

en LÖFFLER plaats; alleenlijk verschilt de laatstgenoemde in de verbetering, welke de uitvinder later bekend maakte, en ten gevolge waarvan beenen kogels, gelijk aan de Polypafbinders van BOUCHER en RIBKE, aangebragt werden, om den steel van den Polyp te beklemmen.

§. 824.

De eenvoudigste, gemakkelijkste, goedkoopste en ligtst in het werk te stellen wijze, om den Baarmoederpolyp af te binden, is, ten minste naar de verzekering van den uitvinder, die van SAUTER, waartoe het instrument van BOUCHER hem op de gedachte gebragt heeft. Het geheele werktuig bestaat uit twee staafjes van balein, eene zijden koord, ongeveer zes en derig stuks kleine bolletjes, die van eenen gewonen paternoster, welken de Roomschegezinden gebruiken, kunnen genomen worden, en uit twee van hoorn vervaardigde bolletjes. De wijze van aanwending is als volgt: de twee staafjes van balein, als twee geleiders, worden beide met de strikken op den wijsvinger der linkerhand, achter en over den Polyp, bij elkander gebragt, de eene geleider vastgehouden, en de andere aan den Polyp gelegd en naar voren gebragt; even zoo wordt de vastgehouden geleider naar de tegenovergestelde zijde gebragt, en beide van voren met elkander vereenigd. Daarop worden de beide einden der koord vastgehouden en de bolletjes opgeschoven, totdat het bovenste tegen de vereeniging van de beide openingen der geleiders komt. Dan worden de beide geleiders, benevens het snoer bolletjes,

zoo lang in de hoogte gebragt, totdat men bespeurt, dat de strik het einde van den wortel des Polyps bereikt heeft. Vóórdat men nu de geleiders wegneemt, worden de beide koordeinden, welke uit de beide gaten van het onderste bolletje hangen, op de wijze der Heelmeesters geknoopt, en de strik door de naar boven drukking der bolletjes zoo vernauwd, dat die eenigzins vast om den steel zit; hierop worden de beide geleiders aangetrokken, en verrigt men de afbinding, zoo vast als noodig is.

§. 825.

Zoo de afbinding van den Polyp met eenen draad alleen geschieden kan, dan maakt men daaraan eene lus, brengt deze tot aan den steel van den Polyp, laat aan het eene einde eenen helper trekken, terwijl men met eenen vinger der ingebragte hand den Polyp eene drukking toebrenge, om te beletten, dat dezelve niet afscheure. Waar dit niet mogelijk is, kan de lus door de aangebragte bolletjes vernauwd en de Polyp beklemd worden.

§. 826.

De Polyp afgebonden zijnde, kunnen er verscheidene toevallen ontstaan, die de behandeling van den Arts vereischen. Hiertoe behooren: ontstekingskoorts, pijnen, kramp, bloedingen en toevallen door de drukking van den gestadig zwellenden Polyp. Buitendien prijze men de gestrengste rust in het bed, eenen doelmatigen leefregel en inspuitingen in de Scheede uit een aftreksel van kamillen of aroma-

tische kruiden aan, welke des te noodzakelijker zijn, wanneer de Polyp tot rotting overgaat, en eene stinkende uitvloeijing te weeg brengt.

§. 827.

De tijd, wanneer de Polyp zich geheel afscheidt, kan niet altijd naauwkeurig bepaald worden. Dit hangt zeer dikwijls van de dikte des steels, van deszelfs vasthechting en mogelijke beklemming af. De Schrijver zag den Polyp op den derden en vierden dag afvallen. In andere gevallen volgt deszelfs loslating eerst op den achtsten en negenden dag. De Polyp klein zijnde, volgt, bij deszelfs volkomen afsterven, den trek, die met den draad of het instrument gedaan wordt. Soms tijds valt dezelve daarmee af, wanneer de zieke van ligging verandert, in het bed knielt of opstaat. Doch een Polyp, die eenen grooten omtrek heeft, moet met eene kleine tang of het Polypinstrument van LEVRET uit de Scheede getrokken worden. Soms tijds kan er eene vroedkundige tang vereischt worden, zoo als SAUTER, bij eenen Polyp van twee en een half pond gewoon gewigt, zich genoodzaakt zag, des Schrijvers tang te gebruiken, en ter uithaling zoo veel kracht in het werk te stellen, als bij de geboorte van een beklemd hoofd noodzakelijk zou geweest zijn. Soms tijds bespeurt men, schoon men de afbinding verscheidene malen op nieuw sterk aangelegd, of den Polyp dagelijks vaster beklemd had, nogtans niet het minste blijk van afscheiding. Om in zulk een geval de zieke van den last en den stank te bevrijden, is het raadzaam, om den Polyp gedurende de

de afbinding af te snijden, hetgeen zonder pijn en bloeding geschieden kan, gelijk zulks de door MILLERET (*) medegedeelde Operatie getuigt.

§. 828.

Als er bij het afvallen van den Polyp eene bloeding ontstaat, dan wende men inspuitingen uit een aftreksel van kamillen met rozebladen, of eene oplossing van loodsuiker in kalkwater aan, vermijde echter te prikkelende inspuitingen, wanneer er verschijnselen eener baarmoederontsteking zich voordoen. De, na het afvallen van den Polyp ontstane, bloeding kan in vele gevallen zeer heilzaam zijn. Naderhand doet men, vooral bij meerdere afzondering van stinkende materie of etter, dikwijls inspuitingen uit het aftreksel van kamillen. En bijaldien deze toestand met hevige kramppijnen der Baarmoeder gepaard gaat, en deze zeer gevoelig en pijnlijk is, dan worden inspuitingen uit een aftreksel van het bilfen- en scheerlingkruid aanbevolen. Allengskens gaat men tot zamentrekkende inspuitingen over, om de te sterke afscheiding te beperken, en de geregelde zamentrekking der vaten te bevorderen. Tot dit einde wordt een afkooksel der kina of wilgenbast, met het kalkwater, de tinctuur van myrrhe e. d. g. aanbevolen. — De algemeene behandeling moet naar den toestand der zieke ingerigt worden.

Me-

(*) MILLERET, over eenen Moederpolyp. In het *Journal de Médecine, Chirurgie, Pharmacie etc.* Tom. 49. Année 1778. Janvier-Juin, à Paris, chez Thiboust. 8°. en RICHTERS *chirurg. Bibliothek.* V. Bd. 1e. St. S. 195. 8°.

Menigmaal is er slechts een zachtvoedende leefregel noodig. In andere gevallen verdient de, na het afvallen van den Polyp overblijvende, ontstekingskoorts, of de aanmerkelijke verzwakking door voorafgegane bloedvloeijing, de meeste opmerkzaamheid. In het eerste geval heeft de geneeswijze als bij de ontstekingskoorts plaats; in het tweede geval moet men de verminderde werkzaamheid der reproductie, door daartoe gepaste geneesmiddelen, benevens een doelmatig diët, opbeuren.

§. 829.

De methode, om de Polypen door het bijtmiddel of gloeiend ijzer te vernielen, is ook niet aan te raden. Het werkt te langzaam: de Polyp wordt slechts verkleind, maar nooit geheel vernield, en groeit ligtelijk weder aan, bijzonder, dewijl de steel, welke zich dikwijls zeer diep in de Baarmoeder geplaatst heeft, door de ontstane ettering zelden opgelost wordt. Intusfchen heeft toch de Schrijver in een geval, ruim twee jaren geleden, te Berlijn het bijtmiddel met een zeer goed gevolg aangewend. Hij had bij eene jonge Vrouw, die zelfs nog haar Hymen had, eenen Polyp der Baarmoeder gelukkig afgesneden, en naderhand, toen hij de volkomene fluiting van den moedermond verwachtte, voelde hij, dat deze zich niet floot, en steeds zoo ver geopend bleef, dat men den top van den vinger tot in den binnensten moedermond brengen kon. Tegen zijne verwachting voelde hij nog boven dezen twee kleine Polypen, den eenen zoo groot als eene hazelnoot, den anderen als

eene

eene erwt, dicht naast elkander. Deze verhinderden de geregelde contractie van den Uterus en bragten nog storingen in de maanstonen voort. Aan afbinding en afsnijding was hier, waar zich ook de opening van het door den eersten Polyp zeer verwijde Hymen te samengetrokken had, volstrekt niet te denken. De Schrijver bragt nu het eerst door de schacht van eene pen, waaraan hij een rond staafje vastmaakte, den helschen steen binnen, raakte daarmede dikwerf den Polyp aan, liet inspuitingen uit een aftreksel der cicuta met herb. salv. doen en had het genoeg te zien, dat ongeveer tien dagen daarna de kleine Polypen, geheel week en opgelost, zich afzonderden. De Baarmoeder floot zich volkomen, de dwarspleet werd gevormd en de maanstonen bekwamen eenen geregelden loop. Nog niet lang geleden — ruim anderhalf jaar na de Operatie — heeft de Schrijver de geöpereerde gezien, en zich over hare volkomene herstelling hartelijk verheugd.

§. 830.

Het affnijden der Polypen verdient veel meerdere aanprijzing, dan men tot nu toe gebruik daarvan maakte. Gewoonlijk bepaalt men het alleenlijk in de volgende gevallen: 1) wanneer de Polyp reeds vóór de uitwendige teeldeelen hangt, of zóó in de Scheede bevestigd is, dat men denzelven gemakkelijk met eene tang kan uittrekken, maar tevens ook de steel, welke aan de lippen van den moedermond, of aan den Baarmoederhals is vastgehecht, zeer dun is, en de Polyp zelfs te voren niet sterk

gebloed heeft; 2) wanneer de Polyp, nadat de afbinding heeft plaats gehad, eenige dagen vast genoeg is beklemd geworden; voorondersteld, dat, bij eene roereikende lengte van den Polyp, de afsnijding onder het afgebonden deel mogelijk zij; 3) wanneer de Polyp, wegens eenen zeer peesachtigen steel, na de afbinding zich niet loslaat; 4) wanneer de Polyp eene omstulping der Baarmoeder ten gevolge heeft, en met dezelve zeer gevaarlijke verschijnselen, welke spoedig moeten weggenomen worden, gepaard gaan. De spoedige afsnijding van den Polyp, en de kort daarop in het werk te stellen repositie van den omgestulpten baarmoedermond is des te noodzakelijker, wanneer deze bij het uitzakken van den Polyp plotselijk ontstaan is.

§. 831.

De Schrijver echter geeft niet alleen in de op §. 830 bijgebragte, maar in alle gevallen aan het afsnijden boven het afbinden de voorkeur, wanneer de Polyp eenen steel heeft, die bereikt kan worden, om het even of dezelve zich aan den bodem, aan het ligchaam, of aan den hals der Baarmoeder vastgehecht hebbe. De wezenlijke voordeelen zijn: de mindere pijn, welke de zieke door de Operatie ondergaat; de kortere tijd van derzelver voleinding; de onbeduidende, zeer dikwerf geheel ontbrekende toevallen, gedurende en na dezelve; het vermijden van den, na de afbinding ontstaan, stank der rotting en der uitvloeiing van eenen stinkenden etter, der storingen van den stoelgang en der pislozing; de verwijdering van angst en onrust der zieke

in

in dagen, wanneer zij anders het afbindingsinstrument bij zich moet dragen; de minder te vreezene omstulping der Baarmoeder (*); het ligter voorkomen van het afscheuren des Polyps; de meerdere zekerheid tegen het wederontstaan na eene volkomene uitsnijding; het spoedig verlaten van het bed, daar de toevallen meestal zeer onbeduidend zijn (†); het gemakkelijker onderzoek van de holte der

(*) De Schrijver behandelde eene Vrouw met eene volkomene omstulping der Baarmoeder, welke na de afbinding van den Polyp ontstond, en waarbij de omgestulpte bodem der Baarmoeder reeds zoo met den uitgezeten moedermond door adhaesive ontsteking vergroeid was, dat die niet weder terug konde gebragt worden. Even zoo sneed de Schrijver bij eene Vrouw eenen grooten Polyp uit den bodem der Baarmoeder, welke een of twee jaren te voren de afbinding ondergaan had. De Arts, die de Operatie verrigt had, was van gevoelen, dat er geen Polyp in den Uterus bestond. De bloedstoringen hielden met eene aanmerkelijke vermagering der zieke aan, de Schrijver werd geraadpleegd, en vond eenen grooten Polyp zeer duidelijk op den bodem der Baarmoeder, welken hij eenige dagen na het onderzoek gelukkig had afgesneden. De Vrouw bevond zich drie jaren daarna in den besten welstand.

(†) De Schrijver heeft bij eene Vrouw, die twaalf mijlen van Berlijn af woonde, eenen Polyp uitgesneden, en vier dagen na de Operatie vertrok zij weder. Nu onlangs verrigtte hij in het Verlossings-Instituut der Koninklijke Universiteit, in tegenwoordigheid zijner leerlingen, de Uitsnijding, met dat gelukkig gevolg, dat de geöpereerde, door eene oppaster vergezeld, daags na de Operatie naar huis keerde.

der Baarmoeder kort na de Operatie; de onbeduidende, meestal en bijzonder bij variceuse of aanvangelijke verharding der Baarmoeder, zelfs hoogst weldadige bloeding, om de ontsteking te verhoeden, de ziekelijke zwelling eerder weg te nemen, en de geregelde contractie der Baarmoeder te bevorderen; de uitvoering der Operatie, zonder de zieke te ontblooten, enz. De tegenkantingen der vijanden van het affnijden der Polypen of onervarene Nieuwelingen, die nimmer deze Operatie ondernomen of gelegenheid hadden, om dezelve met de afbinding naauwkeurig te vergelijken, kwamen den Schrijver toen volstrekt niet genoegzaam voor, om van denkbeelden te veranderen en het afbinden boven de affnijding te stellen, waar deze maar eenigzins mogelijk is; en in geval, wegens den breeden basis, waarmede een Polyp op den bodem of aan het ligchaam der Baarmoeder zit, het affnijden met de schaar niet mogelijk ware, dan zal de Schrijver de afbinding verkiezen, opdat door het beklemmen de steel gevormd worde, en alsdan den Polyp onder de afbinding affnijden, om de zieke vroeger van den angst, den last, den stank en andere toevallen te bevrijden. Het is niet te ontkennen, dat tot het affnijden der Polypen eene kleine en in het voelen zeer ge oefende hand behoort; die deze niet heeft, dien zal de Operatie in vele gevallen volstrekt niet gelukken. De Schrijver (*), dien het gelukt is eenen Polyp bij eene Vrouw met het nog aanwezige Hymen af te snijden, zonder hetzel-

(*) Zie §. 829.

zelve, offchoon zeer gespannen, te beschadigen, mogt de Uitsnijding met de fchaar eene zegepraal over de afbinding noemen; want deze was in dit geval volftrekt niet mogelijk, zonder het Hymen vooraf te vernielen, en zelfs dan zoude het inbrengen, bij voorbeeld van het instrument van BOUCHER of dat van RIBKE, zeer moeilijk geweest zijn.

§. 832.

Tot het affnijden der Polypen bedient zich de Schrijver van twee fcharen, die, van de vereeniging der beide bladen af tot aan derzelfver bovenfte ftompe einde gerond, van voren bijna als eene Sonde uitloopen, en naar de rigtingslijn van het bekken gekromd zijn. De eene heeft de lengte van negen en $\frac{3}{4}$ " en de andere die van tien en $\frac{1}{2}$ ", welke met eene fterke kromming voorzien is, om Polypen, die hooger op den bodem der Baarmoeder vastzitten, te kunnen affnijden. De bovenfte kromming der bladen komt met de tegenovergeftelde kromming van het handvatfel overeen, zoodat de fchaar bijna eene Latijnsche S vormt.

§. 833.

De Operatie zelve wordt door den Schrijver op de volgende wijze verrigt: 1) vooraf zorgt hij voor ontlasting van den endeldarm en der pisblaas, opdat noch de hand noch het instrument eenig beletfel in de Scheede vinde (*). 2) De zieke worde dwars in

(*) In een geval, waar de Schrijver eenen Polyp uitsneed, vond hij eene volkomene uitzakking der Scheede; dit verzwaarde wel, maar verhinderde het inbrengen van het instrument niet.

in het bed geplaatst. 3) Zoo de Polyp zich zeer hoog op den bodem der Baarmoeder vastgehecht heeft, dan brengt hij, wanneer het noodzakelijk en mogelijk is, de eene hand, meestal de linker, met olie en pomade bestreken, konisch gevormd, in zeer spirale bewegingen, door den ingang der Scheede, achter en onder den Polyp omhoog naar den steel; wanneer echter de Polyp aan het ligchaam of slechts aan den hals der Baarmoeder zit, of de steel ligtelijk kan bereikt worden, dan gebruikt de Schrijver slechts twee vingers als geleiders van het in te brengen instrument. Het afsnijden is het gemakkelijkste, wanneer eene omstulping der Baarmoeder daarmede gepaard gaat; als de steel moeilijk te bereiken is, dan moet men den Polyp vooraf door eenen helper allengskens eenigzins in de Scheede laten trekken, hetgeen de Schrijver eenmaal door middel van eenen haak bewerkstelligde.

4) Langs de vingers of de hand brengt de Schrijver nu de matig verwarmde en aan het boven sondevormig einde met olie bestrekeneschaar tot aan den steel van den Polyp, snijdt, dien tusschen den wijs- en middelsten vinger houdende, onder de vingers af, en brengt dien, klein zijnde, met dezen, dadelijk uit de Baarmoeder en de teeldeelen naar buiten; zoo dit niet mogelijk zij, dan bedient hij zich van eene kleine, naar die van LEVRET gelijkende Polyp tang, welker lepels gescheiden zijn, en even als zijne geboortetang door de draaibare as vereenigd kunnen worden. 5) De bloeding na de Operatie is ten minste bij de, door den Schrijver verrigte, Operatiën onbeduidend, en men haaste zich niet, de-

dezelve zonder dringende aanwijzing te stillen, daar dezelve, gelijk reeds gezegd is, weldadig werkt, de ontsteking verhoedt, de uitgezette en variceuse vaten bij de zwelling van den Uterus ontledigt en derzelve geregeld contractie bevordert. Mogt er eene aanmerkelijke bloeding ontstaan, dan bedient men zich van inspuiting uit wijnazijn met water in de Baarmoeder, en brenge eenen cylindervormigen, uit fijne spons gefneden' en in gemeld vocht gedoopten tampon, waaraan een snoer is vastgemaakt, door middel van een baleinen staafje er in, hetwelk men eenigzins sterk aandrukt, en er weder uitneemt, zoodra men geene bloeding meer te vreezen heeft. 6) Na de Operatie bevele men rust aan, eene horizontale ligging op zijde en behandel de zieke antiphlogistisch. Na eenige dagen laat men een afkookfel van cicuta en naderhand met wat kalk- of loodwater in de Baarmoeder spuiten. Als de stank van het ontlaste vocht opgehouden heeft, dan kieze men tot inspuitingen een adstringerend aftreksel in den beginne uit de flor. rosar. rubrarum met herba salviae, en vervolgens van cortex chinae, quercus, radix tormentillae — bistortae e. d. g., en handele gelijk bij §. 828 is aangewezen.

§. 834.

Nadeelige gevolgen, de wondkoorts en een zachte graad van Metritis uitgezonderd, zijn na het affnijden der Polypen niet te vreezen, en zelfs deze toevallen zijn zoo onbeduidend, dat die met de zoodanigen, welke de afbinding vergezellen, volstrekt niet kunnen vergeleken worden. Omstulping der Baarmoeder, nabloedingen en het wederontstaan van

eenen Polyp heeft de Schrijver nimmer waargenomen. Ook de Hofraad BENJAMIN OSIANDER snijdt de Polypen zonder onderscheid uit, en heeft zelfs elke andere methode laten varen. De manier en wijze, hoe hij daarbij te werk gaat, en van welke instrumenten hij zich bedient, is den Schrijver onbekend; ten gevolge zijner verklaring in de *Göttingfche gelehrten Anzeigen* wilde hij die ter zijner tijd mededeelen (*). Daar zich nu de Schrijver in alle gevallen overtuigd heeft, dat het uitsnijden van den Polyp, door eene voornamelijk in het betasten en opereren geoefende hand, altoos zonder gevaar geschieden kan, de zieke vroeger en zekerder, zonder wederkeering van het misgewas, genezen wordt, en mindere pijnen en toevallen, dan de afbinding, veroorzaakt, zoo gevoelt hij zich gerechtigd, de Uitsnijding boven de afbinding aan te bevelen, waar zulks maar eenigzins mogelijk is.

Over de Polypen in de Scheede.

§. 835.

Even als er in de Baarmoeder Polypen voorkomen kunnen, zoo vindt men ook foortgelijke misvormingen, die onmiddellijk in de Scheede ontstaan. Dierzelfer Diagnosis is niet moeilijk, daar men die zeer geschikt en vroeg genoeg met het gevoel ontdekken kan. — De toevallen, welke dezelve ver-

(*) Wij verwachten van den Zoon des beroemden Overledenen, hetgeen de Vader door zijnen dood verhinderd is geworden te leveren.

veroorzaken , zijn minder gevaarlijk , dan die der Baarmoederpolypen. Alleenlijk veroorzaken dezelve , in grootte toenemende , drukking op de pisblaas en den endeldarm ; van dáár storing in de verrigtingen der stoel- en pisontlastingen. — De oorzaken zijn dezelfde , als die der Baarmoederpolypen , bijzonder venerische besmetting , chankers en zweren in de scheede , ontsteking en verwonding derzelve , witte vloed en dergelijken. — De genezing vereischt , met eene behoorlijke opmerkzaamheid op de aanleidende oorzaak , de Uitsnijding , of de afbinding. In het laatste geval heeft men zeldzamer een instrument noodig , en de hand of de vinger alleen zijn voldoende , om den band aan te leggen.

1117

L I T T E R A T U U R.

§. 836.

POLYC. THEOPH. SCHACHER, *programma de polypis. Lips.*
1721. 4^o.

F. HOFFMANN, *de praecavenda polyporum generatione*
Hal. 1736. 4^o.

LEVRET, *Essais sur l'abus des règles générales et contre les préjugés, qui s'opposent au progrès de l'art des accouchemens. Par.* 1766. 8^o.

Dezelfde, *observations sur la cure radicale de plusieurs polypes de la matrice de la gorge et du nez. ib.* 1771. 8^o.

TANNER, *de polypo feliciter ex utero extirpato. Argent.*
1771. 4^o.

HERBINIAUX, *parallèle des instrumens pour la ligature des polypes dans la matrice. la Haye* 1771. (RICHTER'S chirurgische Bibliothek. II. B. S. 72.)

Dezelfde, *traité sur divers accouchemens laborieux et sur les polypes de la matrice. Brux.* 1782. 8^o.

BELLETESTE, *diss. sistens ligaturae polyporum uteri instituendae novam methodum anteponendam. Par. 1774. 4°.*

DU FRÈSNE, *ergo ligaturae polyporum uteri nova methodus anteponenda. ib. 1774. 4°.*

GOERZ, *novum ad ligaturam polyporum uteri instrumentum.*

Goett. 1783. 4°. (RICHTER'S chirurgische Bibliothek. B. VIII. p. 250; en deszelfs Beginfelen der Heelkunde. B. I. §. 625. Tab. II. Fig. 5, 6.)

A. G. RICHTER, *Beginfelen der Heelkunde. I. Deel, bl. 317. Amst. 1784. met pl. (bevat eene Afbeelding van den, door KECK verbeterden, Polypafbinder van LEVRET.)*

TRIEBEL, *de concrementis polyposis. Erlang. 1787. 4°.*

HASSELBERG, *commentatio chirurgica, in qua novum ad ligaturam polyporum instrumentum proponit. Gryph. 1788. 4°. Men vergelijke ook DESSAULT'S auserlesene chirurgische Wahrnehmungen. Frankf. 1799. VIII. Bd. p. 89. tab. fig. A. B. C.*

NISSEN, *de polypis uteri et vaginae, novoque ad eorum ligaturam instrumento. Goett. 1789. 4°. (Gött. Anz. 1790. p. 569.)*

ED. SANDIFORT, *de tumoribus utero annexis; in deszelfs obs. anat. path. Libr. I. Cap. 8.*

ZEITMANN, *de signis et curatione polyporum uteri. Jen. 1790. 4°.*

HEINZE, *de ortu et discrimine polyporum, praecipue polyporum uteri. ib. 1790. 4°. (neueste Sammlung für Wundärzte II. N°. 3. STARK'S Archiv. III. B. p. 338.)*

ROTHBART, *de polypis uteri. Erford 1795. 4°.*

KLUG, *historia instrumentorum ad polyporum extirpationem eorumque usus chirurgicus. Hal. 1797. 4°.*

J. VAN DER HAAR, *korte Beschrijving en Afbeelding van een Werktuig, waarmede men de vleeschuitwassen in de Baarmoeder, enz. afbinden kan; in deszelfs uitgezochte Gencees- en Heelkundige Mengelschriften. II. Deel. Afd. XV. bl. 82. Amst. 1797. met pl.*

- DESSAULT'S *chirurgische Nachlass*. III. B. p. 421.
 Dezelfde, *auserlesene chirurgische Wahrnehmungen*.
 VIII. B. Frankf. a. M. 1799. S. 84. m. e. K.
 ————— über die Organisation der Mutterpolypen
 und ihre Behandlung; in de *Abhandl. über die Krank-*
heiten der Harnwege. S. 421.
 CONTIGLI, *Raccolta di opusculi medico practici*. Vol. III.
 p. 139; in ESCHENBACH'S *vermischten medicinisch-chi-*
rurgischen Bemerkungen. 2e. Sammlung, Fig. 2, 4.
 F. A. WALTER, *von den Mutterpolypen*, in SCHWEICKHARD'S
Magazin für Geburtsh. H. 1. St. 2.
 SABATIER'S *Lehrbuch für prakt. Wundärzte*. I. Th. Berl.
 1797. S. 292.
 STARK'S *Archiv für die Geburtshülfe*. I. Bd. 2e. St. S. 151.
 Dezelfde, *von den Mutterpolypen*; in deszelfs *Archiv*
 I. Bd. 3e. St. S. 1—27.
 KLETT, *Aenderung des Davidischen Polypeninstruments*; in
 STARK'S *Archiv*. III. Bd. 3e. St.
 LÖFFLER'S *Beschreibung eines Polypenunterbinders*; in
 STARK'S *Archiv*. IV. Bd. 2e. St. S. 308.
 Dezelfde, *Verbesserung des Boucherischen Polypenin-*
struments; in HUFELAND'S *Journ. der prakt. Arzneyk*.
 XVI. Bd. 4e. St. S. 65.
 BELL'S *Lehrbegriff der Wundarzneyk*. VII. Th. 3e. Aufl.
 LODER'S *chirurgisch - medicinische Beobachtungen*. I. Bd.
 Taf. 2. (bevat eene Afbeelding van eenen door DAVID
 uitgevonden' Polypafbinder.)
 BERNSTEIN'S *Beschreibung eines neuen Instruments zur Un-*
terbindung der Mutterpolypen; in LODER'S *Journ. für*
die Chirurgie. II. Bd. 4e. St. (Alwaar men de Beschrij-
ving en Afbeelding van het Instrument van BOUCHER
vindt.)
 LE FAUCHEUX, *sur les tumeurs circonscrites et indol. du tissu-*
cellul. de la matrice et du vagin. Par. 1802. (Bevat eene
 Beschrijving van het Instrument van CULLERIER.)

- J. J. SEGARD, *sur les polypes utérins. Par. an XII. 4°.*
avec 3 planches.
- P. J. ROUX, *mémoire sur les polypes utérins. V. Mélanges*
de chirurgie et de physiologie. ib. 1809. 8°.
- P. NAUDIN, *sur les polypes utérins. ib. 1813. 4°.*
- SAUTER'S *einfache und leichte Methode zur Unterbindung*
der Gebärmutterpolypen; in B. VON SIEBOLD'S Chiron.
II. B. 2. St. S. 420.
- JÖRG, *von den Polypen des nicht schwangern Uterus; in*
deszelfs Handbuch der Krankheiten des Weibes, (mee-
eene door hem verbeterde Polypafbinder van NISSEN).
- ZANG, *Darstellung blutiger heilkund. Operationen. Wien*
1813. I. Th. S. 436. (Beschrijving der, door BICHAT ver-
eenvoudigde en door GOTTLOB SCHREGER verbeterde,
Methode van DESSAULT, benevens Afbeelding van het
Instrument).
- CLARKE, *on those diseas. of fem. which are attend by dis-*
charg. Lond. 1814. Tab. X. (Beschrijving en Afbeelding
van een verbeterd Afbindingsinstrument van LEVRET).
- TH. DUCAMPS, *sur les polypes de la matrice et du vagin.*
Par. 1815. 4°.
- HAUK, *über Gebärmutterpolypen; in RUST'S Magazin II. 2.*
S. 264. en III. 1. S. 153. 1817. (Beschrijving en Af-
beelding van den Polypafbinder van RIBKE).
- JOHN BURN'S *Grundsätze der Geburtshülfe. Stettin 1820.*
S. 123.



 DER DE HOOFDSTUK.

 OVER HET VLEESCH- EN SPEKGEZWEL (*Sarcoma*
et Steatoma) EN DE BEEN- EN STEENACHTIGE
 VERGROEIJINGEN DER BAARMOEDER.

I.

Over het Vleesch- en Spekgezwel der Baarmoeder.

§. 837.

De Baarmoeder, met eenen zeer hoogen graad van voortbrengingskracht bevoorregt, gaat somtijds tot masfa's over, die alle de eigenschappen van een Vleesch- of Spekgezwel bezitten. Eigenlijk is deze ziekelijke stofverwisseling in eene verdikking der zelfstandigheid met vermeerderden omvang van den Uterus gelegen, zonder verschijnselen van scirrheuse verharding, en verhoudt zich even als aan andere deelen en organen van het ligchaam.

§. 838.

Het Vleesch- of Spekgezwel der Baarmoeder ontstaan op de eene of andere plaats van den Uterus, aan den bodem, het ligchaam of den hals (*). Nu
 eens

(*) Zie LODER's *Journal für die Chirurgie, u. s. w.* III. Bd. 4e. St. S. 649. (*Steatomatöses Gewäch des Gebärmutterhalses, beobachtet durch Dr. MICHAËLIS.*)

eens beslaan dezelve de voorste, achterste, linker of regter omtrek, en worden bijzonder het Steatoma, onmiddellijk onder het buitenste vlies der Baarmoeder, hetwelk eene verlenging is van het buikvlies, gevormd; dan eens ontstaan dezelve in het tusschenweeffel, en dringen of naar buiten of in de holte der Baarmoeder door (*). — In zeldzame gevallen is het gansche ligchaam der Baarmoeder tot eene Sarcom- of Steatomaardige massa ontaard, gelijk de Schrijver meermalen heeft waargenomen.

§. 839.

De grootte der Vleesch- en Spekgezwellen, welke op sommige plaatsen der Baarmoeder ontstaan, is onderscheiden. Men vindt dezelve van de grootte van een duivenei, tot aan die, welke het hoofd van een volwasfen mensch overtreft, en kunnen eenige looden, maar ook vele ponden wegen (†).

Ken-

(*) De Schrijver heeft een Spekgezwel waargenomen, dat zich tusschen den voorsten wand der Baarmoeder en de pisblaas, waar beide organen door eene plooi van het buikvlies met elkander verbonden worden, geplaatst had. Men zie LUCINA I. Bd. 1e. Heft, §. 87. Ook bezit de Schrijver eene Baarmoeder, welke geheel aan den bodem een Spekgezwel had. Bij eene, aan de longtering gestorvene, zwangere Vrouw, bij welke hij terstond na haren dood de keizersnede verrigt heeft, vond hij vijf vleeschachtige uitwasfen aan den achtersten wand der Baarmoeder.

(†) Een Spekgezwel der Baarmoeder van eene verbazende grootte bevindt zich in de verzameling van het Anatomisch-Theater te Wurzburg. Van zulk een ge-

waagt

Kenteekenen.

§. 840.

Zoo lang het Vleesch- en Spekgezwel nog klein, en op eene onbereikbare plaats der Baarmoeder, bij voorbeeld aan den achtersten wand, gelegen zijn, dan is de Diagnosis moeilijk. Maar wanneer het gezwel grooter wordt, en zich in het bekkenhol, en boven hetzelfde in het groote bekken, vooral naar voren verspreidt, dan is de herkenning niet zoo moeilijk. Men gevoelt daar ter plaatse een onge-
 woon, meer of min ongelijk, somtijds hobbelig ge-
 zwel, hetwelk den drukkenden vinger meer of min
 weêrstand biedt; naar mate de zelfstandigheid vaster of
 weeker, meer Sarcomateus of Steatomateus is. Aan
 het scheededeel vindt men, wat zelfstandigheid,
 vorm, lengte en dikte betreft, geene ontaarding,
 wanneer deze gezwollen zich niet oorspronkelijk
 aan den hals der Baarmoeder gevormd of van der-
 zelve ligchaam zich daarheen verspreid hebben.
 In dit geval zijn alleenlijk de lippen van den moe-
 dermond omgekruld, hobbelig, meer of min ge-
 zwollen, maar zonder pijn; waardoor dit ziektever-
 schijnsel zich van den scirrhus en kanker onder-
 scheidt.

waagt ook SCHMIDTMÜLLER in zijn *Handbuch medicinischer Geburtshülfe*, Seite 38. Te Wurtzburg ontdekte de
 Schrijver zoodanig eene, bij eene Boerin, welke hem
 raadpleegde, en eerst voor zwanger gehouden werd.
 Dezelve besloeg het geheele bekkenhol, en stak ander-
 halve hand breed boven de schaambeensvereening uit.
 Eindelijk kwam er buikwaterzucht bij.

scheidt. Soms is maar ééne lip van den moedermond ontaard, terwijl de andere geheel niet misvormd is. Den moedermond vindt men meer of min geopend; en door deszelfs inwendige opening komen masfa's naar binnen, welke, door de inwendige zelfstandigheid der Baarmoeder, nabij derzelver hals, doorgedrongen waren, en op het gevoel zoo ongelijk, maar harder dan bloemkool zijn. Soms strekken deze zich in groote lappen tot beneden in de scheede uit, zijn met eene slijm-bloedrige of sereuse uitvloeijing vergezeld, en worden hier en daar bij stukken afgezonderd, welke het voorkomen van verteerde klompen vet, of als het zeer uitgeweekte weeffel eener lever van eene bleeke kleur hebben. Op de scheiding volgt gewoonlijk eene onbeduidende bloedvloeijing, waardoor deze afzondering zich van die carcinomateuse uitwasfen bij den kanker der Baarmoeder onderscheidt.

§. 841.

Als het Vleesch- of Spekgezwel aan den bodem of het ligchaam der Baarmoeder, en wel naar buiten, ontstaan is, en het gezwel bij deszelfs toenemenden wasdom ver boven het groote bekken rijst, dan vindt men het scheededeel slechts in deszelfs ligging veranderd. Meestendeels staat het zeer hoog, en dikwerf zoo dicht aan den ingang van het bekken, dat men het slechts met moeite voelt; of het wordt geheel naar éénen kant van het bekken, gewoonlijk onder de heilig- en heupbeensvereening, of naar het eironde gat heengedrongen, en maakt dan deszelfs onder-
zoek

zoek niet minder moeilijk. Zoo het Vleesch- of Spekgezwel zich tot beneden in het kleine bekken verspreid heeft, dan vindt men deszelfs holte met een vreemd ligchaam gevuld, hetwelk dikwijls geheel rond is, en zich even als een voorliggend en met het onderste deel diep in het bekkenhol geplaatste hoofd of stuit gevoelen laat. Het scheidendeel is dan meestal zeer moeilijk te vinden, en oneindig meer naar de eene of andere zijde van het bekken gedrongen, dan in het vorige geval, maar zonder de gewone veranderingen, welke men anders aan hetzelfde, bij een, wezenlijk zoo diep in het bekken voorliggend hoofd of stuit, in de zwangersheid pleegt waar te nemen.

§. 842.

Tot de genoemde kenteekenen behooren ook de storingen der maanstonen; voorondersteld, dat deze bij de zieke niet reeds vroeger weggebleven waren. In dit geval vloeijen dezelve nu eens te sterk, dan wederom te spaarzaam, met pijnen vergezeld of zijn geheel opgestopt. In den tusschentijd doet zich somtijds een witte vloed voor; de zieke klaagt over eene volheid en eene stompe pijn, gepaard met eene aanmerkelijke zwaarte in den onderbuik en het bekken; gewaarwordingen, welke zich tot beneden de teeldeelen uitstrekken, elke lichaamsbeweging moeilijk, en telkens lastiger maken, naar mate het gezwel in grootte en zwaarte toeneemt. Hierbij voegen zich storingen der pis- en stoelontlastingen, strangurie, dysurie, ischurie en aanhoudende hard-

lijvigheid (*). Het gezwel toenemende, lijden ook de verrigtingen der spijsvertering telkens meer en meer; pijnen in den rug en in het kruis, welke nu ook de lenden, de bilnaad, de voeten en het geheele onderlijf aantasten, nemen gestadig meer en meer toe; het vrije gebruik der onderste extremiteiten is gestremd; de zieken hebben eenen hinkenden gang, waarbij zij het bovenlijf meer naar voren of zijwaarts krommen; en eindelijk gaat er eene volkomene verlamming, met eene zuchtachtige zwelling der onderste extremiteiten, daarmede gepaard.

§. 843.

Zoo de zelfstandigheid der Baarmoeder geheel en al tot eene buitengewone massa ontaardt, dan kan men zoodanig eene zieke, ten tijde harer bevruchtigingsvatbaarheid, ligt voor zwanger houden. De verhouding der ongewone verschijnselen tot de te vooronderstellen invloeden, en tot den, bij de zwangersheid gewoonlijk plaatshebbenden Habitus van het geheele Vrouwelijke Organismus, de ongeregeldheid der maanstanden en het bijzondere der uitvloeiing, de harde en ongelijke zwelling der Baarmoeder boven de schaambeensvereeniging, gepaard met hardheid, dikte, zwelling en oneffenheid van het scheededeel, bijzonder aan de lippen van den moeder-

(*) In een door den Schrijver waargenomen geval had de zieke verscheidene weken geenen stoelgang gehad, en de endeldarm was zoo vernauwd en door het Spekgezwel plat gedrukt, dat men nauwelijks de pijp eener klisterspuit inbrengen kon.

dermond, of de niet aanwezige kenteekenen, welke men gewoonlijk in de zwangerheid aan het scheidendeel waarneemt, de stompe pijn in de Baarmoeder, welke door meerdere drukking toeneemt, het gemis eener gelijkmatige uitzetting der borsten, en de pijn in dezelve naar eene bepaalde rigting, moeten de *Diagnosis* bepalen. Later, en wanneer de kwaal eenen hooger en graad bereikt heeft, zal er niet ligt eene dwaling mogelijk zijn. Maar de *Diagnosis* is het moeilijkst, wanneer deze tegennatuurlijke en ziekelijke toestand tevens met zwangerheid gepaard gaat. De gewoonlijk reeds in de eerste maanden plaatshebbende abortus geeft meestal eerst de ware inlichting. Intusschen volgt niet altijd miskraam of abortus. De Schrijver nam bij twee Vrouwen, die aan den voorsten wand der Baarmoeder een Vleeschezwel hadden, waar, dat de kinderen telkens geheel voldragen waren, maar dat de ziekelijke zwelling in de zwangerheid eene ongewone grootte bereikte, welke na de verlossing weder verdween. In één geval was de geheele Baarmoeder bijna tot eene steatomateuse massa ontaard, de daarmede gepaard gaande zwangerheid, welke de Schrijver herkend had, hield men voor onmogelijk, doch de tijd bevestigde de *Diagnosis*, en het kind werd zelfs over den tijd gedragen.

Oorzaken.

§. 844.

Ontstekingsprikkels, of ziekelijk vermeerderde congestie van het bloed, waardoor uitstorting eener meer of min strembare en voor menigvuldige ver-

anderingen vatbare Lympe in of buiten de zelfstandigheid van den Uterus ontstaat, zijn de naaste oorzaken, welke even zoo ligt Vleesch- en Spekgezwellen in denzelven kunnen te weeg brengen, als tot scirrheuse verharding aanleiding geven. Zwan-gerheden, zware verlosfingen en kraambedden, buitensporigheden in den bijflaap, opgestopte witte vloed, storingen der maanftonden en kraamvloeden, venusziekte, verwondingen en beledigingen der Baarmoeder, te vast rijgen van den onderbuik, ruwe behandeling bij het halen der nageboorte, verzuimde ontstekingen der Baarmoeder en dergelijken, zijn voornamelijk de invloeden, welke bijzonder verdienen genoemd te worden. Voor het overige wordt men de oorzaak niet altijd stellig gewaar, voornamelijk wanneer de kwaal geheel plaatselijk is.

Voorzegging.

§. 845.

Als de Vleesch- of Spekgezwellen niet zeer groot zijn, van belang niet toenemen en de geheele substantie der Baarmoeder niet tot die gezwellen ontaard is, dan zijn de gevolgen niet altijd gevaarlijk. Zulke lijderefsen kunnen, zonder dat de algemeene welstand er door gestoord worde, lang voortleven en de kwaal met zich in het graf nemen. — De Vleesch- en Spekgezwellen, welke zich aan de buitenste oppervlakte der Baarmoeder vormen, zijn minder nadeelig, dan die, welke aan de binnenste vlakte of in het tus-schenweeffel derzelve ontstaan, en zich tot binnen

in de holte der Baarmoeder doordringen. — De-
 zelve verhinderen niet altijd de bevruchting, vooral
 wanneer die zich onder het buitenste vlies der Baar-
 moeder geplaatst hebben. Zelfs is de bevruchting
 ook dán nog mogelijk, wanneer de zelfstandigheid
 der Baarmoeder geheel en al tot eene sarcoma-
 teuse massa ontaard is, zoo als zulks door den
 Schrijver waargenomen is. In dit geval volgt echter
 gewoonlijk in de eerste maanden der zwangerheid
 reeds eene ontijdige verlossing of ontaarding van
 het ei in eenen mola; terwijl in het eerste geval
 de vrucht een' geruimen tijd in de Baarmoeder be-
 houden wordt, en de geboorte somtijds ook op den
 behoorlijken tijd plaats heeft, maar slechts met vele
 inspanning, of ook volstrekt niet door eigene werk-
 zaamheid der Natuur volbragt kan worden, vooral
 wanneer het Spekgezwel zich buiten de Baarmoeder
 bevindt, en de ruimte van het kleine bekken ver-
 naauwd, of wanneer er eene onregelmatige ligging
 van het kind gevormd wordt. — Deze gezwellen,
 zeer in omvang en grootte toenemende, hebben
 eenen belangrijken invloed op de reproductie van
 het ligchaam in het algemeen. Eindelijk komen er
 slepende koortsen, tering, en, volgens de waar-
 nemingen van den Schrijver, ook ligt buikwater-
 zucht bij, waarop dan de dood spoedig volgt. Deze
 is dikwerf zeer ellendig, wanneer de stoelgang en
 pislozing geheel opgestopt worden, en de hevigste
 pijnen, alsmede drekbrakingen er bij komen. — Het
 Vleeschgezwel zich over de gansche Baarmoeder
 verspreid hebbende, dan volgt de dood vroeger door
 herhaalde bloedstortingen, ettering en tering.

Geneeswijze.

§. 846.

Aanvankelijke Vleesch- en Spekgezwellen der Baarmoeder vereischen geheel de behandeling der scirrheuse verharding in het tijdperk, wanneer dezelve of als gevolgen van eenen ontstekingsprikkel of eener ziekelijk vermeerderde congestie, door uitstorting van stolbare Lymphe, zich het eerst begint te vormen, waarom hier naar §. 766—772 verwezen wordt. De genoemde periode is des te belangrijker, daar men eerst eene verdikking der zelfstandigheid van den Uterus met eenen vermeerderden omvang aan het een of ander gedeelte waarneemt, welke nog niet met zekerheid kan bepaald worden, of die tot de sarcomateuse, steatomateuse of tot de scirrheuse verharding zal overgaan. De Vleesch- en Spekgezwellen der Baarmoeder eenmaal volkomen ontwikkeld zijnde, worden wel herkend, maar hebben meestendeels reeds zulk eene grootte bereikt, dat dezelve door geene geneesmiddelen meer kunnen verdreven worden, bijzonder wanneer dezelve afzonderlijk, op zich zelve, en in geene, of zeer geringe betrekking tot het overige Organismus en de Baarmoeder zelve staan. Het kwik, de antimoniaalmiddelen, het vingerhoedskruid en de sabina zijn de éénigste middelen, waarvan eenig nut te wachten is. Het kwik is bijzonder dan nuttig, wanneer venusziekte de oorzaak der kwale is. De Schrijver heeft eenige malen, zonder de oplofende middelen, van het gebruik der laauwwarme zeepbaden en verzachten-

tende infpuitingen in de Baarmoeder de uitwerking gezien, dat door de hevigfte weeënaardige pijnen eene menigte dikke bruingele etter uit de Baarmoeder ontlast werd, waarop de ziekelijke zwelling der Baarmoeder ten minfte voor eenige jaren verdwenen is, en de zieken in dien tijd zich zeer wel bevonden; doch de kwaal keerde terug.

§. 847.

Het zekerfte middel ter genezing is de Uitsnijding, indien men er met het mes zonder gevaar bijkomen kan. Vleesch- en Spekgezwollen, die niet de geheele Baarmoeder beflaan, aan de voorfte vlakte, of aan de eene of andere zijde der Baarmoeder, en nabij het onderfte segment, of aan den hals der Baarmoeder ontstaan, en zich diep in het kleine bekken en beneden in de fcheede uitftrekken, zijn voornamelijk tot eene Operatie gefchikt, welke ook door den Hoogleeraar OSIANDER zeer gelukkig verrigt is. Hij handelt op dezelfde wijze, als bij de Operatie van den scirrhus en kanker der Baarmoeder, waarheen wij verwijzen. — Moeijelijker en meestal onmogelijk zal de Operatie zijn, wanneer het Spekgezwel zich niet alleen tot in het kleine, maar ook tot in het groote bekken en boven in de buikholte verfpreid heeft; dezelve is echter in lateren tijd door eenen Heelmeester met het gelukkigst gevolg verrigt geworden.

L I T T E R A T U U R.

§. 848.

ASTRUC, t. a. pl. III. Deel, bl. 225.

CHR. VATER, *casus sarcomatis e pudendo muliebri sectione sublati. Vitemb. 1728. 4°.*

TIMMERMAN, *de inflammatione Uteri cum subjuncta observatione uteri sarcomatis. Rinteln 1766.*

SLEVOGT, *progr. de utero per sarcoma ex corpore protracto, postmodum resecto. Jen. 1700.*

OSIANDER, t. a. pl.

SOUQUET, in *Journal de médecine. Tom. XXI. p. 526.*

MICHAËLIS, *medicinisch-practische Bibl. I. Buch, 2e. St. Anhang.*

BÖHMER, *observat. anat. rar. Fasc. II. p. 43.*

Des Schrijvers *Lucina. I. Bd. 1e. St. p. 93.*

THOMANN, *Annales Wurceb. II. p. 24.*

C. WENZEL, *Krankheiten des Uterus. S. 66.*

II.

*Over de Been- en Steenachtige Vergroeiingen
der Baarmoeder.*

§. 849.

Somtijds treft men in de Baarmoeder Been- en Steenachtige Vergroeiingen aan. Deze staan of met het inwendige vlies der Baarmoeder in het naauwste verband, of geheel op zich zelve in de holte derzelve. JÖRG houdt ze voor ontaardingen van eijeren, overblijffels der Vrucht en van den moederkoek, die in de Baarmoeder achterbleven, en bewijst zulks met eene, door hem gedane waarneming aan den

den Uterus van eene koe (*). — De *Diagnosis* is zeer moeilijk, en de *Vergroeiingen* kunnen, bij nog aanwezige kenteekenen der zwangerheid, en wanneer de binnenste moedermond niet genoegzaam geopend is, om den vinger er in te brengen, alleen met behulp eener Sonde ontdekt worden. — Wat de geneeswijze betreft, is het raadzaam, zoo lang er geene belangrijke floringen plaats hebben, en de *Vergroeiingen* niet, bij eene toereikende opening van den moedermond, gemakkelijk weggenomen kunnen worden, om volstrekt geene hulpmiddelen aan te wenden. De toestand echter met eene hevige bloedvloeijing gepaard gaande, kan dezelve eene spoedige uit den weg ruiming vereischen: voorondersteld, dat ook de moedermond den toegang tot het vergroeide gemakkelijk maakt. De spoedige uit den weg ruiming echter niet dringend gevorderd wordende, is het beter, de uitdrijving aan de eigene werkzaamheid der Natuur over te laten, de krachten der zieken op te beuren, en door doelmatige inwrijvingen en slovingen de uitwerping te bevorderen.

L I T-

(*) De Schrijver bezit eenen verbeenden Uterus in zijne verzameling, dien hij van eenen Arts uit Hesse ontving, en niet dan met veel moeite kon doorzagen. Even zoo behandelde hij te Berlijn vóór ruim twee jaren eene Vrouw, die eene geheel scirrheuse en verbeende Baarmoeder had; zelfs de pisbuis was bijna geheel verbeend, en deze zoowel als de blaas met steenachtige *Vergroeiingen* gevuld. Zij leed op den duur aan *incontinentia urinae*, en stierf in de hevigste stuip-trekkingen.

L I T T E R A T U R.

§. 850.

HIPPOCRATES, *Libr. V. de morbis popularibus.*BÖHMER, *observ. anat. rar. Fasc. II.**Über die Steine in der Gebärmutter*, in CAMPER'S *vermischten Schriften* N^o 6. I.FRANK, *de cur. hom. morb. Libr. V. p. 77.*LETTSOM, in *Sammlung auserles. Abhandl. für pract. Aerzte.* XIX. Bd. p. 507.ODIER, in HARLES EN RITTER *N. Journal des ausländ. med. chir. Literatur.* VII. Bd. 2e. St. S. 116.CHAMBON DE MONTAUX, *med. pract. Abhandlung von den Krankheiten der Frauen.* II. Bd. S. 238.C. B. HEBENSTREIT, *progr. de uteri concretione morbosa.* Lips. 1801. 4^o.*Beobachtungen eines verknöcherten Uterus vom Prof. SCHALLGRUBER zu Graez in Steuermark bei einer Nonne von 68 Jahren; in de Altenb. medic. Annalen.* Augustus 1814.RAPUINEKS *Nachrichten einer Obductions-geschichte, einen sehr grossen Gebärmutterstein betreffend*, in deszels *med. chir. Beobachtungen über die einfache Methode des Seitenblasensteinschnitts*, mit 4 pl. Berl. 1815. 8^o. bl. 104.G. F. KUMMER, *de uteri Steatome ac degeneratione Steatomatosa annotationes quaedam, adjuncta descriptione insignis Utero adhaerentis Steatomatis*, acced. Tab. III. aen. 4. maj. Lips. 1819.

VIERDE HOOFDSTUK.

*Over de Voor- en Achterwaartsbuiging
der Baarmoeder.*

§. 851.

Wanneer de middelpuntige as der Baarmoeder van de rigtingslijn van het bekken zoodanig afwijkt, dat derzelver boven einde — de bodem — naar voren, tegen de schaambeensvereëning gebogen is, dan noemt men deze tegennatuurlijke ligging Voorwaartsbuiging (*versio uteri antrosum, antroversio*). Zoo echter de bodem achterwaarts naar het heiligbeen afhelt, dan is het eene Achterwaartsbuiging (*versio uteri retrorsum, retroversio*).

*Kenteekenen van de Voorwaartsbuiging
der Baarmoeder.*

§. 852.

De zieke heeft gewoonlijk eenen bestendigen aan-
drang tot pislozing, gevoelt pijnen op het aanraken
van den onderbuik boven de schaambeenderen, en
wordt, als zij gaat, een hard ligchaam op de blaas
vallende gewaar, hetwelk haar noodzaakt te wate-
ren, en dat telkens, als zij op den rug ligt, weder
omvalt. Soms gaen aanbeijen, hevige pijnen in
den onderbuik en in de liezen daarmede gepaard,
welke het gaan moeilijk maken. Bij het onderflaan

vindt men den bodem der Baarmoeder vóór aan de schaambeenderen op den bodem der pisblaas den moedermond achter aan het heiligbeen, op het middelste deel van den endeldarm, somwijlen zoo hoog, dat men dien naauwelijks met den vinger bereiken kan (*). Soms is het scheidedeel gekromd, en de Baarmoeder heeft de gedaante eener Retort. Gewoonlijk is zij dan zeer gezwollen, en de moedermond geheel rond, zacht en week.

Oorzaken en Gevolgen.

§. 853.

Tot de Vooroverbuiging der Baarmoeder geeft het kraambed de meeste aanleiding, wanneer Kraamvrouwen bijzonder met eene te sterke helling van het bekken te vroeg het bed verlaten. Aanhoudende hardlijvigheid, beenuitwasfen aan de eene of andere heilig- of heupbeensvereëning, vleesch- en spekgezwollen aan den voorsten wand der Baarmoeder, kunnen daartoe ook zeer gemakkelijk aanleiding geven. — De gevolgen zijn: hinderling in de bevruchting en de afscheiding der pis, vergroeiing van het scheidedeel met den endeldarm, aanbeijen, verettering van den endeldarm en der scheede, alsmede verhardingen der Baarmoeder.

Ge-

(*) In verscheidene door den Schrijver waargenomene gevallen was de Vooroverbuiging der Baarmoeder een hinderpaal voor de bevruchting. In een ander geval, waarin hij geraadpleegd werd, was het scheidedeel tegelijk met den endeldarm zamengegroeid, en de moedermond door dezen voelbaar.

Geneeswijze.

§. 854.

De geneeswijze bestaat in de herstelling der regelmatische ligging van de Baarmoeder. Deze is gemakkelijk, wanneer het scheededeel niet met dat gedeelte der scheede vergroeid is, hetwelk tegen den endeldarm aanligt. Men laat de zieke op den rug liggen, met een zeer verhoogd kruis, legt de hand boven de schaambeenderen, en drukt de Baarmoeder voorzigtig terug. Indien men bij het daaromtrent in het werk gesteld onderzoek bevindt, dat de moedermond overeenstemt met de rigtingslijn van het bekken, dan is de regelmatische ligging der Baarmoeder hersteld. Men beveelt nu de strengste rust aan, en eene gedurende verscheidene dagen horizontale ligging op den rug; brengt eene spons er in, welke bijzonder op die plaats van het bekken omhoog moet gebragt worden, waartegen de moedermond leunde, laat een' band digt boven de schaambeenderen om het lijf leggen; en wanneer deze middelen niet toereikend zijn, eenigen tijd een ringvormig moedersteunfel of eene spons dragen, om het scheededeel met het onderste segment der Baarmoeder te bevestigen. Wanneer echter het scheededeel met de scheede vergroeid is, dan moet de vergroeiing eerst met het mes gescheiden, en langen tijd eene spons gedragen worden, om eene nieuwe vergroeiing te voorkomen. Niet zelden wordt de repositie ook, door de ten gevolge der variceuse uitzetting der vaten, en van den beletten omloop des bloeds te weeg gebragte vergrooting

van den omtrek der Baarmoeder moeilijk of volstrekt onmogelijk gemaakt. In dit geval worden vooreerst bloedzuigers in den omtrek van het kruis, in de liezen en boven de schaambeenderen, alsmede oplosfende en zachte ontlastmiddelen aangeprezen, ten einde daardoor bloed te ontlasten, de vermeerderde ophooping en de ziekelijke zwelling der Baarmoeder te verminderen.

Over de Achterwaartsbuiging der Baarmoeder.

§. 855.

De Achterwaartsbuiging der Baarmoeder kan, buiten de zwangerheid, ontstaan: door de gewoonte om het water lang op te houden; spoedige voorafgegane geboorten, voornamelijk bij een te wijd bekken; aanhoudenden aandrang tot stoelgang; vergroo-ting van den omtrek der Baarmoeder, bijzonder door variceuse zwelling der vaten; verhardingen; vleesch- of spekgezwollen aan den achtersten wand van den Uterus; het te vroeg verlaten van het kraam-bed, te spoedig gaan en staan, sterke ligchamelijke inspanningen, het tillen van zware lasten en te vroegen bijslaap na hetzelfde, enz. Reeds verschei-dene malen heeft de Schrijver dezelve aangetroffen bij Vrouwen, die dikwijls miskramen gehad hadden, waaruit voortvloeide, dat de Achterwaartsbuiging der Baarmoeder het eerst in de zwangerheid ontstaan, en de telkens miskende oorzaak der ontijdige ver-losfing geweest was; hierom is het van zoo veel belang, hetgeen de Schrijver reeds dikwijls elders heeft gezegd, dat iedere Vrouw zes weken na hare verlosfing, en vroeger als zij wederom den bijslaap uit-

uitoefent, zich moest laten onderzoeken, om vooraf de regelmatigte ligging van den Uterus door doelmatige middelen weder te herstellen. Ten aanzien der Diagnosis en hulp verwijst de Schrijver op hetgeen hij in zijn Leerboek der beschouwende en werkda-dige Verlöskunde heeft voorgedragen: alleen merkt hij aan, dat, buiten de zwangerheid, de Achterwaarts-buiging der Baarmoeder de hevigste ongemakken der aanbeijen te weeg brengt, die zeer gemakkelijk miskend worden, en voor geen ander middel, dan door de herstelling van de regelmatigte ligging der Baarmoeder, wijken. Indien de poging tot de repositie der Baarmoeder met de toppen der vingers niet mogt gelukken, dan prijst OSIANDER eene hem eigene wijze van opereren aan, volgens welke hij zijn uitzettings-werktuig van boven naar beneden tot op den bodem van den achteroverliggenden bodem inbrengt, en het instrument eenmaal omdraait. VOGEL heeft in een geval van den hevel gebruik gemaakt (*). Ook W. M. RICHTER bedient zich van een' repositiehevel, dien hij *hysteromochlion* noemt. Om echter de Baarmoeder in derzelver regelmatigte ligging te behouden, zoo late men insgelijks eene cylindervormig gesneden spons, met zacht linnen overtrokken, dragen, die men, met zuivere olie of pomade bestreken, diep naar boven, langs den endeldarm en 'het promontorium van het heiligbeen, met behulp van eene balein, brengt. Daarbij moet men verscheidene dagen

(*) *Salzburger medicinische Zeitung*. 1791. I, p. 20.

(†) W. M. RICHTER *Synopsis prax. medico-obstetriciae etc. Mosquae* 1810. 4^o. pag. 69.

gen rust in het bed of op eene Sopha op den buik, of, wanneer het de lijdereſ niet uithouden kan, op de eene of de andere zijde aanraden, en haar tevens aanbevelen het water niet te lang op te houden.

L I T T E R A T U U R.

§. 856.

CUYPER, *de retroversione uteri gravidi*. Lugd. Bat. 1777. 4^o.

WLTZCZECK, *de utero reflexo morbo gravidis perniciosissimo*. Prag. 1777. 4^o.

WALL, *de uteri gravidi retroversione*. Hal. 1782. 4^o.

BAUMGARTNER, *de utero retroverso*. Argent. 1785. 4^o.

W. COCKWELL, *essay on the retroversion of the uterus*. Lond. 1785. 8^o.

JAHN, *de utero retroverso*. Jen. 1787.

GRUNER, *de utero retroverso*. ib. 1787.

GILL, *de ista herniae uterinae specie, quae retroversio uteri vulgo dicitur*. Edinh. 1787. 8^o.

DETHARDING, in STARK'S *Archiv*. IV. Bd. p. 270.

BOER, *Abhandlungen geburtshülfflichen Inhalts*. II. Bd. 4e. Th.

FIELIZ, in RICHTER'S *chirurgischer Bibliothek*. IX. Bd. p. 182.

JAHN, *de utero retroverso*. Jenae 1787.

MELITSCH, *Abhandlung von der sogenannten Umbeugung der Gebärmutter*. Prag 1790.

OSIANDER, in deszelfs *Lehrbuch der Entbindungskunst*, en in de Göttingischen gelehrten *Anzeigen*. Jahrgang 1808, 130 St. S. 1295.

Des Schrijvers *Lehrbuch der Entbindungskunde*. I. Theil, 3. Auflage, §. 486—§. 487. II. Theil, 3e. Auflage, §. 279—§. 295.

Dr. BRÜNNINGHAUSEN, *von der Zurückbeugung der Gebärmutter im ungeschwängerten Zustande* in des Schrijvers *Journal für Geburtshülfe u. s. w.* III. Bd. I. St. S. 59—68. Frankfurt a. M. 1819. 8^o.

VIJFDE HOOFDSTUK.

Over de Uitzakking der Baarmoeder.

§. 857.

De Baarmoeder is buiten de zwangerheid zoo in het bekken gelegen, dat die met derzelve scheede-deel gewoonlijk in de middelste opening van het bekken gevoeld wordt. Alleenlijk ten tijde der maanstonen wordt dezelve iets dieper in het bekken waargenomen. Zoodra zij nu hare regelmatige ligging verlaat, en dieper in het bekkenhol, of buiten hetzelfde zakt, dan ontstaat er eene Uitzakking der Baarmoeder.

§. 858.

Indien de Baarmoeder slechts zoo ver gezakt is, dat zij zich nog in de scheede bevindt, en de moedermond dadelijk achter den ingang in de scheede gevoeld wordt, dan is de Uitzakking onvolkomen. Maar wanneer de Baarmoeder buiten de scheede gekomen en vóór de uitwendige teeldeelen zichtbaar is, dan wordt de Uitzakking volkomen genoemd.

Kenteekenen.

§. 859.

Bij de onvolkomene Uitzakking der Baarmoeder voelt men aan het onderste deel der scheede een vooruitstekend gezwel, in de gedaante eener omge-

keerde peer. Aan het uiterste einde derzelve onderscheidt men den moedermond, die eene dwarsche, meer of min geslotene opening vormt. Men kan den vinger volkomen rondom het grondvlak van het gezwel brengen, dewijl het nergens tegen aan staat. De onderzoeking moet echter staande, en niet des morgens, kort na het opstaan, geschieden, omdat de Baarmoeder in beide gevallen, om redenen, die men gemakkelijk kan beseffen, teruggetreden kan zijn. De onvolkomene Uitzakking der Baarmoeder kan men voor een' moederpolyp houden. De onderscheidingsteekenen zijn §. 809 opgegeven geworden.

§. 860.

De volkomene Uitzakking der Baarmoeder is veel gemakkelijker te herkennen. Men voelt een veel grooter gezwel buiten de scheede, tusfchen de fchaamlippen; de spleet der moedermond fteekt veel meer vooruit; de fcheede is dan doorgaans ook omgekeerd, en heeft, wanneer de Uitzakking verouderd is, de kleur der buitenfte huid aangenomen, en de gevolgen en ongemakken doen zich in een' hooger grad voor. Zeer fpoedig echter keert de fteeds dieper naar beneden gaande fcheede zich om, en bedekt de gansche buitenfte oppervlakte der Baarmoeder. Men ziet alsdan niets van den moedermond, maar de Baarmoeder tusfchen en vóór de teeldeelen, zonder merkbare tusfchenruimte, in welke men een' vinger of eene Sonde brengen kan.

Gevolgen.

§. 861.

De gevolgen van de Uitzakking der Baarmoeder worden daarnaar bepaald, of dezelve volkomen of onvolkomen is.

§. 862.

De onvolkomene Uitzakking wordt door vele storingen vergezeld, welke ten deele door de drukking der uitgezakte Baarmoeder op de naast aan liggende organen, bijzonder op de pisblaas en den endeldarm, ten deele door de spanning en uitzetting dier deelen veroorzaakt worden, welke met de uitgezakte Baarmoeder in het naauwste verband staan. In het eerste geval ontstaan er storingen in de verrigtingen der stoel- en pisontlasting, verstopping, Ischurie, Dysurie en Strangurie, zoodat menig eene slechts dan haar water ongehinderd loost, wanneer men, de Vrouw op den rug liggende, de Baarmoeder met den vinger in de hoogte drukt. In het tweede geval klagen de zieken over een pijnlijk trekken en spanning in de lenden, kruis- en schaamstreek met een' aandrang naar de teeldeelen gepaard. Deze ongemakken worden in het begin, dat er eene Uitzakking der Baarmoeder plaats heeft, in een' hooger en graad waargenomen. In het vervolg nemen die ongemakken, als de, aan de Baarmoeder het naast liggende, deelen zich van tijd tot tijd aan de uitzetting en onregelmatige ligging gewennen, allengskens af. Somwijlen, doch later, komt de witte vloed er bij, waarvan de oorzaak ligt miskend wordt.

§. 863.

§. 863.

De Uitzakking, plotselijk ontstaande, voornamelijk als een gevolg eener zeer geweldig werkende oorzaak en bij een prikkelbaar volbloedig gestel, veroorzaakt ligt flauwten, ijlhoofdigheid, de hevigste pijnen, bloedvloeijingen, beklemming, koorts, ontsteking, ettering en koudvuur.

§. 864.

De onvolkomene Uitzakking der Baarmoeder in eene volkomene overgaande, vermindert wel de, op §. 862 bijgebragte, gevolgen van drukking der Baarmoeder; terwijl die der onregelmatige uitzetting en verplaatsing der aangrenzende deelen in een' hoogen graad vermeerderd worden: de pisblaas wordt achterwaarts gebogen, en de endeldarm zoodanig uit deszelfs ligging gedrongen, dat niet alleen de stoelgang, maar ook het aanwenden der klisterspuit bezwaarlijk wordt gemaakt. Buitendien zullen, vooral wanneer de volkomene Uitzakking plotselijk is veroorzaakt geworden, de op §. 863 gemelde toevallen ontstaan. Nogtans kunnen de deelen zich allengskens aan de ongeregelde uitzetting en ligging even zoo zeer, als bij de onvolkomene Uitzakking gewennen. Alleenlijk is de volkomene uitgezakte Baarmoeder veel meer aan variceuse zwellingen der vaten, als een gevolg van den verhinderden omloop des bloeds, aan ontvellingen, ongeregelde verdikking van het scheiddevlies en scirrheuse verharding, blootgesteld. — De Uitzakking der Baarmoeder heeft ook een' wezenlijken invloed op de be-

bevruchting. Door eene onvolkomene Uitzakking wordt die wel moeilijk gemaakt, maar niet altijd verhinderd. Dan, bij de volkomene is die onmogelijk, ten zij de Baarmoeder teruggebragt en lang genoeg in het bekkenhol teruggehouden worde.

Oorzaken.

§. 865.

Sommige Vrouwen zijn tot Uitzakking der Baarmoeder meerder geneigd, dan andere. Verminderde zamenhang der teeldeelen, voornamelijk in de banden, vliezen en celwijsweeffel, welke de Baarmoeder in het bekken met de aangrenzende deelen verbinden; een te wijd en te weinig hellend bekken, dikwijls plaats hebbende bloedvloeijingen der Baarmoeder, magerheid van het ligchaam in het algemeen, menigvuldige bijslaap, herhaalde zwangerheid en baren, geven inzonderheid aanleiding tot Uitzakking der Baarmoeder. En deze ontstaat des te eerder, naar mate hevige schokken en sterke inspanningen van het ligchaam, bij voorbeeld als gevolgen van een' val, hoesten, braken, tillen van zware lasten, persing bij den stoelgang, eener moeilijke verlossing, eener drukking op den onderbuik, bijzonder door naauwe kleederen veroorzaakt, daarop werken. Het gemakkelijkst nogtans worden Uitzakkingen der Baarmoeder daardoor te weeg gebragt, wanneer Kraamvrouwen het bed te vroeg verlaten, en zich dadelijk aan zwaren arbeid overgeven. In sommige Landstreken neemt men de Uitzakkingen der Baarmoeder menigvuldiger waar, dan in andere. Dat dezelve

zoo menigmaal plaats heeft, is zeer dikwijls het bewijs van eene slechte uitoefening der verloskunst, van het misbruik der kraamstoelen, of het gevolg van zekeren zwaren arbeid, waaraan het Vrouwelijk geslacht zich reeds zeer vroeg overgeeft. Uit dezen hoofde komen Uitzakkingen der Baarmoeder menigvuldiger voor bij de bewoonsters van bergachtige streken, die zich inzonderheid met den moeilijken wijnbouw bezig houden. — Of volkomene Uitzakkingen der Baarmoeder bij Meisjes ontstaan kunnen, die nog een ongeschonden Hymen bezitten, daarvoor heeft de Schrijver reden om te twijfelen. Die, welke hij bij haar waarnam, waren slechts onvolkomen gevormd. Maar door de ontdekking is het bevestigd, dat eene Uitzakking der Baarmoeder bij Vrouwen, zonder te voren eenen aanleg gehad te hebben, plotselijk ontstaan kan, wanneer eene uitwendige oorzaak, bij voorbeeld een sprong of val, zeer hevig en plotselijk werkt.

Voorzegging.

§. 866.

Eene Uitzakking der Baarmoeder, die van tijd tot tijd ontstaan is, en waaraan eene Vrouw zich reeds gewend heeft, is wel niet gevaarlijk, maar steeds een groot ongemak; doch de onvolkomene is zulks minder, inzonderheid wanneer alle verwijderde, schadelijke invloeden, welke dezelve vermeederen of tot andere toevallen gelegenheid geven, vermijd worden. Beklemming, braken, flauwten, bloedvloeijingen, koorts, ontsteking, variceuse zwelling, koudvuur en scirrhus maken dezelve meer of min gevaarlijk.

Ge-

Genceeswijze.

§. 867.

De aanwijzingen zijn: 1) de uitgezakte Baarmoeder terug te brengen; 2) een bruikbaar middel aan te wenden, om de teruggebragte Baarmoeder in derzelve ligging te behouden; 3) zoo veel mogelijk de aanleidende oorzaken, die de Uitzakking mogten begunstigen, te verwijderen.

§. 868.

Vóórdat men de uitgezakte Baarmoeder tracht terug te brengen, moet men vooral letten, of geene ontsteking, pijn, zwelling en kramp de terugbrenging hinderen. Indien deze door ontsteking en zwelling onmogelijk is, dan handele men antiphlogistisch. Men bevele, ingeval het noodig is, algemeene aderlatingen, en bij variceuse zwelling, bloedzuigers, die men onmiddellijk aan de uitgezakte Baarmoeder zet, schrijve salpeter voor, en tot stovingen der Baarmoeder een aftreksel van weekmakende kruiden, dat men, bij het afnemen der pijnen en zwelling, met Goulard's loodwater vermengt. Wordt de repositie door krampachtige te zamentrekkingen der scheede, en inzonderheid van de fluiters der scheede, moeilijk gemaakt, dan schrijft men inwendige krampstillende middelen voor, bij voorbeeld spiritus nitri dulcis met opiumstinctuur, en laat matig warme omslagen uit een aftreksel van kamillen, van den scheerling en het bilzenkruid maken. Dikwerf echter kan de Uitzakking

king hierom niet teruggebragt worden, omdat men de aanleidende oorzaak niet dadelijk verwijderen kan, bij voorbeeld een' buikloop of eene diarrhé.

§. 869.

Eene onvolkomene Uitzakking wordt zeer gemakkelijk teruggebragt. Zeer dikwijls is er slechts een zacht drukken met den vinger toe noodig. Somwijlen wordt de geregelde ligging der Baarmoeder dadelijk, als men de lijderes op den rug, voornamelijk met een verhoogd kruis, laat liggen, weder hersteld.

§. 870.

Meer zwaarigheid heeft de terugbrenging der volkomene Uitzakking; en men heeft daarbij doorgaans de volgende voorschriften en regelen in acht te nemen: 1) moet men met de repositie, wanneer men maar eenigzins eene bijzondere zwaarigheid te gemoet ziet, des morgens beginnen, wanneer de zieke nog te bed ligt; 2) om de Operatie gemakkelijk te maken, trachte men de pisblaas en den endeldarm te ledigen. In het eerste geval moet de catheter meer in eene horizontale rigting achterwaarts naar den endeldarm ingebragt worden, inzonderheid wanneer er eene pisopstopping volgt; 3) men laat de lijderes in eene horizontale rigting op den rug, met een zeer verhoogd kruis, in het bed liggen, en vat nu het uitgezakte gezwel, nadat het gezuiverd en met olie bestreken is, en brengt het zorgvuldig en behoedzaam, onder spiraalswijze bewegingen, naar de rigtingslijn van het bekken in de

de fcheede, tot aan die plaats, welke zij gewoonlijk bij de regelmatige ligging poogt in te nemen.

§. 871.

Als men de Uitzakking teruggebragt heeft, moet men daarop letten, of de zieke zich verligt gevoelt, dan of zich benaauwdheden, pijnen in den onderbuik en andere ongemakken voordoen. Zoo deze in een' hoogen graad toenemen, dan is de repositie gevaarlijk: de zieke moet de Uitzakking behouden en dezelve door een' fhortband ondersteunen. Indien de Baarmoeder echter, na de terugbrenging, in de ligging blijft, zonder de genoemde ongemakken te veroorzaken, dan laat men de zieke verscheidene dagen eene rustige horizontale ligging in het bed in acht nemen, brengt eene spons er in, die in een zamentrekkend afkookfel, bij voorbeeld der *herba salviae*, *flor. ros. rubr.*, van den kina- of wilgenbast, met aluin of witte vitriool natgemaakt is, laat van hetzelfde afkookfel inspuitingen in de Baarmoeder doen, alsmede inwendige versterkende geneesmiddelen toedienen. Deze behandeling is bij eene niet verouderde Uitzakking der Baarmoeder fomtijds toereikend, om dezelve weg te nemen, en te verhoeden, dat dezelve niet weder plaats hebbe, inzonderheid wanneer de zieke in het vervolg al te hevige inspanningen en bewegingen, te sterke drukking op den onderbuik, voornamelijk door nauwe kleederen, te menigvuldigen bijslaap en te dikwijls op elkander volgende zwangerheid, vermijdt, de urine nimmer te lang ophoudt, en, door het gebruiken van ligt verteerbare spijsen, steeds voor

een' gemakkelijken stoelgang zorgt. Zoo de Baarmoeder, als de zieke overeind staat, den adem inhoudt en hoest, niet zakt, dan kan men het daarvoor houden, dat die bestendig in de regelmatige ligging zal blijven.

§. 872.

Niet altijd is de genoemde methode toereikend, om de Uitzakking weg te nemen, maar er wordt een mechanisch werkend middel vereischt, om de teruggebragte Baarmoeder in derzelver ligging te behouden; de Uitzakking is dan meestal reeds zeer verouderd, of eene oorzaak voorhanden, welke niet weggenomen kan worden. Daartoe dient het voortdurend gebruik der spons of een moederring.

§. 873.

Eene ingebragte spons is het beste en zachtste middel, dat zoo dikwijls de plaats van eenen moederring vervangt: en wanneer die de Uitzakking maar eenigzins tegenhoudt, moest men van moederringen volstrekt geen gebruik maken; want zelfs de beste veroorzaakt eenige drukking en pijn. De Schrijver bedient zich daarom volstrekt niet meer van moederringen, en brengt gewoonlijk eene spons er in, die de gedaante van eenen afgeknotten kegel of cylinder heeft, en de dikte neemt naar de wijfde van het bekken en der scheede. Aan dezelve wordt van onderen een bandje vastgemaakt, om die te kunnen uitnemen en reinigen, inzonderheid ten tijde der maanstonen. Wanneer het inbrengen der spons zwarigheden heeft, dan bedient de

de Schrijver zich van eene ronde balein, nadat hij aan de punt derzelve vooraf eene opening maakt heeft, waarin hij het andere einde brengt, dat de gedaante van eene Sonde heeft. Een vinger der linkerhand dient gewoonlijk als geleider, waarop de spons, met een weinig olie of pomade bestreken, naar binnen gebragt wordt. De spons met zijn gebruikt linnen overtrokken, kan men het inbrengen en dragen nog gemakkelijker maken, en om voor te komen, dat die er niet uitvalt, moet men aan dezelve de rigting der dwarsche doormeting van het bekken geven, hetwelk door eene drukking van den wijsvinger tegen het onderste einde geschiedt, zoodra men de balein er uitgetrokken heeft. De spons kan tevens in een adstringerend afkooksel gedoopt worden; en daardoor bereikt men het oogmerk, om de Uitzakking somtijds nog na langen tijd volkomen radicaal te genezen, en het dragen der spons geheel overtollig te maken. Ingeval de spons de Uitzakking niet tegenhoudt, maar deze zich bijzonder in het staan of gaan vertoont, kan men zijn doel bereiken, wanneer men de spons te voren geheel met eenen draad omwindt, niet sterk toetrekt, en eenige dagen, tot men ze gebruikt, laat liggen. Daarna neemt men den draad weg, en brengt de zamengedrukte spons voorzigtig in de scheede. De spons zwelt dan zeer spoedig, en houdt de Uitzakking des te zekerder tegen. Wanneer dit middel niet helpt, dan moet men tevens een compres en een T-verband dragen laten. In plaats eener spons, kan men somtijds ook eene blaas gebruiken, die echter gemakkelijker naar voren dringt,

en de aanwending van geneesmiddelen ter zelfder tijd niet toelaat. Veel nuttiger zijn de door OSIANDER aangeprezene kruidezakjes, inzonderheid wanneer zij eenigen tijd te voren in rooden wijn gelegen hebben.

§. 874.

Bijaldien bij veroudërde Uitzakkingen, zeer wijde bekkens, derhalve bij Vrouwen, die de kuur met de spons, ten gevolge harer omstandigheden, niet afwachten kunnen, of bij eene bestaande oorzaak, welke de Baarmoeder steeds naar de laagte drukt, de spons niet toereikend is, dan moet men tot moederringen zijne toevlugt nemen.

§. 875.

De moederringen zijn uit zeer verschillende stof vervaardigd. Men heeft er van goud, zilver, hout, kurk, was, gips, elastieke gom, zijde, enz. Zij zijn even zoo verschillend van gedaante en met of zonder steel voorzien. De eersten hebben gewoonlijk in het midden eene opening, om den moedermond op te nemen, en aan de ontlaste vochten, bijzonder ten tijde der maanstonden, eenen vrijen doorgang te verschaffen. Voor het overige zijn zij cirkelrond, langwerpig rond, ovaal, plat, uitgehold, cylindervormig, ingesneden, of overeenkomstig eener liggende acht (∞), bols- appels- peers- of schroefsgewijs, regt of naar de rigtingslijn van het bekken gekromd. PARÉ, RUSSET, MAURICEAU, VAN DEVENTER, SMELLIE, LEVRET, SIMSONS, AITKEN, GÖLICHE, SAVIARD, SANDYS, CLARKE, JUVILLE,

BERNARD, DENMANN, STARK, PICKEL, ZELLER, BRÜNNINGHAUSEN, WIGAND, LAFOND, MAUERSBERGER en anderen hebben ongesteelde moederringen uitgevonden.

§. 876.

De ongesteelde zijn gewoonlijk met een uitgehold bord voorzien, waarin het onderste segment der Baarmoeder met den moedermond rust. De steel zelf is regt, of naar de rigtingslijn van het bekken gekromd. CAMPER en HUNOLD hebben het meest ter meerdere volkomenheid der gesteelde moederringen bijgedragen.

§. 877.

Het is zeer moeilijk te bepalen, welke van de genoemde moederringen de beste zij. Verscheidene derzelve, welke als de bruikbaarste geroemd werden, deden den Schrijver geenen dienst; terwijl daarentegen anderen, minder beroemd, de Uitzakking zeker terug hielden. Het laat zich derhalve, volgens de ondervinding van den Schrijver, nooit te voren bepalen, of deze of gene met volkomene zekerheid de Uitzakking zal terug houden; en men is dus verplicht, om moederringen van verschillende gedaante te gebruiken.

§. 878.

Om ondertuschen, inzonderheid voor den eerstbeginnenden Heel- en Vroedmeester, grondstellingen aan te voeren, welke de keus en de mogelijke aanwendingen van eenen moederring besturen moeten; zoo

worden daartoe de volgende opgegeven: men moet letten op de wijdde, grootte, diepte en gedaante van het bekken; op de bestaande wijdde der scheede, derzelyer vatbaarheid voor uitzetting en gevoeligheid; op de gesteldheid en den omtrek van den op den moederring steunenden moedermond; op de maanstonen; op de ligging en verrigtingen der pisblaas en van den endeldarm; op de voortdoring en de aanleidende oorzaken der Uitzakking; op derzelyer gesteldheid; of zij aanmerkelijk, volkomen, of onvolkomen is; of de zieke oud of jong, gehuwd of ongehuwd, voor het overige gezond, of aan vele ongemakken en ziekten onderhevig is, bij voorbeeld aan dikwijls hoesten, verstoppingen, hysterische toevallen e. d. g. Naar deze vooronderstelling moet de moederring zoo eenvoudig als mogelijk zijn, met de gedaante, diepte, wijdde en grootte van het bekken overeenstemmen, aan vocht en warmte weêrstand bieden, door derzelyer drukking aan de noodige ontlastingen niet hinderlijk zijn, en eene opening van die grootte hebben, dat de vochten, inzonderheid ten tijde der maanstonen, zich kunnen ontlasten, zonder het daarop steunende scheededeel op eene nadeelige wijze te kwetsen. De ringvormige, ovale, de veerkrachtige Pickel-Sandysche, die van BRÜNNINGHAUSEN in de gedaante van ∞ en van LAFOND heeft de Schrijver onder de ongesteelde moederringen het bruikbaarste gevonden. Van de gesteelde is die van HUNOLD aan te bevelen, bijaldien de Uitzakking niet door eenen ongesteelden kan terughouden worden, waartoe echter telkens een band tot vasthechting vereischt wordt. Aan het einde

van

van den steel worden vier banden aangebragt; waarvan twee van voren onder den navel, en twee naast de lendenwervelen aan den buikriem vastgemaakt worden.

§. 879.

Vóór de aanwending van eenen moederring moeten de volgende regelen in acht genomen worden: 1) men moet vooraf alle hinderpalen verwijderen, welke der nuttige aanwending van den moederring in den weg staan. Bij voorbeeld ontsteking, zwelling, ongewone droogheid, zweren en uitwasfen, aanhoudende bloedvloeijingen, en in het algemeen alle ziekelijke storingen der inwendige teedeelen; 2) de uitgezakte Baarmoeder moet volkomen teruggebragt zijn; 3) de aanwending van den moederring moet des morgens geschieden, en te voren de endeldarm en de pisblaas geledigd zijn; 4) zoo de zieke nooit gekraamd heeft en de scheede zeer naauw is, dan moet men deze door weekmakende baden, stovingen en inwrijvingen zoeken te verwijden.

§. 880.

De aanwending zelve van den moederring geschiedt op de volgende wijze: 1) men laat de lijderes in het bed op den rug liggen, met het kruis omhoog, in dier voege, dat het hoofd iets voorover gebogen wordt, de dijën en kniën echter gebogen en van elkander gelegd worden; 2) de moederring, bij voorbeeld een' ovalen — dien van ZELLER of LEVRET — doopt men in olie, en brengt denzelven in de lengte,

of met deszelfs smalste gedeelte, zóó in de scheede, dat deszelfs langste middellijn op- of nederwaarts, de kleinere voor- en achterwaarts gerigt is. Daarna plaatst men den vinger op het onderste einde van de lange middellijn, en schuift hetzelfde naar de zijde opwaarts, en brengt dien in eene ligging, zoodat deszelfs grootste middellijn naar de zitbeenen gerigt is, het onderste segment der Baarmoeder echter met den moedermond telkens naauwkeurig op de opening van den moederring komt te liggen.

§. 881.

Na de aanwending van den moederring bedekt men de uitwendige teeldeel en met een compres, hetwelk men door een T-verband vastmaakt; men beveelt der lijderes verscheidene dagen achtereen de zorgvuldigste rust in het bed aan, met de dijen dicht bij elkander gelegen, en zoo lang, totdat de moederring behoorlijk in het bekken vastzit. Daarna kan zij wel het bed verlaten, maar zij moet alle te sterke inspanningen en bewegingen van het ligchaam, te overluid spreken, lagchen, hoesten e. d. g. trachten te vermijden, slechts ligt te verteren spijzen gebruiken, den stoelgang meer in eene horizontale ligging verrigten; en, zoo zij tot verstopping geneigd is, gedurende de eerste dagen dikwijls eene klisteer zetten. Van tijd tot tijd moet men onderzoeken, of de moederring niet verschoven is, om denzelfden weder op de behoorlijke plaats, of eenen grooteren, of van eene andere gedaante, er in te brengen, ingevale de Uitzakking door den vori-
gen

gen niet meer teruggehouden, of voor deze schadelijk wordt. Bij het uitnemen van den moederring, dat bij de aangewezenen ligging op den rug moet geschieden, steekt men den vinger in de opening van denzelven, en tracht denzelven op de eene zijde neder te drukken, ongeveer in dezelfde rigting als die er in gebragt is; of zoo dit niet mogelijk zij, dan brengt men eene tamelijk sterke, kromgebogene Sonde aan de eene zijde, tusfchen de fcheede en den moederring, er in, en tracht denzelven aan deze zijde naar beneden te trekken.

§. 882.

In het vervolg kan de lijderes zelve de vereischte oefening verwerven, om den moederring des avonds, wanneer zij te bed ligt, of ten tijde der maanftonden, er uit te nemen, en dien behoorlijk te reinigen. — Wanneer de Vrouw zwanger mogt worden, dan is het beter, van de vijfde maand der zwangerheid af, den moederring niet meer te laten dragen.

§. 883.

Somtijds veroorzaakt de moederring den witten vloed, of beklemming van het fcheededeel, of eene plooi in de fcheede. In het eerste geval moet men den moederring wegnemen, en er liever gedurende eenigen tijd geen inbrengen, of alleen van de spons gebruik maken. In het tweede geval was de Schrijver verplicht, eenmaal den moederring door te fnijden, omdat hij denzelven, wegens zwelling en ontsteking, niet kon uitnemen.

§. 884.

Somtijds vindt men dat de hals der Baarmoeder met dat deel der scheidde, waaraan zij grenst, verzworen is. Men kan de Uitzakking der Baarmoeder wel terug brengen, maar, wanneer zij door de spons of eene blaas niet terug gehouden kan worden, dan moet men een ringvormig moedersteunfel aanwenden. Doch wanneer er met de verzwering van den hals der Baarmoeder tevens scirrhus gepaard gaat, dan is de Uitsnijding der Baarmoeder wel het zekerste middel, zoo als den Schrijver, over den scirrhus der Baarmoeder handelende, op dit geval bijzonder opmerkzaam gemaakt, en den aard en de wijze der Operatie bepaald heeft.

§. 885.

Buiten de reeds aangeprezene zijn er nog meer moederringen, die bij de aanwending bijzondere regelen vereischen. De opgegevene regelen voor de aanwending van den moederring zullen de handelwijze van den Geneesheer altijd behoorlijk besturen; en er blijft hem alleen over, zich te voren slechts met den vorm of het bijzondere maaksel van zulk eenen moederring bekend te maken.

§. 886.

Wanneer de Uitzakking der Baarmoeder aan bijzondere toevallige oorzaken moet toegeschreven worden, dan moet de Geneesheer daarop letten, om de radicale genezing te bewerken: voorondersteld, dat men die oorzaken kunne verwijderen. Zoo vereischt

eischt eene buitengemeene verzwakking der teeldeel-
 len de benoodigde versterking; bloedvloeijingen,
 te hevige maanftonden, witte vloed, diarrhé en
 buikloop, het wegruimen dezer kwalen; aanbeijen,
 variceuse zwellingen, aanhoudende verstoppingen,
 die eenen hevigen aandrang tot stoelgang veroorza-
 ken, de toediening der vereischte geneesmiddelen en
 opvolging van gepaste voorschriften, om dezelve uit
 den weg te ruimen. Sterke bewegingen en inspan-
 ningen van het ligchaam, schadelijke kleederdragt
 e. d. g. moeten, wanneer zij de Uitzakking voor-
 namelijk te weeg brengen, vermijdt worden. Dit
 doel wordt echter niet altijd bereikt, wanneer, bij
 voorbeeld, een te wijd bekken de kwaal bijzonder
 begunstigt.

L I T T E R A T U U R.

§. 887.

CHOPART, *de uteri prolapsu. Par. 1722.*

J. A. KULMUS, *de uteri delapsu, suppressionis urinae et
 subsequentis mortis causa. Gédani 1732; in HALLERI
 disp. chir. Tom. III. N^o. 88.*

A. O. GOELICKE, *de novo artificio curandi procidentiam uteri.
 Francof. ad Viadr. 1741; in HALLERI disput. chir.
 Tom. III. N^o. 88.*

DE BÜCHNER, *de procidentia uteri. Erford. 1744.*

P. A. BOEHMER, *de prolapsu et inversione uteri, ejusque
 vaginae relaxatione. Halae 1748; in HALLERI disp. chir.
 Tom. III. N^o. 86.*

*Ontleed- en Heelkundige Verhandeling over de Uitzakkingen
 en Uitwassen der Lijfmoeder en Scheede; uitgegeven door
 een gezelschap van Utrechtsche Heelmeesters. Utrecht
 1767. 174. p. 8.*

Über

Über den Prolapsus uteri; in LÖFFLER's verm. Aufs. N^o. 5.
FÖHR, de procidentia uteri. Stuttg. 1793.

BACHMANN, de prolapsu uteri. Duisb. 1794.

LEVRET, in het Journal de Médecine. T. XL. en auserle-
senen Abhandlungen für practische Aerzte. II. Bd.
III. Bd. p. 51.

Dezelfde, observations sur la cure radicale de plusieurs
polypes de la matrice, etc.

RICHTER's Anfangsgründe der Wundarzneykunst. VII. Bd.

J. H. KLINGE, commentatio de procidentia uteri etc. Göt-
tingae 1789. c. II. Tab. aen. 8^o.

Über den Vorfall der Gebärmutter; in CAMPER's vermisch-
ten Schriften. N^o. 2. f. en N^o. 6. g. u h.

W. J. BRÜNNINGHAUSEN, über den Muttervorfall und neues
Mutterkränzchen; in LODER's Journal für die Chirur-
gie. I. Bd. 1e. St. bl. 121. Jena 1797. 8^o.

Dezelfde en PICKEL's chirurgischer Apparat. Erlangen
1801. 8^o. S. 81.

J. FR. OSIANDER, de fluxu menstruo et uteri prolapsu.
Gött. 1808. 4^o.

HUHNOLD, de pessariis. Marburgi Cattorum 1799. 8^o.

BERNSTEIN, Handbuch der Geburtshülfe. Leipz. 1799. 8^o.
und Zusätze. Leipz. 1803.

JUVILLE's Abhandlung über die Bruchbänder und andere
Gebärmutterfenkungen. Nurnb. 1800.

Leerboek der Heelkundige Verbanden. Naar het Hoogd.
van J. C. STARK, door den Amst. Heelm. A. V. D. HOUT.
Amst. 1817. 2e. Deel, bl. 126. met pl.



ZESDE HOOFDSTUK.

Over de Uitzakking der Scheede.

§. 888.

Wanneer de vliesachtige buis, welke de Scheede vormt, uit de schaamlippen te voorschijn komt, dan noemt men dit eene Uitzakking der Scheede. Gewoonlijk is het derzelver binnenste vlies, dat zich naar buiten verlengt; en wanneer hetzelfde geheel te voorschijn komt (*), dan is de Uitzakking volkomen. De Uitzakking echter is onvolkomen, wanneer dat vlies slechts aan de eene of andere zijde naar voren dringt.

Kenteekenen.

§. 889.

De diagnosis der volkomene Uitzakking is niet moeilijk, wanneer er nog geene zwelling en hardigheid van het naar buiten gedrongene inwendige vlies bijgekomen is. Het uitgezakte gedeelte is week, teeder, van eene blaauwachtig roode kleur, en weinig gerimpeld, of volkomen glad, wanneer de lijdes reeds dikwijls gekraamd heeft. In den beginne vormt

(*) Roël verhaalt een geval in het *Journal de médecine*. T. LI. p. 60, waar het binnenste vlies der scheede zich tot aan de knie verlengd had.

vormt de Uitzakking eenen ring, in het vervolg, bij de toenemende verlenging naar buiten, eenen cylinder, die onregelmatig geplooid is, aan derzelver benedenste einde eene opening heeft, en welks buitenste bekleedsel het binnenste vlies der Scheede is. Als de Uitzakking reeds langer geduurd heeft, dan is de diagnosis moeilijker. Dezelve heeft dan eene meer donkerblauwe dan roode kleur, en is dikwijls vier tot zes duimen lang, en drie tot vier duimen dik. De buitenste, door het inwendige vlies der Scheede gevormde oppervlakte, is min of meer droog, en het geheel naar eenen vleeschklomp gelijkende. Aan het einde der uitgezakte zwelling is eene spleet tusschen eenen dik gezwollenen, verheven' rand. Dit is de ingang in de omgekeerde Scheede. Brengt men den, met olie bestrekenen vinger in de spleet zoo diep als mogelijk is, dan voelt men den moedermond, die gemakkelijk te bereiken is, wanneer de baarmoeder mede uitzakt. Van eene breuk der Scheede, waarvoor men de Uitzakking der Scheede houden kan, onderscheidt zij zich dáárdoor, dat men in dezelve geen deel voelt, dat terug kan gedrukt worden. Daarbij wordt de lijderes, inzonderheid wanneer de Uitzakking plotselijk ontstaan is, eene buitengewone volheid in de Scheede, en een bijzonder ongemak in den omtrek der pisblaas en van den endeldarm, bijzonder bij het pislozen en den stoelgang, gewaar, welke door de spanning en verrekking dezer deelen ontstaan. Soms voelt zelfs de vinger in den endeldarm dergelijke spanningen en verrekkingen zeer duidelijk. Niet zelden gaat de Uitzakking ook iets terug,

wan-

wanneer men de lijderes met het kruis omhoog op den rug laat liggen. — Wanneer de Uitzakking onvolkomen is, dan vormt zij een' blinden zak, waarvan het onderste einde zonder opening is, en waar langs de vinger of de Sonde in de Scheede komt.

Oorzaken.

§. 890.

Groote flapte van het teelstelsel in het algemeen, gebrek aan toereikenden zamenhang van het celwijsweeffel, waarmede de geplooidde huid der Scheede aan de spieren, vliezen en beenderen van het bekken vastgehecht is; voorafgegane, langdurige ontsteking en zwelling der scheede, inzonderheid kraambedden, waarna gewoonlijk groote verflapping, als een gevolg der onregelmatige uitzetting, nablijft; voorafgegane menigvuldige bloedvloeijingen, witte vloed; voorafgegane menigvuldige verlosfingen van groote kinderen, inzonderheid wanneer het hoofd lang in het bekken vastgezeten had; aanmerkelijke verscheuring van den bilnaad en te wijd bekken, bevorderen zeer de Uitzakking der Scheede. Deze ontstaat des te eerder, wanneer menigvuldige bijflaap en zelfbevlekking, moeilijke stoelgang met hevigen aandrang, en moeilijke verlosfingen, inzonderheid bij het doorzetten der weeën al staande, zware en langdurige operatiën met de tang en keeringen, het tillen van zware lasten, hevig braken, hoesten e. d. g., als aanleidende oorzaken medewerken. — In zeldzame gevallen zag men door groote steenen in de
pis-

pisblaas en Scheede de Uitzakking ontstaan (*). Somwijlen is zij het gevolg van buikwaterzucht, pisopstopping, en van eene breuk der Scheede.

Gevolgen.

§. 891.

De gevolgen zijn: veranderingen in den bijslaap en de bevruchting, inzonderheid wanneer het eene volkomene Uitzakking der Scheede is, beletfelen in het pislozen en den stoelgang, ontsteking, zwelling, variceuse uitzettingen der aderen, ontvellingen en verzweringen der Scheede, witte vloed, te menigvuldige maanftonden, Uitzakking der Baarmoeder, en hindernissen tot eene aanstaande zwangerheid en verlossing.

Geneeswijze.

§. 892.

De geneeswijze vordert terugbrenging der Uitzakking, en bewaring der Scheede in hare geregelde ligging.

§. 893.

Eene niet belangrijke en pas ontstane Uitzakking der Scheede is gemakkelijk terug te brengen. Men laat de lijdere met het kruis omhoog op den rug liggen, schuift dan met den in olie gedoopten wijsvinger het uitgezakte vlies allengskens terug, en drukt

(*) PAGED in KÜHN's *phys. medic. Journal.* 1802. S. 4.
STÖLLER's *Beobachtungen und Erfahrungen.* N°. 2.

drukt hetzelfde aan de zijde overal aan. Wanneer echter de Uitzakking met ontsteking en een variceus gezwel gepaard gaat, dan moet deze eerst te voren door bloedzuigers en doelmatige stovingen uit den weg geruimd worden.

§. 894.

Om de teruggebragte Scheede in hare geregelde ligging te behouden, beveelt men verscheidene dagen rustens in het bed, en brengt eene cylindervormige spons er in, welker dikte en lengte naar de wijidte en diepte van het bekken en naar de grootte der Uitzakking bepaald moet worden. De spons kan men in zamentrekkende afkookfels doopen; of wanneer deze niet toereikend is, dan laat men eenen cylinder van linnen vervaardigen, welke met poeder van zamentrekkende geneesmiddelen gevuld, en te voren in rooden wijn gedoopt wordt. Dit is het voornaamste middel, om de Uitzakking terug te houden, en dezelve volkomen te verhelpen. Wanneer dit niet toereikend is, dan blijft er niets anders over, dan eenen moederring te laten dragen. De cylindervormige moederringen, volgens GARENGEOT of volgens PICKEL, zijn bijzonder aan te bevelen, inzonderheid wanneer zij aan hun bovenste einde dikker, ingedrukt en met eene opening voorzien zijn, deels om het scheededeel op te nemen, deels om aan de afgezonderde vochten eenen uitweg te verschaffen. Dikwijls moet men dezen cylinder met eenen band om het lijf en tusfchen de dijen vastmaken. Dit valt der lijderes veel lastiger. Doch misfchien zou de band wel geheel gemist kunnen

worden, wanneer deze cylindrs eene kromming volgens de rigtingslijn van het bekken bekwamen, en aan derzelve benedenste, tegen den uitgang der scheede gerigte einde, met eenen eenigzins breedrand omgeven waren, die zich bij het inbrengen van den cylinder liet terug drukken, na de aanwending echter onmiddellijk tegen den uitgang der scheede aanlag, en het uitvallen verhinderde.

§. 895.

Eene verouderde Uitzakking der Scheede is moeilijker terug te brengen, inzonderheid wanneer het binnenste vlies zeer ver naar voren gedrongen, gezwollen en verhard is. In dit geval moet de lijderes gedurende eenen langeren tijd aanhoudend op den rug met het kruis omhoog liggen, en ligt verterbare spijsen gebruiken, steeds voor een' gemakkelijken stoelgang zorgen, het verharde gezwel met een afkooksel van scheerling en bilzenkruid stoven, inwendig kwik, met goudzwavel in kleine giften gebruiken, en de Geneesheer van tijd tot tijd beproeven, om de Uitzakking terug te brengen. — Als de Uitzakking der Scheede, ten gevolge eener hevige ontsteking, tot koudvuur overgegaan en geëxulcereerd is, dan moet men bloedzuigers of koppen zetten, en, wanneer het noodig is, enkele deelen van het binnenste vlies geheel afsnijden. — Wanneer steenen in de pisblaas of scheede, gezwollen of eene scheedebreuk aanleiding tot de Uitzakking gegeven hebben, dan moeten deze verwijderd worden.

L I T T E R A T U U R.

§. 896.

SCHACHER, *de prolapsu vaginae uteri. Lips. 1725.*STRÖHLIN, *de relaxatione vaginae etc. Argent. 1749.*LODER, *Programma I—III. de vaginae uteri procidentia. Jenae 1781.*VAN DER HAAR, *Waarnemingen enz.*RICHTER'S *Anfangsgründe der Wundarzneykunst. VII. Bd.*

Z E V E N D E H O O F D S T U K .

Over de Scheedebreuk.

§. 897.

De bodem der baarmoeder en der pisblaas, alsmede de voorste vlakke van den endeldarm, zijn met een vlies bekleed, dat een vervolg is van het buikvlies. Tusschen den bodem der baarmoeder en den endeldarm, en tusschen dien der blaas en baarmoeder is eene holte, welke door den afstand dezer organen van elkander gevormd wordt. In deze holten zakt het buikvlies, het net, of, hoewel zelden, de pisblaas, en maakt aldaar tevens een' wijden open' zak. Zoodra er nu eene Breuk der Scheede ontstaat, dan dringt het gedarmte, dat dezen zak van het buikvlies voor zich heen naar beneden drukt, naar de baarmoeder toe, en komt tot aan den voorsten of achtersten wand der Scheede. Doch om anatomische en physiologische redenen heeft er zelden eene Breuk vlak van voren of achter de Scheede plaats, maar gewoonlijk tevens meer of min aan de eene of andere zijde, uitgenomen, wanneer de pisblaas gezakt is. In dit geval wordt de Breuk van voren gevoeld.

Kenteekenen.

§. 898.

Gewoonlijk gaan er oorzaken vooraf, welke in het algemeen Breuken plegen te veroorzaken, en daarop gevoelt de lijdere, als ware er iets, dat plotseling in de Scheede zakt, terwijl zij te gelijkertijd eene meer of min hevige pijn op de plaats, waar de Breuk is, gewaar wordt, die allengs in eene kolijkachtige pijn, welke of gestadig voortduurt, of nu en dan eens verdwijnt, en weder ten voorschijn komt, verandert. Bij het daartoe in het werk gesteld onderzoek vindt men aldaar een onregelmatig gezwel aan de eene of andere zijde der Scheede. Hetzelve wordt kleiner of verdwijnt geheel en al, als men er met den vinger op drukt, en komt dadelijk weder te voorschijn, als de drukking ophoudt; wordt gespannen, hard en grooter, als de lijdere staat, hoest, of den adem inhoudt; maar week en klein, ja volstrekt niet meer voelbaar, als men de lijdere, op den rug liggende, onderzoekt; de moedermond is volkomen vrij, en staat met het gezwel volstrekt in geen verband. Wanneer er darmen in de Breuk gezakt zijn, dan klaagt de lijdere voornamelijk over kolijkachtige pijnen: doch wanneer de pisblaas zich daarin bevindt, dan wordt het gezwel, dat men voornamelijk aan den voorsten wand der Scheede achter de schaambeenderen voelen kan, grooter, als de lijdere de pis in langen tijd niet loost: en men wordt duidelijk eene borreling in dezelve gewaar. Soms ontstaat er een aandrang

tot pislozing, als men op het gezwel drukt; en het verdwijnt geheel, als de pis geloosd of door den catheter ontlast is. Van de uitzakking der Scheede onderscheidt zich wel de, gewoonlijk met eene uitzakking van den inwendigen rok der Scheede vergezellende, Scheedebreuk, dáárdoor, dat deze gewoonlijk plotselijk verschijnt, met verscheidene ongemakken van het darmkanaal en de overige algemeene kenteekenen der Breuk gepaard gaat, gene echter van tijd tot tijd ontstaat en de genoemde ziekelijke aandoeningen van het darmkanaal en de algemeene kenteekenen der Breuk niet waargenomen worden.

Oorzaken.

§. 899.

Dezelfde oorzaken, die over het algemeen tot Breuken aanleiding geven, kunnen ook eene Scheedebreuk te weeg brengen. Intusfchen neemt men ze zelden bij Vrouwen waar, die nimmer gekraamd hebben; maar meest bij die, welke dikwijls zwanger zijn. De uitzetting der Baarmoeder en Scheede gedurende de zwangerheid en gedurende de verlossing verflapt niet alleen het celwysweeffel, waarmede dit deel zich met den endeldarm en de pisblaas vasthecht, en bevordert daardoor het uitzakken van eene Breuk tusschen dezelve; maar zij verzwakt ook den spierrok der Scheede, verwijdert derzelver spiervezelen van elkander, zoodat de Breuk tusschen dezelve gemakkelijk doorgaan of den geheelen spierrok gemakkelijk kan uitzetten. Het laatste ziet men zeer dikwijls bij zeer moeilijke verlossingen.

fin-

lingen, wanneer het hoofd zeer groot of beklemd geweest, of wanneer door eene ruwe of onvoorzigtige behandeling de Scheede zeer verwijd of gekwetst is geworden. Zoo nam de Schrijver tweemaal de Scheedebreuk waar bij Vrouwen van het platte land, die, na eene hevige poging tot geboorte en van eene onder het staan afgewachte verlossing, veroorzaakt werd. In het eene geval was er aan de tegenovergestelde zijde nog bovendien eene uitzakking der Scheede aanwezig. Het gemakkelijkst ontstaat de Scheedebreuk in de eerste dagen na de verlossing, wanneer Kraamvrouwen het bed te vroeg verlaten, en zich zeer inspannen. Voor het overige kan de scheedebreuk van tijd tot tijd of plotseling ontstaan, als zij door eene zeer krachtdadige inspanning, schudding van het ligchaam, of door eenen val is te weeg gebragt.

Geneeswijze.

§. 900.

De geneeswijze vordert de terugbrenging der Breuk en verhoeding van eene nieuwe uitzakking.

§. 901.

Om aan de eerste geneeswijze te voldoen, laat men de zieke, ingeval de Breuk tusfchen de blaas en baarmoeder gezakt is, met het kruis omhoog op den rug liggen. Men laat liefst de lijderes op de ellebogen en kniën steunen, wanneer de Breuk zich tusfchen den endeldarm en de baarmoeder bevindt, en tracht, na vooraf den endeldarm en de

blaas geledigd te hebben, door eene matige drukking met de vingers de Breuk terug te brengen.

§. 902.

Om, volgens bepaling der tweede aanwijzing, de uitzakking der Breuk te verhoeden, maakt men van de spons gebruik, zoo als zulks bij de uitzakking der baarmoeder aanbevolen is geworden. Zeer nuttig is ook de, voor de terughouding van de uitzakking der Scheede (§. 894), uit linnen bereide cylinder, inzonderheid, dewijl tevens met denzelven zamentrekkende middelen tot derzelver radicale genezing kunnen aangewend worden. Wanneer ook dit niet helpt, of zoo de Breuk van dien aard is, dat zij nimmermeer radicaal kan genezen worden, dan laat men eenen elastiek rond van PICKEL-SANDY, of eenen elastieken scheedecylinder van PICKEL dragen. Vóórdat men er gebruik van maakt, moet men echter dáárop letten, of ook het ingewand, bij voorbeeld de darm, zich volkomen buiten den Breukzak bevindt, en derhalve, inzonderheid wanneer zich de Breuk van achteren gezet heeft, tot boven aan den moedermond met den vinger drukken en strijken. Daarom is het ook noodzakelijk, dat de cylinder lang genoeg zij, en telkens den moedermond bereike, om den weg, waardoor de Breuk gezakt is, volkomen te sluiten.

§. 903.

Het gebeurt echter somtijds, dat, offchoon de cylinder er ingebracht is, de Breuk weder tusfchen denzelven doordringt, inzonderheid aan de achterste vlak-

vlakke der Scheede. De oorzaak ligt of dáárin, dat de veerkrachtige cylinder toegeeft, of dat de lijderes zich aan schadelijke invloeden, die de Breuk weder doen te voorschijn komen, blootstelt. In het eerste geval trof de Schrijver in den elastieken cylinder den noodigen wederstand aan, toen hij denzelven met paardenhaar behoorlijk gevuld had (*). In het tweede geval moet men de lijderes aanbevelen, om alle schadelijke invloeden, bijzonder hevige inspanningen van het ligchaam, te vermijden, en haar in het algemeen die voorschriften aanraden, welke §. 871 gegeven zijn, om de uitzakking der baarmoeder voor te komen.

§. 904.

Slechts zelden wordt eene Scheedebreuk beklemd. Zulks geschiedt of dat men den cylinder, vóórdát de Breuk zelve volkomen teruggebracht is, inbrengt, of ten gevolge van verstoppingen van den stoelgang, ophooping van drekstoffen of ontsteking van den onderbuik, die dikwijls na de opstopping der maanstonen ontstaat. In het eerste geval moet men den cylinder dadelijk er uitnemen, en de Breuk volkomen op de in §. 870 opgegevene wijze trachten terug te brengen. In het tweede geval vorderen verstoppingen van den stoelgang, en ophooping van drek-

(*) De Schrijver heeft in een geval waargenomen, dat de Scheedecylinder van PICKEL bij het uitnemen geheel plat gedrukt, en de Scheedebreuk op nieuw ontstaan was. Nadat hij den cylinder met paardenhaar gevuld had, mislukte deszelfs werking niet.

drekstoffen, verzachtende, olieachtige klisteren, en de ontsteking van den onderbuik derzelver behandeling; waarbij men in dit geval inzonderheid op de wederherstelling der maanstonen letten moet, wanneer deze daartoe aanleiding geven. Vervolgens bewerkstelligt men, na behoorlijke ontlasting van den endeldarm en der pisblaas, de terugbrenging, en steekt men eene spons of een' cylinder er in, om eene nieuwe uitzakking voor te komen.

§. 905.

Geene waarneming is er bekend, dat eene bekleemde Scheedebreuk geöpereerd is geworden. Zoo dit geval mogt plaats hebben, dan moet men, als de Breuk laag in de Scheede ligt, de bekleedfelen van het, door de Scheede gevormd, Breukgezwel door eene insnijding openen, doch den Breukzak blootelijk met den vinger, of met een geschikt dilatatorium verwijderen. Ingeval echter het gezwel zich hoog in de Scheede bevond, heeft men aangeraden, om den onderbuik dicht boven de schaambeenderen door eene insnijding te openen, en den darm uit de Breuk te brengen: eene gevaarlijke Operatie, en nog gevaarlijker, dan binnen de Scheede het Breukgezwel zelf te openen.

L I T T E R A T U U R.

§. 906.

HOIN, in LEBLANC'S *kurzem Inbegriffe chirurg. Operationen*. II. Bd. S. 129.

Mémoires de l'Académie de Chirurgie. I. Bd. p. 707.

SANDIFORT, *observat. anat. patholog.* I. cap. 4.

STARK, *diss. Quaedam de hernia vaginali et strictura uteri.* Jenae 1796.

Dezelfde, *N. Archiv für die Geburtshülfe.* I. Bd. 1e. St. S. 88.

RICHTER'S *Anfangsgründe der Wundarzneykunst.* VI. Bd. S. 1.



 ACHTSTE HOOFDSTUK.

Over de Breuk van den Bilnaad.

§. 907.

Slechts zeldzaam wordt bij Vrouwen de Breuk van den Bilnaad waargenomen. Gewoonlijk zakt deze tusfchen den endeldarm en de Scheede, baant zich eenen weg tusfchen de fpiervezelen der ophigters van den aars, en komt buiten den Bilnaad, digt bij de opening van den aars, gewoonlijk meer of min aan de eene of andere zijde van denzelven, te voorschijn. De Breuk is dan volkomen gevormd en zichtbaar, en wordt daardoor van de onvolkomene fcheedebreuk onderscheiden. In de Breuk zelve kan een darm, een gedeelte van het net, of, offchoon zelden, een gedeelte der pisblaas bevat zijn.

Kenteekenen.

§. 908.

Bij de volkomene Breuk van den Bilnaad vindt men aan de eene of andere zijde van denzelven, zelden in het midden, een gezwel, dat grooter en meer gespannen wordt, als de lijderes ftaat, of den adem inhoudt; kleiner en week wordt, of geheel verdwijnt, als zij ligt, en op eene drukking terugwijkt. Gewoonlijk gaat daarmede een gezwel aan den achterften wand der Scheede gepaard. De onvolkomene

Breuk

Breuk van den Bilnaad kan alleen uit de gewone toevallen, die eene Breuk vergezellen, en door het gevoel, met den vinger in den endeldarm of de Scheede, herkend worden.

Oorzaken.

§. 909.

Alle invloeden en oorzaken, welke Breuken over het algemeen, en inzonderheid ook scheiderebreuken te weeg brengen, kunnen ook tot eene Bilnaadsbreuk aanleiding geven; voornamelijk echter menigvuldige, vooraf plaats gehad hebbende, moeilijke verlosfingen, en hevige en menigvuldige uitzettingen van den endeldarm. Nimmer toch zal, op zeer juiste ontleedkundige gronden, eene Bilnaadsbreuk plotselijk, maar wel van tijd tot tijd ontstaan.

Geneeswijze.

§. 910.

De aanwijzing vereischt, dat men de Breuk terugbrengt, en een middel aanwende, om dezelve in te houden.

§. 911.

Om de Breuk terug te brengen, moet men, na aanwijzing van eene doelmatige ligging, niet alleen het uitwendige, aan den Bilnaad zichtbare, gezwel met de hand terugbrengen, maar tevens ook eenen vinger in de Scheede brengen, en daarmede de achterste zijde naar boven strijken, en het uitgezakte deel naar boven in de buikholte trachten te schuiven.

§. 912.

§. 912.

Om de Breuk in te houden is een uitwendig, op den Bilnaad aangelegd T-verband met een kussentje niet toereikend, maar vereischt de bij de scheedebreuk aangeprezene cylinder, welke in de Scheede gebragt en door een T-verband vastgemaakt wordt. Als die vlijtig gedragen wordt, en de lijderes zich aan geene schadelijke invloeden, die de Breuk op nieuw zouden kunnen te weeg brengen, blootstelt, kan men somtijds de kwaal zelfs radicaal genezen.

§. 913.

De Breuk van den Bilnaad kan, als die der Scheede, door dezelfde oorzaken beklemd worden. De behandeling is even als bij de beklemming dier Breuk is opgegeven geworden. En bijaldien de Operatie aangewezen wordt, dan opent men het gezwel, en verwijdt men den Breukzak met den vinger, of een gepast verwijdingswerktuig, en tracht daarna de uitgezakte deelen terug te brengen.

L I T T E R A T U U R.

§. 914.

SMELLIE, *observations of Midwifery*. Vol. II.

RICHTER, *von den Brüchen*.

Dezelfde, *Anfangsgründe der Wundarzneykunst*. VI. Bd.

S. 23.

CURADE, *Mercure de France*. 1762. Juillet. p. 151.



NEGENDE HOOFDSTUK.

Over de Ziekten der Eijerstokken.

§. 915.

Geene organen zijn aan zoo menigvuldige Ziekten en misvormingen onderhevig, als de Eijerstokken, inzonderheid bij Vrouwen, die den bijslaap uitoefenen en dikwijls gekraamd hebben, waardoor zeer ligt tot eenen pathologischen toestand en onregelmatige afscheidingen aanleiding gegeven wordt. Want een orgaan, dat volkomen in rust is, zegt AUTENRIETH, doet deszelfs voortstuwingsvermogen fluimeren, wendt er de ophooping van af op andere, die, als ware het, afhangen van eene voorhandene som van overvloedige levenskracht, waarover het beschikken kan.

§. 916.

Tot Ziekten en zwelling der Eijerstokken geven aanleiding: onvruchtbare ophooping; de bijslaap zonder schieping van het zaad; zelfbevelekking; menigvuldige storingen der maanstonen, bijzonder derzelve opstopping, en menigvuldige maankolijken; bloedvloeijingen der baarmoeder in het algemeen; plaatselijke zwakheid der teeldeelen, die inzonderheid door menigvuldige kramen, bloedvloeijingen en ontsteking der teeldeelen ontstaan zijn.

§. 917.

Niet alle Ziekten en misvormingen der Eijerstokken kunnen herkend worden. Een Eijerstok kan ge-

geheel buiten alle organische gemeenschap gesteld, ingevallen, verdroogd, tot eene polyp- of kraakbeenachtige massa verhard zijn; dezelve kan vet, haren, tanden, e. d. g. bevatten, en de Vrouw in het leven blijven, zonder dat daardoor ook in het minst de gezondheid gestoord wordt. Alleenlijk ontsteking, verettering, verharding en waterzucht van den Eijerstok kan men herkennen, en veeltijds dan alleen, wanneer zij eenen hoogen graad bereikt hebben. WARDROP heeft ook eenen fungus haematodes van den Eijerstok waargenomen en er eene afbeelding van gemaakt (*).

Ontsteking der Eijerstokken.

Kenteekenen.

§. 918.

De kenteekenen der Ontsteking van den Eijerstok zijn: hevige, meestal diep zittende, vaste pijnen in de eene of andere zijde der onderbuikstreek, naar mate dat de regter of linker Eijerstok aangedaan is. Dikwijls is ook de liesstreek der aangedane zijde pijnlijk en gezwollen. Met dezelve gaan de algemeene kenteekenen der Ontsteking en zeer dikwijls verscheidene van diegenen gepaard, welke de Ontsteking der baarmoeder, bij het toenemen der ziekte, plegen te vergezellen. Deze echter worden inzonderheid waargenomen, als tevens metritis daarbij komt.

Oor-

(*) WARDROP, *Waarnemingen*, t. a. pl. 235 pl. fig. 13.

Oorzaken.

§. 919.

De invloeden, welke ontsteking der baarmoeder veroorzaken, geven ook aanleiding tot Ontsteking der Eijerstokken; voornamelijk verkouding, opgestopte maanftonden, maankoliek, opgestopte kraamvloeden, zogverplaatfingen, met tegenzin gebruikte hevige, sterk werkende ontlast- en afdrijvende middelen, menigvuldige, onvruchtbare ophoopingten, ten gevolge van den bijslaap zonder zaadschieting, onbevredigde teeldrift en Nymphomanie, inzonderheid bij zeer bloedrijke, prikkelbare gestellen, enz.

Geneeswijze.

§. 920.

De Ontsteking der Eijerstokken moet, zal zij niet spoedig tot verettering en verharding overgaan, zeer spoedig verdeeld worden. Hier heeft dus geheel dezelfde aanwijzing plaats, als in §. 767 bij de Ontsteking der Baarmoeder opgegeven is geworden. Ingeval de koorts het karakter eener Synocha heeft, dan kunnen spoedig in het werk gestelde, algemeene aderlatingen, of, zoo deze niet noodzakelijk zijn, bloedzuigers aan de liesstreek gezet, en de anti-phlogistifche methode in het algemeen, (§. 767 en §. 768) de Ontsteking wegnemen. Hiermede vereenige men olieachtige inwrijvingen, verzachtende stovingen en pappen, die deels op den onderbuik, deels op de liezen gelegd worden. Zeer heilzaam

zullen ook verzachtende klisteren, bijzonder bij de Ontsteking van den linker-Eijerstok, zijn. Als de Ontsteking en de pijn, na behoorlijke bloedontlasting, niet volkomen ophouden, dan is het kwik, in kleine giften toegediend, het werkzaamste middel ter volkomene verdeeling, waarmede men ook inwrijvingen met de kwikzalf op de pijnlijke plaatsen van den onderbuik en der liezen, alsmede laauwe baden, inzonderheid met zeep en zemelen, vereenige.

Verettering van den Eijerstok.

§. 921.

De Verettering van den Eijerstok is gewoonlijk het gevolg der ontsteking, inzonderheid wanneer deze verzuimd, en met verkeerde middelen behandeld is geworden.

Kenteekenen.

§. 922.

Gewoonlijk worden de pijnen heviger en ondraagelijk; het gezwel aan de eene of de andere zijde der onderbuikstreek en der liezen neemt in zulk eenen hoogen graad toe, dat het zich van het linker- of regter-heupbeen tot in het midden van den buik, en van den band van Falloppius tot aan de korte ribben en tot over den navel uitstrekt; de beweging van de dije der aangedane zijde valt moeilijk; de lijderes klaagt den ganschen dag over huivering en sterk zweeten; de pis is troebel en heeft veel be-

bezinkfel; de koorts is sluipend, en met eene brandende hitte en hevigen dorst, inzonderheid des avonds, vergezeld; de pols klein en zeer snel. Op het laatst komen er ontlastingen en de onverdragelijkste pijnen in de lendenen.

Geneeswijze.

§. 923.

De Verettering der Eijerstokken is eene kwaal, die zeer moeilijk te genezen is. Meestal sterft de zieke aan de gevolgen van tering. Het best is, wanneer het gezwel spoedig naar buiten van zelf doorbreekt, of door de kunst geopend kan worden. Wanneer zich derhalve nog geene bepaalde plaats vertoont, waar men de opening maken kan, dan wendt men weekmakende pappen en inwrijvingen aan, waarmede men ook dergelijke klisteren doet gepaard gaan. Met de laatste pare men zeer gepast het heulsap, en dit op de wijze en vorm als het Dowers-poeder inwendig toegediend, wanneer de pijnen der zieken onverdragelijk zijn, die meestal des avonds en in den nacht toenemen. Het is zeer nuttig op zijde te liggen, hetwelk ook na de opening van het gezwel moet voortgezet worden, opdat de etter des te gemakkelijker daaruit loopen kan. Voor het overige zij men omzigtig, dat er na de opening geene buitenlucht bijkome, en de zeer gezonkene reproductie der zieke door voedende, ligt te verteren spijs en het gebruik van den kinabast, van het Ijslandsche mos, der saleb.

e. d. g. ondersteund worde; waarmede men bij aanhoudende, brandende hitte, hevigen dorst en uiterend zweet zeer gepast mineraalzuren vereenigt.

§. 924.

Na de ontlasting van den etter volgt er verligting, maar niet altijd volkomene genezing. Niet zelden ontstaat op de eene of andere plaats van den onderbuik een nieuw golvend gezwel, dat van zelf doorbreekt of door eene insnijding moet geopend worden. Meestal heeft dan de kwaal reeds zeer de overhand genomen. Er ontstaan verscheidene fistels, die zich tot de liezen, de lendenspier (*psoas*), de heup- en andere beenderen van het bekken uitstrekken. Daarbij komt beenbederf en de zieke teert van tijd tot tijd uit en sterft.

Over de Verharding en Waterzucht der Eijerstokken.

§. 925.

De Verharding van den eenen of anderen Eijerstok bevordert ook gewoonlijk deszelfs ontaarding tot Waterzucht. Van daar dat ook zeer dikwijls beide ziekten met elkander gepaard gaan, ten minste volgens de waarnemingen van den Schrijver, zoodra zij die hoogte bereikt hebben, dat zij een voorwerp der geneeskundige behandeling worden. Want eene Verharding van den Eijerstok kan lang alleen op zich zelve bestaan, eer zij herkend wordt; en ver-
schei-

scheidene Vrouwen nemen ze in het graf mede, bij wie men ze eerst na den dood, toevallig, bij de ontleding ontdekt (*).

§. 926.

De scirrhus der Eijerstokken is nu eens grooter, dan weder kleiner; en dezelve kunnen tot zulk eenen graad ontaarden, dat zij verscheidene ponden wegen. Het water is in verscheidene zakken en hydatiden van verschillende grootte, bij voorbeeld van een duiven- of hoenderei, of van eenen veel grooteren omvang, besloten; of het is alleen in eene holte bevat. Het vocht zelf is zelden zuiver sereus, meestal slijmig, als gelei, met vlokken, en somtijds met haren vermengd. Gemeenlijk lijdt slechts één Eijerstok, het meest de linker. Somtijds zijn beiden ten minste verhard, offchoon slechts in den eenen Zakwaterzucht plaats heeft. In vele gevallen vindt men Verharding van den Eijerstok met scirrhus en kanker der baarmoeder gepaard.

Ken-

(*) Hetzelfde vinden wij opgemerkt in eene keurige en allezins leerzame waarneming van onzen geleerden en der Wetenschappen te vroeg ontrukten Vriend, weleer Amsterdamschen Geneesheer F. H. HARTOG, in de *Bijdragen tot Theoretische en Practische Geneeskunde* enz. I. Deel, 1e. en 2e. St. bl. 97 en volg. Alleenlijk wenschten wij, dat de Uitgever, om deze waarneming, waarin zoo vele praktische kennis doorstraalt, meer algemeen verkrijgbaar te maken, tot de afzonderlijke uitgave daarvan konde besluiten.

Kenteekenen.

§. 927.

Dán alleen , wanneer de ziekte eenen hoogen graad bereikt heeft , laat zij zich herkennen. Vroeger kan men dezelve aanvankelijk meestal alleen aan de bijzondere zwaarte , en eene stompe , drukkende pijn in de lijdende zijde , aan de , meestal verhinderde , beweging en zuchtige zwelling van den voet derzelfde zijde , en aan de storingen van verscheidene verrigtingen der naast aangrenzende deelen in den onderbuik en het bekken herkennen. Het gezwel neemt slechts zeer langzaam toe , en alleenlijk dan , wanneer het eene of andere ovarium zich aanmerkelijk uitzet. Men voelt aan de eene of andere zijde van den onderbuik een ongelijk gezwel , dat min of meer koud , en somtijds beweegbaar is , en zich ook door eene merkbare golving kenmerkt. Somtijds bespeurt men deze ook in het scheedegewelf ; en in dit wordt men een ligchaam gewaar , dat zich als een zeer bewegelijk deel van het kind in de zwangerheid voelen laat , en daardoor , benevens de uitzetting van den onderbuik , ligt tot eene zwangerheid vermoeden doet (*). Later ondervindt de zieke meer moeilijkheid in het gaan ; zij klaagt over benaauwdheid , verhinderde ademhaling en horizontale ligging , over menigvuldige storingen der digestie , pis- en stoelontlasting.

(*) Men zie de belangrijke waarneming van STARK , in deszelfs *Archiv für die Geburtshülfe*. I. Bd. 1e. St. S. 1.

ting. Vele vallen in eene sluimering, en hebben krampachtige gewaarwordingen in den onderbuik, die met een trekken in het kruis afwisselen, en naar weeënaardige pijnen gelijken. In den beginne zien zij er nog tamelijk goed uit, en hebben geene in het oog loopende verandering. De maanstonen worden echter vroeger onregelmatig, blijven volkomen weg, of worden door den witten vloed vervangen. Naderhand wordt de zieke bleek, leucophlegmatisch, of geheel waterzuchtig, zoodat bij menig-eene op het laatst buik- en borstwaterzucht met zuchtige zwelling der bovenste en onderste extremiteiten en van het aangezigt daarbij komen.

§. 928.

Van eene zwangerheid wordt de scirrhus en de Waterzucht van den Eijerstok door de volgende kenteekenen onderscheiden: 1) het gezwel is ongelijker en oneffener, en openbaart zich meer in de eene of andere zijde van den onderbuik in de heupstreek. In de zwangerheid is het gezwel gelijkvormiger, en meer boven de schaambeenderen en in de navelstreek voelbaar; 2) het gezwel neemt langzamer toe dan in de zwangerheid; 3) men voelt geene beweging van het kind. De eenigzins merkbare golving is wezenlijk van die der beweging van het kind verschillend; 4) aan de borsten mist men de gewone veranderingen in de zwangerheid; zij worden steeds flapper; 5) aan het scheidedeel doen zich ook de gewone verschijnselen niet voor. Men vindt ze somtijds ook wel weeker, alsmede eene ronde gedaante van den moedermond. Doch deze

veranderingen staan in geene betrekking met de toenemende uitzetting van den onderbuik. Zij komen slechts zeer langzaam voor, en nooit zoo in het oog loopend, als in de zwangerheid. En wanneer het gezwel van den onderbuik het grootst is, dan zal het scheidedeel nooit zoo klein, zoo week, en zoo sponsachtig worden, als in de zwangerheid. Hetzelve zal zich echter meer naar eene zijde richten, en zeer moeilijk voelbaar zijn; een gevolg van het meer naar boven en op zijde uitzettende ovarium; 6) gewoonlijk gaan algemeene kenteekenen der Waterzucht daarmede gepaard, en de zieke wordt bij toenemende uitzetting van den onderbuik steeds zieker, hetgeen men in de zwangerheid niet waarneemt.

Lijkopeningen.

§. 929.

Na den dood vindt men het ovarium der zieke zijde op menigerlei wijze ontaard. Het is meer of min verhard, scirrheus en in omvang grooter, de naastgelegene organen uit derzelver geregelde ligging verdrijvende en aanmerkelijk in zwaarte toegenomen. IMHOF (*) maakt melding van een geval, waarin een waterzuchtig ovarium meer dan veertig ponden woog. Buitendien treft men nu de waterachtige ophooping en zelve aan. Daarbij is of het geheele ovarium in verscheidene cellen, of in eenen enkelen zak uitgezet, die het grootste gedeelte van den onderbuik vullen en zeer groote hoe-

(*) In HALLERI *diss. pract.* Vol. IV. p. 380.

hoeveelheden water (naar de waarnemingen van SAMPSON (*) zelfs tachtig tot honderd en twaalf ponden) bevatten kan; of het ovarium is tot enkele beslotene holten en zakken veranderd, welke waarschijnlijk niet anders dan ongeregelde verwijdingen van het blaasje, van het eijertje des ovariums zijn. Het aantal dezer blazen is verschillend. Zij hebben de grootte van eene hazelnoot tot die van een hoenderei, bezitten een dik kraakbeenig vlies, dat somtijds met wezenlijke bloedvaten doorvlochten is, tot derzelve omhulsel en zeldzamer met een dun, sereus, veel vaker met een dik, slijmerig, kleverig, waterachtig, veel gelei- en eiwitstof bevattend vocht gevuld zijn. Gewoonlijk lijdt op deze wijs slechts één, en wel in de meeste gevallen het linker-ovarium. Ook treft men somtijds den Uterus scirrheus en carcinomateus, en in de borstholte sereuse uitstortingen (*extravasatio*) aan. — Een zeer merkwaardig verschijnsel levert echter hier nog het aanwezen van haren en beenderen op, die meestal de gedaante van tanden hebben, en volgens zekere waarnemingen (†) somtijds

(*) In LESKE'S *Auszügen a. d. philosoph. Transact.* I. Bd. S. 223.

(†) Men heeft talrijke waarnemingen van dien aard. Zij zijn uit de Schrijvers bijeengezameld, deels bij DREYSSIG t. a. pl. bl. 504, gedeeltelijk en in nog grooter aantal in J. FR. MECKEL'S voortreffelijke verhandeling: *über regelwidrige, Haar- und Zahnbildungen*, in deszelfs *Archiv f. d. Physiologie*. I. Bd. Halle und Berlin 1813. 4e. Heft. S. 519—588.

tijds in het waterzuchtig ovarium zich bevinden. Deze haren zijn nu eens van een ligter, dan van eene donkere, zwarte kleur met wezenlijke wortels voorzien, zijn somtijds een voet en meer lang, liggen verward door elkander, zitten altijd in een spekkezwel, en zijn van eene geleiachtige massa omgeven. Het laatste heeft ook bij de tanden plaats, die wit van kleur en met een wezenlijk email bedekt zijn, en waarvan men zoowel snijhonds- als baktanden of enkel aangetroffen heeft, of verscheidene soorten van tanden in een enkel beenstuk vastzittende. Zoo vond, bij voorbeeld, BLUMENBACH (*) in een geval acht beenderen, waarvan er vier met zestien tanden van alle drie de soorten bezet waren, buitendien ook nog negen enkele tanden.

Oorzaken.

§. 930.

Waarschijnlijk ontstaat de Hydrops ovarii niet altijd op dezelfde wijze. Dan eens namelijk wordt zij door eene vorming van hydatiden te weeg gebragt, waarin de eijertjes van het ovarium op dezelfde wijs ontaarden, als reeds vroeger, toen er van het ontstaan der hydatiden in het algemeen melding werd gemaakt, aangetoond is, en waartoe de ovariën, wegens derzelver uitstekend lymphatisch, reproductief zamenstel, den grootsten aanleg in zich bevatten. Hiertoe behooren namelijk de gevallen,

waar-

(*) *Medic. Bibl.* I. Bd. S. 163.

HAASE, t. a. pl. III. Bd. §. 377.

waarin men na den dood de verzameling van water in enkele, van elkander gescheidene, beslotene blazen aantreft. — Doch aan den anderen kant kan deze Waterzucht ook daardoor tot stand gebragt worden, dat door organische gebreken, en inzonderheid door de hier zoo dikwijls voorkomende scirrheufiteiten der Eijerstokken, de geregelde opflorping van het uitgewasemde in dezelve gestoord of volkomen weggenomen wordt, dien ten gevolge niet, zoo als in het eerste geval, eene vermeerderde exhalatie zamenwerkt. Ik breng hiertoe die waarnemingen, waarin men geene blazen, maar wel het geheele ovarium in een' eenigen zak uitgezet, of deszelfs parenchyma in eene celwijze en tegelijk oedemateuse massa ontaard, aantrof. — De Hydrops ovarii komt zelden bij jeugdige, meermalen bij bejaarde voorwerpen, bijzonder ten tijde van de natuurmatige ophouding der maanstonen, voor; waarschijnlijk, omdat in dit tijdperk des levens de geneigdheid der Vrouwelijke teeldeelen tot verhardingen grooter, dan in vroegeren leeftijd is. Doch de menigvuldigste en belangrijkste aanleidende oorzaak tot deze ziekte zijn voorzeker ontstekingstoestanden der inwendige Vrouwelijke teeldeelen, waarvan eene overmatige exsudatie het gevolg is. Minder acht ik hiertoe te behooren de door velen bijgebragte onvruchtbaarheid. Zij is zonder twijfel meer een gevolg dan wel oorzaak van den plaatshebbenden ziekte-toestand. Voor het overige is het onverklaarbaar, waarom het linker-ovarium bij voorkeur en menigvuldiger, dan het regter, door Waterzucht aangetast wordt, waarvoor toch de meeste waarnemingen pleiten.

ten. — Onder de opwekkende oorzaken verdienen de ontstekingen der inwendige teeldeelen, en inzonderheid die der ovariën, alsmede de ophooping en het kenmerk van erethismus naar deze deelen de eerste plaats. Hierdoor wordt al wat de prikkelbaarheid der teeldeelen opwekt, verhitte verbeelding en wellustige gedachten, te menigvuldige bijslaap en de ondeugd der zelfbevlekking, de aanleidende oorzaken van den Hydrops ovarii. Van daar zouden ook, volgens SPRENGEL (*), publieke Meisjes en Nonnen aan deze ziekten het meest onderhevig zijn. — Tevens behooren hiertoe organische gebreken, bijzonder verhardingen en knoestgezwollen der Eijerstokken, waardoor de terugvoering van eenen op zich zelven geregelden wasem belemmerd wordt. DOUGLAS (†) vond eens bij eenen Hydrops ovarii de linker-vena spermatica tegennatuurlijk vernauwd, en leidde met waarschijnlijkheid van deze onregelmatigheid de ziekte af.

Insgelijks heeft men voorbeelden, dat uitwendige belediging, een hevige stoot of slag, alsmede het dragen van zware lasten, waarschijnlijk door kwetsing der watervaten, den Hydrops ovarii te weeg bragten.

Minder mogen hier de door de Geneesheeren als opwekkende oorzaken mede opgegevene metrorrhagiën, menostasiën en miskramen (§) gebragt worden, in zoo verre die en de Hydrops ovarii meer mede-

uit-

(*) *Pathol.* 3e. Theil. §. 654.

(†) In LESKE's *Auszügen aus d. philos. Transact.* I. Bd. S. 229.

(§) PERCIVAL, HUNTER en and. bij DREYSSIG, t. a. pl. bl. 500.

uitwerkfelen eener gemeenschappelijke oorzaak van den bovengemelden dynamifchen of organifchen ziekte-toestand der inwendige teeldeelen zijn, dan wel opwekkende oorzaken voor deze foort van Waterzucht zelve, en nog minder hydatiden en blazenwormen, die zich aan de buitenfte oppervlakte van het ovarium kunnen zetten, waarbij echter het inwendige van den Eijerftok gezond blijft, en derhalve door geen en waren Hydrops ovarii gevolgd wordt.

Voorzegging.

§. 931.

Zoo lang de verharding van den Eijerftok op zich zelve bestaat, en deze alleen daardoor buiten alle gemeenschap met het overige Organismus gefteld is, lijdt de zieke nog geen gevaar. Doch meestal wordt in dit tijdstip de kwaal niet herkend, en geen voorwerp van geneeskundige behandeling. Ongunftig is de voorzegging, wanneer de verharding in grootte toeneemt en tegelijk eene waterzuchtige verandering ondergaat. Het grootfte gevaar heeft plaats, zoodra koorts, pijnen in den buik, buikwaterzucht, een kachectifche toestand, algemeene waterzucht, braken, toevallen van verftikking en tusfchenpoozende pols daarmede gepaard gaan.

Geneeswijze.

§. 932.

De aanwijzing bestaat in de verharding op te lossen, en het opgehoopte water te verwijderen. Indien de Hydrops ovarii vroegtijdig genoeg herkend werd, dan zou echter tot eene grondige genezing de eerfte
aan-

aanwijzing zijn, om den ziekte-toestand van het ovarium, waarvan het afhangt, uit den weg te ruimen. Dienvolgens worden, wanneer deze Hydrops door overmatige exhalatie en exsudatie, ten gevolge van eenen voorafgeganen ontstekings-toestand, van eenen ontstekingsprikkel of eene ziekelijk vermeerderde ophooping zich ontwikkelde, bloedzuigers, en inzonderheid de mercurialiën, in- en uitwendig aanangeprezen. Als echter reeds scirrhus en deze in verband met den Hydrops zich ontwikkeld heeft, dan schrijve men, behalve het kwik, de bekende oplosfende en diuretische middelen voor, met name: de gummi ammoniacum, de zeep, de goudzwavel, de belladonna, digitalis purpurea, het conium maculatum, de aqua laurocerasi e. d. g. Meestal komt echter de hulp van den Geneesheer te laat, ten tijde dat deze ziekte, wegens den hoogen graad, dien zij bereikt heeft, herkend wordt. De paracentesis laat zich somtijds slechts onzeker en met levensgevaar aanwenden (*); en zoo die gelukt, dan verschaft zij meestal slechts weinig verligting, omdat gewoonlijk slechts een blaasje van water ontlast wordt, hetwelk daar-

(*) BELCHIER, in *philosoph. transact.* N^o. 423. van LESKE, *auserles. Abhandl.* II. Bd. S. 166, en MORGAGNI, *de sed. et causis morb. Epist.* XXXVIII. art. 68.

Practical observations in Surgery and morbid Anatomy, illustrated by cases, with dissections and engravings; by JOHN HOWSHIP, 1816. 8^o. Londen. (HOWSHIP zegt, dat de paracentesis raadzaam is, wanneer de benaauwdheid toeneemt, en gewoonlijk met verligting gepaard gaat; doch dat er gevallen voorkomen, waar volstrekt niets uitloopt, of dat van verscheidene blazen, die water bevatten, slechts sommigen geledigd worden.)

daarin bevat was. De door J. HUNTER (*) medegedeelde Operatie behoort voorzeker tot de zeldzaamste, ten gevolge waarvan men eene Vrouw nog vijf en twintig jaar daardoor in het leven behield, dat men de paracentesis tachtig maal verrigtte, in het geheel echter zes duizend zes honderd een en dertig pinten of over dertien okshoofden water ontlaste; in welk geval er echter wel gelijktijdig een Hydrops ascites aanwezig was. Volkomene Uitsnijding van den zieken en verhardten Eijerstok, vroegtijdig in het werk gesteld, zoude mischien het zekerste middel tot redding zijn, indien de kwaal slechts vroeg genoeg herkend werd en de Operatie zonder gevaar mogelijk ware. Intusschen heeft men verscheidene waarnemingen, dat deze Operatie wezenlijk met geluk is ondernomen geworden (†). Dus kan de Arts gemeenlijk niets anders doen, dan het leven der zieken, door de verwijdering der gevaarlijkste toevallen, te verlengen.

L I T T E R A T U U R.

§. 933.

A. BRENDÉL, *de hydrope ovariorum muliebri*. Viteberg. 1701.
 ABR. VATER, *graviditas apparens ex tumore ovarii sinistri enormi tandem in ascitem terminata*. ib. 1722. 4^o.

PO-

(*) In de *philosophical Transactions*. V. 74. J. 1784.
Sammlung auserlesener Abhandl. zum Gebrauch für prakt. Aerzte. II. Bd. S. 859.

(†) AUMONIER, in de *Samml. auserl. Abhandl. zum Gebrauche für prakt. Aerzte*. XV. Bd. 3e. St. S. 489.

RICHTER'S *chir. Biblioth.* VIII. Bd. S. 173.

- POLYC. THEOPH. SCHACHER, *Programma de ovarii tumore piloso. Lips. 1735. 4^o.*
- DE HALLER, *disputat. ad morborum historiam et curationem facientes. Lausannae 1757.*
- FEHR, *sistens virginem hydrope ovarii utriusque cum ascite conjuncto laborantem. Argent. 1762.*
- DE PLOUCQUET, *Lit. med. digesta. T. II. et III. Lit. H. hydrops, et lit. O. ovarium.*
- RÖDERER, *de hydrope ovarii. Göttingae 1762. v. Opusc. n. XII.*
- WALTER, in *de Nouveaux Mémoires de l'Académie des Sciences à Berlin 1786.*
- MURRAY, *Progr. de hydrope ovarii. Upsal. 1787.*
- STARK'S *Geschichte einer zweifelhaften und vermeinten, beinahe zweijährigen Schwangerschaft, mit Wassersucht und Scirrhesenz des rechten Eyerstocks, in deszelfs Archiv für die Geburtshülfe. I. B. 1e. H.*
- MICHAELIS, in LODER'S *Journal für die Chirurgie. III. Bd. S. 630.*
- THOMANN, *Annales instit. m. clinici. Wurceb. V. I. p. 139.*
- P. SOHET THIBAUT, *sur l'hydropisie enkystée de l'ovaire. Par. 1803. 4^o.*
- BERENDS, *de hydrope ovariorum, etc. Francofurti 1805.*
- AUTENRIETH, *Untersuchung ausgearteter Eyerstöcke in physiologischer Hinsicht, in deszelfs en REIL'S Archiv für die Physiologie 1807. VII. Bd. 2e. H. S. 255.*
- ELSÄSSER, *Beschreibung einer merkwürdigen Ausartung der Gebärmutter und ihrer Eyerstöcke. S. 223; in de neuen Denkschriften der physical. medic. Gesellschaft zu Erlangen. I. B. (in des Schrijvers Journal. I. Bd. 2e. H.)*
- HAASE, t. a. pl. III. Bd. S. 500.
- S. R. J. ENGELMANN, *hydropis ovarii adumbratio. Berol. 1818. 4^o.*



T W E E D E A F D E E L I N G.

OVER DE ZIEKTEN VAN HET REPRODUCTIEF STELSEL.

E E R S T E H O O F D S T U K.

*Over de walging, misfelijkheid en braking
der zwangere Vrouwen.*

*Over de eigendommelijkheid en het beloop
dezer ongemakken.*

§. 934.

Aan walging, misfelijkheid en braking, als uitwerkfelen der prikkelbare maagvezelen, zijn zwangere Vrouwen zoo menigmaal onderhevig, dat Genees- en Verloskundigen geene zwarigheid gemaakt hebben, om die onder de kenteekenen der zwangerheid op te nemen. Doch zij zijn geene noodzakelijke — geene pathognomonische — verschijnselen der zwangerheid, maar bloote symptomata, louter ziekelijke uitwerkfelen; en een der voornaamste bewijzen hiervoor is, dat zij bij vele zwangere van eene gezonde en sterke lichaamsgesteldheid, van

eene uitstekende werkzaamheid der reproductie, inzonderheid van derzelver mindere sferen — de digestie en assimilatie, — alsmede bij degenen, die bij eenen goeden eetlust eene arbeidzame leefwijze hebben en zich wijders aan geene schadelijke invloeden blootstellen, volstrekt niet waargenomen worden. Dienvolgens moet men ze steeds als ziekelijke aandoeningen beschouwen, offchoon zij ook somwijlen aan de Natuur tot een weldadig middel dienen kunnen.

§. 935.

Het beloop dezer ongemakken is echter verschillend naar het tijdperk der zwangerheid, naar den tijd van den dag, naar de aanleidende invloeden en naar hetgeen er ontlast wordt. 1) De zwangere bekommt dadelijk walging en braking na de bevruchting, of zulks heeft later in de eerste maanden der zwangerheid plaats, duurt dikwijls verscheidene weken, verdwijnt en komt gedurende de geheele zwangerheid niet weder, of doet zich op nieuw in de negende of tiende maanmaand der zwangerheid voor. 2) De zwangere braakt des morgens, wanneer zij nog nuchteren is, dikwijls dadelijk na het opstaan, zij braakt aan tafel of des namiddags gedurende de spijsvertering, des avonds of des nachts vóórdat zij gaat slapen, of het braken is aan geen bepaalden tijd verbonden, en valt nu eens op dezen, dan wederom op dien tijd van den dag in. 3) Het braken volgt of zonder bepaalde aanleiding, of alleen op zekere invloeden; bij voorbeeld dadelijk na den bijslaap, na te sterke beweging, na het genieten of rieken van alle of slechts van som-

sommige spijzen of dranken (*). 4) Bij het braken kunnen sommigen toch ten minste iets in zekere tusschentijden gebruiken, maar anderen braken bij alles, wat zij tot zich nemen. 5) Hetgeen uitgebraakt wordt, is verschillend; het zijn of spijzen of dranken, of vochten, die in de maag bevat zijn, daarin afgezonderd of door naastgelegene organen daarheen gevoerd worden; somtijds wordt er bloed of menigmaal in het geheel niets overgegeven.

Oorzaken.

§. 936.

De walging, misfelijkheid en braking in het begin der zwangerheid, of dadelijk na de bevruchting, zijn doorgaans een gevolg der verhoogde levenskracht in het teelstelsel, en van den grooteren toevloed van vochten derwaarts heen, welke tot de voortbrenging van het ei en de toenemende zwelling der teeldeelen en uitzetting der vaten moeten dienen; dit heeft niet alleen eene vermindering van vochten in al de overige organen in het algemeen, maar voornamelijk in de maag ten gevolge; daardoor bekoint de maag eenen hooger trap van gevoeligheid, inzonderheid bij Vrouwen van een gevoelig gestel, en derzelver vatbaarheid bereikt dikwerf eenen

zoo

(*) De Schrijver behandelde eens eene zwangere Vrouw ten platten lande, die, behalve dat zij na het gebruik van alle spijzen braakte, zulk een' afkeer tegen de groene kleur had, dat zij op het zien van voorwerpen, die groen waren, begon te walgen en te braken.

zoo hoogen graad, dat zelfs het geringste, bij voorbeeld de reuk eener spijs, walging of wezenlijk braken verwekt.

§. 937.

Het braken in de negende maanmaand is bij eene aanhoudend vermeerderde gevoeligheid der maag het gevolg van eene werktuigelijke drukking, inzonderheid wanneer de uitzetting der baarmoeder eenen buitengewoon hoogen graad bereikt, of wanneer ongelijkvormige uitzetting, onregelmatige ligging, naauwe kleederen, zittende leefwijze, zekere houdingen van het ligchaam, en bezigheden enz. de drukking zeer bevorderen, welke onmiddellijk op de maag zelve, of op de lever, de galblaas of naastaanliggende darmen werkt; in het laatste geval kan er te veel gal in de maag uitgestort worden, hetgeen gedurig braken doet.

§. 938.

Het braken in de laatste maand der zwangerheid is of een gevolg van dien invloed, onder welken het in de vorige maand zich voordeed, of er wordt door de gewoonlijk volgende zakking der baarmoeder aanleiding toe gegeven, inzonderheid in dat geval, wanneer bij den in eenen hoogen graad overhangenden buik eene ongewone spanning der maag en van derzelve net ontstaat.

§. 939.

Van het braken, tot hetwelk de invloeden in §. 937 en 938 aanleiding geven, moet men datgene

onderscheiden, hetwelk door indigestie, aanhoudende verstoppingen, en wezenlijke ophooping van drekstoffen in het darmkanaal, voornamelijk op het einde der zwangerheid, door eene beklemde darm- of blaasbreuk, door achterwaartsbuiging of eene uitzakking der baarmoeder, door afdrijvende middelen of door een opzettelijk genomen braakmiddel wordt te weeg gebragt.

§. 940.

Voor het overige heeft men waargenomen, dat Vrouwen van eene uitstekend gevoelige lichaamsgesteldheid, die voor de eerste maal zwanger zijn, en diegenen, welke den bijslaap te veel uitoefenen, eene onwerkzame en aanhoudend zittende leefwijze leiden, veel meer tot braken geneigd zijn.

Voorzegging.

§. 941.

De ligte braking, welke in het begin der zwangerheid, bij voorbeeld in de eerste maanden, plaats grijpt, is van geene kwade gevolgen en verdwijnt dikwijls van zelve. — Menigmaal heeft het braken in de zwangerheid eenen zeer heilzamen invloed, het gaat de indigestiën tegen en weêrhoudt de zwangeren om dezelve te plegen. — Aanhoudend braken, hetwelk telkens met groote inspanning plaats heeft, en vele vochten doet verloren gaan, kan naadelige gevolgen hebben, te vroegtijdige uitdrijving der vrucht en bloedvloeiingen bevorderen, de voortbrengende kracht der Moeder niet alleen, maar ook

die van het Kind zeer verzwakken, en derhalve beschouwt men als gevolgen daarvan: vermagering der zwangeren, en de geboorte van een zwakke-lijk, slechts fchraal gevoed Kind, al valt die ook regelmatig op haren tijd in. — Aanhoudend fterk braken kan ook tot breuken, maar vooral tot uitzakken der fcheede en baarmoeder aanleiding geven. — Braken, hetwelk bij dikwijls op elkander volgende zwangerheid aanhoudend voortduurt, kan menigerlei ftoringen en ontaardingcn der organen van den onderbuik doen ontftaan, die zich eerst in lateren leeftijd als flepene kwalen doen kennen.

Geneeswijze.

§. 942.

Het braken der zwangere vordert eene zeer voorzigtige behandeling; eer men derhalve de aanwijzing bepaalt, trachte men zich naauwkeurig te verzekeren, of het wezenlijk het gevolg der zwangerheid zij of van andere oorzaken afhangt; en is men van het eerfte overtuigd, dan geve men acht op het tijdperk der zwangerheid, en op den tijd van den dag, waarop het braken plaats grijpt; men onderzoek, wat het gemakkelijkst aanleiding tot braken geeft, wat uitgebraakt wordt, hoe lang het reeds geduurd, en welke gevolgen het reeds tot hiertoe voor de zwangerheid en voor de verrigtingen van het overige Organismus gehad heeft.

§. 943.

Indien het braken zich in het begin der zwangerheid voordoet, niet zeer aanhoudend is, en de

zwan-

zwangere ten minste eenige spijsen gebruikt, dan gaat het weldra van zelf over, of de volgende diëtetische voorschriften zullen toereikend zijn, om het te verzachten, of volkomen weg te nemen:

1) de zwangere vermijde alle indigestie en neme een matig diët in acht; zij gebruike geene zware, maar ligt te verteren spijsen, zonder te bepalen welke; die, waaraan zij eertijds gewend was, en welke zij naar de eigene gesteldheid van haren toestand, harer leefwijze en betrekkingen kan verdragen, kunnen haar onder zekere bepaling tot voedsel verstrekken. Hetzelfde laat zich ook op het drinken toepassen; 2) de zwangere moet dikwijls, maar niet te veel op éénmaal, drinken; 3) zij moet steeds het genot eener zuivere lucht hebben, en het is zeer nuttig, in eene kamer te slapen, waarvan de vensters over dag open gestaan hebben; 4) zij moet zich dikwijls in de open lucht bewegen; 5) zij moet van den bijslaap een matig, en het minst des morgens, gebruik maken; 6) zij vermijde eene zittende leefwijze, inzonderheid in een besloten vertrek; 7) zij slape vooral des morgens niet te lang; 8) zij blijve des morgens niet te lang nuchter en begeve zich ook nooit met eene ledige maag aan den arbeid; 9) zij drage gemakkelijke kleederen, en verwerpe voornamelijk die, welke te nauw fluiten; 10) zij vermijde iedere verkouding van de maag en van het ligchaam in het algemeen, voornamelijk na voorafgaande verhitting; 11) zij drage zorg voor eenen dagelijkschen stoelgang; 12) eindelijk houde zij zich buiten allen invloed van datgene, waarop het braken bij haar gewoonlijk pleegt te volgen.

§. 944.

Indien de genoemde diëtetische voorschriften (§. 943) het braken niet wegnemen, of ten minste verzachten, en hetzelfde zoo gestadig blijft aanhouden, dat er gevaar van te vreezen is, dan verdient het de opmerkzaamheid van den Geneesheer.

§. 945.

Wanneer het braken alleen het gevolg is der verhoogde gevoeligheid van de maag (§. 936), dan laat zich dit deels naar de ligchaamsgesteldheid, het temperament en de ligchaamsgestalte der zwangere Vrouw, deels daarnaar bepalen, dat het braken spoedig op het gebruik van eenige spijs plaats grijpt, zonder dat er eerst eene aanhoudende walging, of een worgen voorafgaat, en er eene pijnlijke gewaarwording nablijft, die aan maagkramp grenst, doch niet aanhoudend is, maar veeleer bij vlagen plaats heeft, zoodat de lijderes somwijlen in flaauwte valt, of gedurende eenigen tijd volkomen van hare zinnen beroofd is, dat de zwangere voornamelijk bij het gebruik van vleeschspijzen braakt, of reeds derzelver reuk walging, misfelijkheid en braken verwekt, dat het braken voornamelijk des morgens dadelijk na het opstaan of voornamelijk na den bijlaap herhaald, en dit zelfs door de geringste aanraking, door drukking of verkouding der maagstreek te weeg gebragt wordt.

§. 946.

Het braken echter door al te groote gevoeligheid der maag verwekt, vereischt eene bijzondere keuze
van

van geneesmiddelen, waarbij op derzelver menging, vorm, dosis en aanwending moet gelet worden.

§. 947.

De gevoeligheid der maag is dikwerf zoo groot, dat zij geene inwendige geneesmiddelen verdragen kan; doorgaans braakt de zwangere die reeds weder uit, zoodra zij des morgens opstaat of ook maar het geringste in den mond neemt, of er volgt walging, misfelijkheid of wezenlijk braken op het ruiken van vleesch, op de geringste beweging of op de geringste drukking van de maag, of op het innemen van geneesmiddelen, welke de Arts reeds voorgeschreven had.

§. 948.

In het geval §. 947 moet men geene inwendige, maar alleenlijk uitwendige geneesmiddelen toedienen; tot dat einde kan men de maagstreek inwrijven, of, wanneer dit reeds braken veroorzaakt, er een blad vloeipapier of een stuk fijne flanel, met de geneesmiddelen besprengd, op leggen; wanneer echter, wegens den bij uitstek hoogen graad van gevoeligheid der maag, ook daarvoor geene plaats is, dan kiest men eene meer verwijderde streek, waartoe eene vlak tegen de maag overgestelde plaats op de ruggegraat voornamelijk geschikt is. Onder de middelen zelven verdienen de etherische oliën, het vlug ammoniak, het unguentum nervinum, de essentia macis, de oplossing van den Peruviaanschen balsam in wijngeest, de tinctuur van opium, het butyrum nucis moschatae, eene pleister

uit kruim van brood met pepermunt en kruidnagelen bereid, het emplastrum de galbano crocatum cum opio op zeem gestreken, aanbevolen te worden. Menigmaal is het dragen van flanel of van een hazenvel alleen toereikend, om het braken te verzachten; in andere gevallen heeft men zich van drooge koppen op de maagstreek, en van eene Spaansche vliegpleister tegenover den rug met het gewenschte gevolg bediend.

§. 949.

Tot inwendig gebruik bedient men zich van de koude aftreksels van kruize- en pepermunt, van melissen, van oranjebloesem of van kaneel; de Schrijver heeft een mengsel uit gelijke deelen van melissen- en kaneelwater steeds als het werkzaamste bevonden; somwijlen wordt de Riverische drank met een aromatiek aftreksel aanbevolen; zeldzamer wordt het heulsap en de tinctuur nog minder dan eene uit opium met een aromatisch water bereide Emulsie verdragen. Een citroenschijfje met een weinig suiker, voornamelijk des morgens, bij misfelijkheid en neiging tot braken in den mond genomen, verdient inzonderheid dan aanbevolen te worden, wanneer er volstrekt geene inwendige geneesmiddelen aangewend worden.

§. 950.

Sommige Geneesheeren hebben bij het braken der zwangere Vrouwen ook algemeene en plaatselijke aderlatingen en de antiphlogistifche geneeswijze met verschillend gevolg aangewend; in het op §. 945 vermelde geval kan deze geene plaats vinden;

den: doch wanneer het braken een gevolg van de al te groote prikkelbaarheid der maag is; bij individuen van een uitstekend prikkelbaar, volbloedig gestel voorkomt; bij het braken telken male een sterk worgen, benaauwdheid, pijn op de maagstreek en eene zeer moeilijke ademhaling voorafgaan; de uitgeworpene vochten met bloed vermengd zijn; de pols niet alleen voller en harder slaat, maar op de maagstreek ook eene merkbare klopping, koude extremiteiten en flauwten waargenomen worden; de zwangere niet aanstonds braakt, wanneer zij iets nuttigt, en veeleer des namiddags gedurende de spijsvertering dan des morgens, na hevige beweging, verhitting of het gebruiken van warme dranken; vóór hare zwangerheid de maanstonen zeer overvloedig had en zij dadelijk in de eerste maanden er rooder en voller uitzag, dán alleen wordt de anti-phlogistische behandeling bepaaldelijk aanbevolen: bloedzuigers op de maagstreek gelegd, in vereischt geval zelfs algemeene aderlatingen (*), anti-phlogistische middelzouten, en inzonderheid een mengsel uit poeder van gezuiverden wijnsteen, salpeter en bitteraarde, zullen aan het doel beantwoorden.

§. 951.

(*) In het aangewezen geval maakte de Schrijver onlangs met het gelukkigste gevolg gebruik van eene aderlating op den arm, bij eene zeer prikkelbare zwangere Vrouw, en het braken was, ofschoon het reeds eenige weken geduurd had, na dien tijd opgehouden.

§. 951.

Het braken in de zwangerheid, hetwelk een gevolg der belette reproductie en van gebrek aan maag-sap is, en dááaraan herkend wordt, dat de zwangere reeds te voren tot ziekten van dien aard geneigd was, gedurende de zwangerheid in het aanzigt en over het geheele ligchaam zeer bleek en mager werd, slecht voedsel geniet en voornamelijk alleen na het gebruik van slechte spijsen overgeeft, kan dikwerf verholpen worden door een beter diët, het aftreksel van kruizemunt, melisfen, kaneel, de balsamus vitae H., de essentia corticum aurantiorum, het elixer van WHYTT en geneesmiddelen in het algemeen, welke de irritabiliteit in de reproductie opbeuren.

§. 952.

Is men overtuigd, dat het braken het naast door drukking der zwangere baarmoeder veroorzaakt werd, en voornamelijk aan eene screeve ligging derzelve toe te schrijven zij, dan rade men in het laatste geval eene ligging aan op de tegen den bodem der baarmoeder overgestelde zijde, late een' geschikten band om het lijf dragen, en al datgene vermijden, wat eene screeve ligging begunstigt; doch indien niet deze, maar de meer naar boven zich uitzettende bodem der baarmoeder voornamelijk in de negende maanmaand der zwangerheid het braken veroorzaakt, dan worden laauwe baden, verzachtende stovingen en olieachtige inwrijvingen aangeprezen; en als het braken reeds verscheidene dagen geduurd heeft, dan

wordt

wordt de gevoeligheid der maag als een gevolg der drukking, van den aandrang en de onttrekking van vochten te zeer opgewekt, en alsdan worden de middelen aangewezen, welke §. 948 en 949 zijn aanbevolen.

§. 953.

Eene bijzondere melding verdient het braken, hetwelk in de laatste maand der zwangerheid, als het gevolg eener scheeve ligging der baarmoeder naar voren, of van eenen uitermate overhangenden buik, wordt waargenomen; horizontale ligging met een verhoogd kruis des nachts, en ook dikwijls bij dag, het dragen van een' band om het lijf en de in §. 949 vermelde middelen zullen het braken tegengaan.

§. 954.

Braken, door gebrek aan spijsvertering veroorzaakt, vordert zelden een braakmiddel, dewijl het door eigene werkzaamheid der Natuur in de zwangerheid zeer dikwijls in dien graad bewerkt wordt, welke toereikend is, om de schadelijke stoffen te ontlasten; waar het noodzakelijk aangewezen wordt, moet het vroegtijdig, niet zonder volstrekte aanwijzing, en alleen bij neiging tot braken aangewend worden; men mag ook geene te hevig, te drastisch werkende middelen toedienen; men moet het op allerlei wijze trachten te verzachten, en tusfchen de derde en vierde als ook in de zevende of die maand, in welke de zwangere te voren eene miskraam plagt te hebben, bij neiging tot uitzakking der baarmoeder,

der, bij een te wijd bekken, en bij bloedvloeijingen moet men bijzondere voorzigtigheid in acht nemen, en het liever nalaten, wanneer de nadeelige gevolgen, die uit de aanwending van hetzelfde kunnen ontstaan, het gevaar der aanwezige ziekte overtreffen. Voor het overige behoeft men dáár, waar het braakmiddel aangewezen is, niet altijd een opzettelijk emeticum, van braakwijnsteen of braakwortel, te gebruiken; het braken volgt dikwijls bij de bovendien bij zwangeren zeer verhoogde gevoeligheid der maag, zonder bijzondere pogingen op het gebruik van laauw water of een aftreksel van kamillen. Na het overgeven der schadelijke stoffen door het genomene braakmiddel, begint men echter zeer dikwijls weder op nieuw te braken, of ten minste bespeurt men walging; beide zijn een gevolg der door het braken zelf vermeerderde gevoeligheid der maag, en worden meestentijd door het gebruik van een kopje melisfenthee of van melisse en kaneelwater verholpen, en in geval dit oogmerk niet bereikt wordt, dan houdt men zich aan de in §. 948 en 949 bepaalde aanwijzing.

§. 955.

Belette stoelgang, waarbij meestal zeer vele drekstoffen in het darmkanaal opgehoopt worden, kan ook oorzaak zijn tot braken in de zwangerheid; een slecht diët, het genot van moeilijk te verduwen spijsen, gebrek aan beweging, eene gestadig zittende leefwijze, geven er meestentijd aanleiding toe; daarom moet men vooral het diët regelen, beweging aanbevelen, en alleen bij hardnekkig-

kige verstoppingen zullen klisteren en andere middelen, die den stoelgang bevorderen, noodzakelijk zijn. — Het braken, dat, als symptoma van eene bekleemde darm- of blaasbreuk, door achterwaartsbuiging of uitzakking der zwangere baarmoeder veroorzaakt wordt, vereischt de tot wegneming van dien ongeregelden toestand aangewezenen hulp, gelijk ook de aanwijzing bij het door afdrijvende middelen, of een opzettelijk genomen emeticum te weeg gebragte braken, gewoonlijk eerst door het middel zelf en de plaats hebbende secundaire werking moet bepaald worden.

§. 956.

Somwijlen wordt het braken in de zwangerheid ten uiterste hevig en aanhoudend; het wijkt voor geen geneesmiddel, komt op gezette tijden weder, duurt in dier voege verscheidene maanden voort, heeft aanmerkelijke vermagering der zwangeren ten gevolge, en brengt wel geene miskraam, maar eene aanmerkelijke storing in de voeding van den foetus te weeg; er komt gedurende den aanval eene koorts, die het kenmerk eener tuschenpoozende heeft, bij; de kina, op de maagstreek en door klisteren aangewend, wordt hier bijzonder aangewezen, en wanneer de gevoeligheid der maag zoo zeer verhoogd is, dat de zwangere, telkens al wat zij nuttigt, uitbraakt en daarbij zeer vermagert, dan worden voedende klisteren en baden van melk en vleeschnat zeer aangeprezen, tot tijd en geduld het braken verzachten en stillen; de troost, welken de Arts in hardnekkige gevallen dikwerf aan de zieke geven moet.

LITTERATUUR.

§. 957.

- E. R. CAMERARIUS, *de vomitu gravidarum*. Tub. 1682.
- HÜCKEL, *de vomitu gravidarum*. 1733.
- H. FR. TEICHMEYER, *de vomitu gravidarum primis plerumque gestationis mensibus fiente*. Jena 1738.
- HESS, *de vomitu gravidarum*. Basil. 1751.
- CHR. FR. MEYER, *de affectibus gravidarum*. Halae 1744.
- C. H. SPOHR, *de vomitu bilioso in gravida, meditato in casum medico practicum*. Altorf 1780. 4°.
- J. FR. ROERBER, *de nausea et vomitu gravidarum*. Gött. 8°.
- J. L. BOER, *über die Idiosynkrasie der Schwangern; in deszelfs Abhandl. und Versuch. geburtshulfl. Inhaltes. I. Theil.*
- VAUGHAN, in *Memoirs of the med. soc. of Lond.* II. N°. 13. *auserl. Abhandl. für pr. Aerzte.* XIII. B. p. 658.



T W E E D E H O O F D S T U K.

O V E R D E B E L U S T H E I D , E N S O D E D E R
Z W A N G E R E V R O U W E N .

I.

*O ver de Belustheid.**Verschijselen.*

§. 958.

Gelijk zwangere Vrouwen zeer dikwijls eene walg en eenen afkeer voor zekere spijsen hebben, of allen eetlust verliezen, even zoo worden zij somtijds op zekere spijsen belust (*pica*), of zij hebben eenen onweêrstaanbaren trek naar geheel vreemdsoortige, oneetbare dingen (*malacia*). Het is bekend, dat menige zwangere Vrouw aarde, houtskool, snuitfel e. d. g. met onweêrstaanbare drift verslindt, en de Schrijver heeft waargenomen, dat eene zwangere, die nooit in haar leven vleesch konde eten, dit bij hare eerste zwangerheid met den grootsten eetlust, met vratigheid at.

§. 959.

Deze verschijnselen (§. 958), welke zich of in het begin der zwangerheid, in de eerste drie of vier weken voordoen, of bijna gedurende derzelver gansche

beloop vergezellen, zijn dan ook het gevolg der in eenen hoogen graad verhoogde gevoeligheid der organen, welke tot de digestie en assimilatie behooren, en inzonderheid van die der maag, of zij zijn het gevolg van traagheid en werkeloosheid in dezelve, bij welke de gevoeligheid verminderd schijnt te wezen.

Geneeswijze.

§. 960.

Wanneer zij reeds gedurende een' langen tijd hebben plaats gehad, zijn dikwijls alle pogingen, die de Geneesheer in het werk stelt, om dezelve te doen ophouden, te vergeefs, en zij verdwijnen alleen met de zwangerheid. De Arts kan dezelve derhalve niet altijd geheel tegengaan, dikwijls slechts verminderen, en zelfs dit niet in ieder geval. De voorschriften op §. 943, omtrent het diëet bij het braken, gegeven, inzonderheid doelmatige beweging in de vrije lucht, het vermijden van alle plotselinge verandering der temperatuur, eene opgeruimde gemoedsgesteldheid, vermijding van alle aandoeningen en hartstogten, doelmatig diëet, enz. doen nog de meeste uitwerking.

§. 961.

In geval deze verschijnselen het gevolg eener bij uitstek verhoogde gevoeligheid der verduwingsorganen zijn, kan men laauwe voetbaden met zemelen of melk voorschrijven; tot inwendig gebruik kunnen de in §. 949 bijgebrachte middelen en het heulsap

toegediend worden. Voor het overige wordt de pica zeer dikwijls spoedig verholpen, door het bevredigen der begeerte.

§. 962.

Bij de malacia is dikwijls eene stoffelijke oorzaak voorhanden: bij voorbeeld de begeerte om aarde of kalk te eten, toont dikwijls het zuur in de eerste wegen aan; opslorpende middelen of zulke, die het zuur veronzijdigen, en vervolgens kruidige bittere geneesmiddelen, om de regelmatige werkzaamheid der digestie weder te herstellen, moeten hier inzonderheid aangewezen worden, waarmede men tevens eene ligt te verteren spijs uit het dierenrijk gebruikt, en ouden, vooral rooden wijn, drinkt.

II.

Over de Sode.

Verschijselen.

§. 963.

De Sode wordt zeer dikwijls afgewisfeld met walging, misfelijkheid en braken, of is met of zonder eene bijzondere gevoeligheid der maag gepaard; meestal rispt de maag en geeft zuur op, er ontstaat eene rommeling in den onderbuik, een branden in de maag en in het spijskanaal, vergezeld met braking van vocht, dat zoo helder als water, doorgaans geheel zonder smaak en van eene meerdere of mindere hoeveelheid is.

Geneeswijze.

§. 964.

De Sode der zwangeren is meestal een bewijs eener zeer zwakke spijsvertering. Men moet daarom bovenal een doelmatig diët aanbevelen, en bij het opgeven van zuur, en bij het braken opflorpemde middelen, de bitteraarde met rhabarber, en oranje-schillen toedienen; doch wanneer met de Sode eene hevige gevoeligheid, pijn of kramp in de maag vergezeld zijn, dan doet de Riverische drank, of de oplossing van wijnsteenzout in een aromatiek aftreksel, bij voorbeeld van kamillen, melissen e. d. g., eene voortreffelijke uitwerking. Zoodra echter de Sode verminderd, en de geringste voorhandene stoffelijke oorzaak verwijderd is, dan heeft de aanwijzing van die geneesmiddelen plaats, welke de geregelde werkzaamheid der digestie weder opbeuren: de herba trifolii fibrini, — absynthii, — millefolii, — car-
 dui benedicti, — centaurei min., radix calami aromatici, cortex cinnamomi, — cascarillae, lignum quassiae, de aftreksels daarvan en derzelver extracten, de balsamus vitae Hoffmanni, essentia corticum aurantiorum, elix. Whytt e. d. g. zijn de middelen, waarmede men het voorgestelde doel bereikt.

L I T T E R A T U R.

§. 965.

- MICHAELIS, *de pica. Lips. 1638. 4°.*
 BECK, *de pica praegnantium. Lugd. Bat. 1653.*
 SCHUSTER, *de pica seu malacia. Argent. 1658.*
 GOD. MOEBIUS, *de ardore ventriculi. Jen. 1660. 4°.*
 LUDOLF, *de ardore ventriculi. ib. 1660. 4°.*
 MAUR. HOFFMANN, *de appetitu depravato, pica dicta. Altd. 1662. 4°.*
 P. AMMANN, *de soda. Lips. 1663. 4°.*
 WALSCHMID, *de pica. Bas. 1665. 4°.*
 FRIDERICI, *de pica. Jen. 1668. 4°.*
 JOH. BOHN, *de pica. Lips. 1670. 4°.*
 SCHNEIDER, *de appetitu gravidarum. Witteb. 1670.*
 VAN DER BAY, *de pica. Lugd. Bat. 1676. 4°.*
 J. C. BROTBECK, *de pica. Tubing. 1676. 4°.*
 MAJOR, *de malacia. Kil. 1677.*
 JOH. LUD. HANNEMANN, *gravida pica laborans, panem in pice intinctum avide et innoxie comedit; in Miscell. Acad. Nat. cur. dec. II. pag. 77, ann. 2. 1683.*
 BETTER, *de pica. Ultr. 1687. 4°.*
 B. ALBINUS, *de pica. Francof. ad Viadr. 1691.*
 CHRIST. GOD. GRUNER, *resp. J. CHR. SCHROEN, de pica et malacia morbi genere gravi ac curioso. Jen. 1691. 4°.*
 MALER, *de pica. Basil. 1692. 4°.*
 JOH. LANZONI, *de pica singulari (in arenam) in gravida; in Misc. Acad. Nat. cur. dec. III. pag. 32, ann. 3, 1695 et 1696.*
 G. CRAUSIUS, *de appetitu ventriculi depravato in pica et malacia. Jen. 1698. 4°.*
 De zelfde, *de ardore stomachi seu soda. ib. 1705. 4°.*
 MERGILET, *de pica. Argent. 1701. 4°.*

MEYER, *de pica et malacia. Erford. 1702. 4°.*

JOH. GOD. DE BERGER, *de ardore ventriculi. Vittemb. 1714. 4°.*

JOH. PHIL. EYSELIIUS, *de ardore ventriculi. Erford. 1715.*

QUIR. RIVINUS, *appetitus erroneus, seu pica. Lips. 1719. 8°.*

VERDRIES, *de appetitu depravato, quem picam vulgo vocant. Giess. 1726. 4°.*

MICH. ALBERTI, *de ventriculi ardore. Hal. 1731. 4°.*

JOH. HIERON. KNIPHOF, *de pica. Erford. 1746. 4°.*

RÜGEMER, *de symptomatibus morborum laesae actionis cibis appetentis. Wirceb. 1751.*

JOH. FRID. CARTHEUSER, *de appetitu alimentorum praeternaturali. Franc. ad Viadr. 1760. 4°.*

BOER, t. a. pl.

BÜCHNER, *de soda ut morbo saepe gravi. Hal. 1762.*

SCHNELLER, *de ardore ventriculi. Argent. 1786.*

MEIER, *de varia sodae indole, et nova eandem medendi methodo. Erford. 1792.*

PIERR. GUILL. PRÉJACQUE, *du pica. Par. 1803. 4°.*

HENR. AUG. DUVAL, *essai sur la pyrosis ou fer chaud, Par. 1809. 4°.*

DERDE HOOFDSTUK.

*Over den Buikloop (Diarrhoea) der Zwangere Vrouwen.**Verschijsfelen.*

§. 966.

De zwangeren lijden dikwijls aan diarrhéeën, en wel gedurende de geheele zwangerheid, of alleen op zekere tijden; zoo neemt men dezelve alleen in de vier eerste weken na de bevruchting waar, bij anderen heeft zulks op eenen anderen tijd plaats, bij voorbeeld in de tweede, vijfde, negende of laatste maand der zwangerheid. De diarrhée heeft met of zonder koorts plaats, men gaat een waterachtig vocht af, of het zijn dunne drekstoffen, die meestentijd zeer stinkend, scherp en knagend zijn; somtijds is de diarrhée als een persloop, met bloed en slijm vermengd, en met perfsing vergezeld; in een enkel geval heeft de Schrijver dezelve wit, chijlachtig en met etter vermengd bevonden.

Oorzaken.

§. 967.

De diarrhée der zwangeren, inzonderheid die, welke in de eerste vier weken na de bevruchting ontstaat, is of het gevolg der al te zeer verhoogde

gevoeligheid van het darmkanaal, of van eene gebrekkelijke verrigting van hetzelfde door onwerkzaamheid veroorzaakt, waarbij deszelfs prikkelbaarheid en gevoeligheid gedaald zijn, een slecht voeding sap bereid wordt, en de verteringsverrigting volkomen gestoord is. Soms is de diarrhée een gevolg van het te menigvuldig braken, en der daardoor verhoogde gevoeligheid van het darmkanaal of van de werktuigelijke drukking der zwangere baarmoeder, waardoor, na langdurige verstopping, ophooping van drekstoffen en andere onreinigheden in het darmkanaal ontstaan. Voor het overige kunnen wel alle invloeden de diarrhée in de zwangerheid te weeg brengen, welke buiten dezelve daartoe aanleiding geven; intusschen bevond de Schrijver, volgens zijne waarnemingen, dat voornamelijk verkouding van den onderbuik en der teeldeelen, bijzonder door het vatten van togt bij dunne kleeding, koude voeten, en verkoeling der maag door het te veel drinken van koud water, de diarrhée bij zwangere Vrouwen voornamelijk begunstigen.

Voorzegging.

§. 968.

De voorzegging rigt zich naar de oorzaak, naar het ligchaamsgestel van het voorwerp, naar den tijd der zwangerheid, naar den duur, naar de hoeveelheid en hoedanigheid van den stoelgang, en naar de daarmede vergezeld gaande symptomata. Op deze punten zijn de volgende prognostische stellingen gegrond: als de diarrhée kort na de bevruchting en in
de

de eerste maanden der zwangerheid, niet hevig, zonder koorts en afmatting plaats heeft, en den eetlust noch den slaap stoort, dan is zij van weinig gevolg, en menigmaal een wenk voor de zwangeren, om zich voor verkouding en indigestiën te wachten, en een beter diët in acht te nemen. — Indien er vooraf eene indigestie plaats had, en de zwangere aan eene gestoorde spijsvertering lijdt, dan is de diarrhée dikwijls zeer heilzaam. — Gevaarlijk is een al te menigvuldige, waterachtige en slijmige buikloop met slapeloosheid, koorts en gebrek aan eetlust. — Nog gevaarlijker is het, wanneer de diarrhée als een persloop is, door snijdingen in den buik, hevige pijnen en persing voorafgegaan wordt, en lang duurt; zeer ligt volgt er eene miskraam op. — Wanneer de diarrhée onmiddellijk na de bevruchting plaats heeft, zoo houdt zij gewoonlijk tegen de vierde maand op; zoo zij echter in de derde maand eerst te voorschijn komt, dan duurt zij dikwijls, ondanks alle aangewende middelen, tot in de vijfde maand voort; indien zij langer duurt, dan zijn alle middelen ter genezing vruchteloos, wijl zij meestal niet eerder dan twee of drie dagen na de verlossing zal ophouden; maar zoo zij tot den vierden dag na dezelve aanhoudt, dan is zij hoogst gevaarlijk, en de Kraamvrouwen sterven zeer dikwijls met den negenden of tienden dag (*).

Ge-

(*) Deze prognostische stelling wordt onder anderen door eene zeer belangrijke waarneming van den Schrijver bevestigd, in het 1ste en 2de Stuk der *Lucina*. Marburg 1810. S. 260-278.

Geneeswijze.

§. 969.

De Arts beschouwe geene diarrhée bij zwangeren, offchoon in vele gevallen zonder kwade gevolgen, als onverschillig; zoo er al niet altijd geneesmiddelen gevorderd worden, moet men toch elke aan diarrhée lijdende zwangere eene doelmatige diëet voorschrijven: zij moet zich warm houden, zich voortogt, dunne kleeding en verkouding van allerlei aard, bijzonder van den onderbuik, der maag en voeten wachten; den onderbuik en de maagstreek met warme flanel bedekken, of in het ruwe jaargetijde wollen kousen dragen; indigestiën, het gebruik van koude dranken en van zoodanige spijsen, welke uit haren aard, of ten gevolge eener in de zwangerheid eerst veroorzaakte idiosyncrasie (*), diarrhéeën te weeg brengen, vermijden. Men is somtijds genoodzaakt, zelfs den bijslaap voor eenigen tijd te verbieden, wanneer de diarrhée telkens na denzelfven te voorschijn komt, waardoor de gevoeligheid der spijsverteringswerktuigen verhoogd wordt, die buitendien met het teelstelsel in zulk een allernaauwst verband staan.

§. 970.

De diëtetische voorschriften (§. 969) zijn intuschen niet altijd toereikend, om de kwaal weg te ne-

(*) Zoo zag de Schrijver bij eene zwangere Vrouw telkens op het eten van kalfsvleesch eene diarrhée ontstaan, welke op andere spijsen niet volgde.

nemen, en de Arts is verplicht, om geneesmiddelen voor te schrijven, inzonderheid wanneer op de in §. 968 bijgebragte prognostische punten gevaar en storing der zwangerheid te vreezen is; de keus derzelve hangt af van de oorzaken.

§. 971.

Indien de diarrhée een gevolg is van de verhoogde gevoeligheid van het darmkanaal, en er pijnen en perfsing mede vergezeld gaan, dan wordt het extract van bilfenkruid, en het heulfap bijzonder in emulsiën, de ipecacuanha in kleine giften aangeprezen; en in eenige hardnekkige gevallen heeft de Schrijver van het aanhoudend gebruik eener pleister met kamfer en opium, op zeem gesmeerd en op den onderbuik gelegd, de gewenschte uitwerking gezien. Dat voor het overige alle invloeden, welke niet alleen de gevoeligheid in het algemeen, maar ook bijzonder die van het darmkanaal verhoogen, moeten vermijd worden, zal naauwelijs herinnering behoeven.

§. 972.

Indien de diarrhée door eene verminderde werkzaamheid van het darmkanaal veroorzaakt is, dan moet men de geregelde veerkracht der digestie en assimilatie wederom trachten te herstellen door geneesmiddelen, welke de irritabiliteit in de reproductie opbeuren; de rhabarber in kleine giften, bijzonder als tinctuur, en met aromatische aftreksels, de balsamus vitae Hoffmanni, radix columbo, — calami aromatici, — cascarillae, cortex Simarubae, —

aurantiorum, — cinnamomi, de bittere extracten, de essentia corticum aurantiorum, het elixir. Whytt., zijn de middelen, welke in dit geval te pas komen. Vooral zorg men, om de diëet doelmatig te regelen en eene zekere keus in het gebruik van spijs en drank te doen, totdat de verrigting der digestie en assimilatie haren vorigen geregelde trap bereikt hebbe.

§. 973.

De diarrhée, een gevolg van het menigvuldig braken der zwangeren zijnde, vordert de behandeling bij het braken, zoo als die §. 945—949 is opgegeven; wanneer dit kan weggenomen worden, zal de diarrhée meestal van zelve ophouden. — Soms tijds veroorzaken de diarrhëen der zwangeren ophooping van onreinigheden en drekstoffen in het darmkanaal; gewoonlijk neemt men dezelve in de laatste maanden der zwangerheid waar, als een gevolg van de drukking der uitgezette baarmoeder, en na te voren plaats gehad hebbende aanhoudende verstopping bij eene zittende en onwerkzame leefwijze. Hier worden ontlastende klisteren en voorzigtig aangewende purgeermiddelen aangewezen, waartoe de rhabarber-tinctuur het best geschikt is; een behoorlijk diëet, het gebruik van gemakkelijk te verteren spijsen, beweging en eene werkzame leefwijze moeten der genezing behulpzaam zijn. Men late zich in dit geval slechts niet verleiden, om opium of andere middelen, die de diarrhée tot bedaren brengen, toe te dienen, waardoor of de diarrhée vermeerderd, of tot nadeelige verstopping van den stoelgang

gang met buitengewone benaauwdheid en hoofdpijn aanleiding gegeven wordt (*).

§. 974.

Wanneer de diarrhée door indigestie veroorzaakt is, dan moet men een braakmiddel uit ipecacuanha toedienen, in geval zulks nog geschieden kan, en de zieke zich niet in die maanden zwanger bevindt, in welke ligt eene miskraam te vreezen is, of deze bij eene of verscheidene vroegere zwangerheden plagt te volgen. Buitendien wordt de tinctuur van rhabarber in een aromatisch aftreksel aanbevolen; en wanneer men na de ontlasting van drekstoffen, of als een gevolg der nablijvende verhoogde gevoeligheid of verminderde werkzaamheid van het darmkanaal, de diarrhée nog langer aanhoudt, dan is de in §. 971 en §. 972 aanbevolene geneeswijze aangewezen.

§. 975.

Wanneer de diarrhée van eenen Rheumatischen aard is, na eene verkouding ontstaat, dan moet de zwangere zich warm houden, zich dikker kleeden, en alles vermijden, wat verkouding kan te weeg brengen.

(*) Tot waarschuwing en leering dient de volgende waarneming. Een Geneesheer behandelde eene Vrouw, in de laatste maanden harer zwangerheid, aan eene waterachtig slijmerige diarrhée, welke noch voor het aanhoudend gebruik van het heulsap noch voor een ander stillend middel week; de Vroedvrouw gaf een ontlastend klisteer met keukenzout, waarop eene menigte drekstoffen ontlast werd, en de diarrhée ophield.

brengen, en zulks zoo veel te meer, omdat voor eene zwangere niet altijd datgene schadelijk is, wat zij vóór de zwangerheid, zonder nadeel harer gezondheid, kon verdragen. Buitendien prijze men warme dranken en zweetdrijvende met slijmerige middelen aan, waarbij men, zoodra er pijn in den onderbuik en persing zich voordoen, tevens het heulsap voegt. Dikwijls wijkt deze diarrhée voor geene middelen, wanneer zij namelijk door eene aanhoudende, dikwerf moeilijk te ontdekken oorzaak onderhouden wordt. De Schrijver behandelde de diarrhéen bij zwangeren, voor welke geen geneesmiddel bestand was, tot hij de verandering eener haar voorheen gewone leefwijze ontdekte. Zwangeren, die gewoon waren des nachts in eene warme kamer te slapen, kregen altijd eene diarrhée, omdat zij koud sliepen, en omgekeerd ook diegenen, die voorheen koud sliepen en de slaapkamer met eene warme verwisfelden; eene andere, die gewoon was op een vederen bed te slapen, kreeg altijd eene diarrhée, welke door geen geneesmiddel, dat haar toegediend werd, kon verholpen worden, totdat zij de matras weder met een vederen bed verwisselde.

§. 976.

De diarrhée bij zwangeren verdient eene bijzondere opmerkzaamheid van den Geneesheer, wanneer te gelijker tijd de persloop, in een jaargetijde, dat deze ziekte zoo zeer bevordert, epidemisch of sporadisch heerscht; is de diarrhée bijzonder van een' rheumatischen aard, dan kan die gemakkelijk tot dyssenterie overgaan; deze is in de zwangerheid

wel

wel niet doodelijk, maar toch hoogst gevaarlijk, en geeft dikwijls aanleiding tot eene vroegtijdige geboorte; doch de persloop duurt in het kraambed voort, en er kan ligt metritis en enteritis bijkomen, zoo als de Schrijver eerst in twee gevallen in den zomer van 1811 heeft waargenomen, toen de persloop ten platten lande zoo menigvuldig epidemisch en in de stad sporadisch heerschte; het eene geval was met eene aanmerkelijke ontsteking en verettering der regter borst vergezeld, het kind werd alleen aan de andere gezoogd, de bloedige waterachtig-slijmige ontlastingen waren zeer menigvuldig, de daarmede gepaard gaande koorts was van een' geheel zenuwachtigen aard, en vooral 'snachts met ijlhoofdigheid vergezeld; zij, die den dood reeds zoo nabij en te voren door twee andere Geneesheeren behandeld was, werd volkomen hersteld.

L I T T E R A T U U R.

§. 977.

FR. MAURICEAU, *observations sur les maladies des femmes grosses etc. observ.* 195.

G. H. VESTI, *de diarrhoea lochiis superveniente. Erf.* 1713.

A. BERGEN, *de diarrhoea puerperarum. Francof.* 1721.



VIERDE HOOFDSTUK.

*Over de hardlijvigheid der zwangere Vrouwen.**Oorzaken.*

§. 978.

Zwangeren zijn veelal tot hardlijvigheid geneigd; want 1) is, bij de zeer verhoogde voortbrengingskracht van het teelstelsel, de geregelde veerkracht van het darmkanaal dikwijls verminderd, en de stoelgang volgt niet altijd regelmatig; 2) zwangeren zijn zeer dikwijls gewoon vele en gedeeltelijk zeer moeilijk te verduwen spijsen te eten, of wanneer ook te voren daardoor geen belette stoelgang veroorzaakt werd, dan kan deze eerst door de tegenwoordige vermindering der werkzaamheid van het darmkanaal ontstaan; 3) de hardlijvigheid wordt ook zeer dikwijls door de drukking der zwangere baarmoeder, en van het hoofd des Kinds bevorderd, voornamelijk in de laatste maanden der zwangerheid, wanneer de baarmoeder vroeger en dieper dan gewoonlijk met het hoofd in de holte van het bekken daalt; 4) de tweede regelmatige ligging van het hoofd bevordert ook voornamelijk de hardlijvigheid, inzonderheid wanneer het eene onregelmatige grootte heeft, omdat in dit geval het achterhoofd of de schedel den endeldarm nader aanraakt en drukt; 5) eindelijk is de zittende leefwijze, waaraan zwangere

geren uit gemak en traagheid zeer zijn overgegeven, eene der voornaamste aanleidende oorzaken der hardlijvigheid.

§. 979.

De gevolgen eener aanhoudende hardlijvigheid zijn: langdurige hoofdpijnen, benaauwdheden, duizeling, flapeloosheid, onaangename droomen, braking, gebrekkige ligging der baarmoeder, aderspat der onderste extremiteiten, somtijds diarrhée zonder verligting der eerstgenoemde toevallen, verhinderingen in het beloop der invallende geboorte, pijnlijke, ongeregelde en onwerkzame weeën, hinderpalen in het werktuigelijke der geboorte of tot den doorgang van het Kind, en in het kraambed grooter gevaar voor de kraamkoorts, bijzonder wanneer zij, met gierstuitslag vergezeld, epidemisch heerscht.

Geneeswijze.

§. 980.

Bij hardlijvigheid gedurende de zwangerheid moet men voorzigtig met purgeermiddelen zijn, en dezelve nooit zonder bijzondere omzigtigheid toedienen. Het darmkanaal is meest bij zwangeren dikwijls zoo onwerkzaam, dat er reeds groote giften daarvan vereischt worden, om stoelgang te bewerken; zeer gemakkelijk vermeederen dezelve niet alleen die onwerkzaamheid nog veel meer, maar zij storen ook de digestie en assimilatie der moeder, als ook de voortbrenging en voeding van den foetus, en berooven

naderhand ook de baarmoeder, als uitdrijvend orgaan, van de noodige kracht om de geboorte uit te oefenen.

§. 981.

Het heeft niet aan Geneesheeren ontbroken, die hunne pogingen in het werk gesteld hebben, om zelfs bijzondere drauken voor zwangeren uit te vinden; het is genoeg, om slechts van den gezondheidsdrank van LEHNHARD melding te maken: dezelve zijn meer schadelijk dan heilzaam; doch het is van het meeste belang, om zoo veel mogelijk de oorzaken, die de hardlijvigheid begunstigen, weg te nemen. In de meeste gevallen zijn derhalve gepaste diëtetische voorschriften veel werkzamer: 1) men bevele dagelijks eenige malen beweging in de vrije lucht, en trachte aan de zwangeren meer bezigheid te verschaffen, en haar daardoor opgeruimder te maken; huisfelijke bezigheden en beweging in den morgenstond behooren tot de beste middelen, om den stoelgang te bevorderen; 2) somtijds laten de zwangeren den eenen of anderen drank of spijszamen, waaraan zij vóór de zwangerheid gewend waren, en op welker gebruik de stoelgang telkens geregeld plagt te volgen, bij voorbeeld de koffij; men late haar die weder drinken, in geval er geene redenen zijn, welke zulks verbieden. Over het algemeen verdient de verandering der vorige leefwijze alle opmerkzaamheid, om door aanbeveling en opvolging van eene aan de vorige overeenkomstige, maar met betrekking tot de zwangerheid onschadelijke leefwijze den gewonen en regelmatigen stoelgang te

te bewerken; 3) de zwangere vermijde het vele zitten, bijzonder in de eenzaamheid en in een besloten vertrek; 4) men prijze ligt verteerbare, niet te vette, te lijmige en winderige spijsen, bij voorbeeld kalfs- en rundvleesch, hoenderen, gekookte vruchten, bijzonder gekookte pruimen en kerfen, goed gaar gebakken brood aan; het spreekt van zelf, dat omtrent de keus de bijzondere idiosyncrasiën en afkeerigheid der zwangeren in acht moeten genomen worden; 5) wanneer de regelmatige stoelgang door drukking, ten gevolge eener scheeve ligging der baarmoeder of van het hoofd des Kinds, gehinderd wordt, dan trachte men dezelve uit den weg te ruimen of ten minste te verminderen; het gebruik van een doelmatig verband, de ligging op zijde, en de vermindering van alles, waardoor de scheeve ligging der baarmoeder bevorderd wordt, verdienen in dit geval bijzonder te worden aanbevolen; 6) wanneer men in de zwangerheid, door een uitwendig onderzoek de tweede normale ligging van het hoofd kan vermoeden, dan late men de zwangere op de rechterzijde liggen, bijzonder des nachts: deze ligging kan somtijds den stoelgang gemakkelijker maken.

§. 982.

Indien de in §. 981 vermelde voorschriften niet toereikend zijn, en er reeds eenige der aldaar opgenoemde gevolgen plaats hebben, de zwangere over benaauwdheid, slapeloosheid, hoofdpijn e. d. g. klaagt, dan bevele men klisteren. Dikwijls is laauw water of een afkooksel van zemelen reeds voldoende

om ontlasting te bewerken, zoo niet, dan nemen zijne toevlugt tot klisteren uit eene oplossing van zeep, of meestal uit een afkookfel van zemen met honig, olie en keukenzout, en zij zullen het doel zelden misfen, ten zij de onwerkzaamheid van het darmkanaal eenen hooger en graad bereikt hebbe, in welk geval een ontlastmiddel uit tinctuur van rhabarber met een aromatisch aftreksel kan toegediend worden; men wachte zich voor het overige, om al te drastisch werkende purgeermiddelen toe te dienen, die bij zwangeren zoo ligt bloedvloeijingen, ontstekingen van den onderbuik en ontijdige geboorten te weeg brengen. Wanneer men bij prikkelbare, volbloedige gestellen, en bij eene uitstekende stijfheid der vaten, verstopping waarneemt, de afgang zelden plaats heeft en bij geweldige ophooping droog is, daarbij opwellingen en eene neiging tot bloedvloeijingen komen, dan rade men eenen antiphlogistifchen leefregel en een verdunnend diët aan; men zette klisteren uit een aftreksel van verzachtende kruiden, met veel olie, en late dagelijks eenige malen een poeder van wijnsteenroom, salpeter en bitteraarde innemen.

§. 983.

Voor het overige dient men het meest op eene hardnekkige hardlijvigheid, welke tegen het einde van de laatste maand der zwangerheid plaats heeft, te letten, om niet alleen eene mogelijke hindernis voor de op handen zijnde geboorte, maar ook de nadeelige gevolgen voor het Kraambed tegen te gaan. De Natuur bewerkt, wel is waar, gelijk elken Ver-

Verloskundige bekend is, met de invallende geboorte eenen vermeerderden stoelgang, en in dit geval is de kunst er in het minste niet toe noodig; integendeel kan men somtijds vooral door zeer prikkelende klisteren nadeel doen, de geboorte verhaasten of te spoedig waterachtigen afgang bewerken; doch bij hardnekkige hardlijvigheid zijn deze van een bijzonder nut, offchoon niet altijd voor de geboorte, toch ten minste voor het Kraambed; alleenlijk zouden, volgens des Schrijvers waarnemingen, bij kraamkoortsen de gastrische complicatie en het meteorismus bijzonder daardoor begunstigd worden.

FORESTUS, *observat. Libr. XXI. obs. 24.*



V I J F D E H O O F D S T U K.

Over het Kolijk der Zwangeren.

§. 984.

Zwangeren lijden voornamelijk in de eerste en vervolgens in de laatste maanden, ten minste naar des Schrijvers waarnemingen, niet zelden aan het Kolijk, dat zich door pijnlijke gewaarwordingen in den onderbuik openbaart, nu eens meer of minder hevig is, dan wederom aanhoudend of bij tusfchenpoozen plaats heeft; nu eens Vrouwen van eene irritable, dan eens van een gevoelig ligchaamsgestel aantast; en eindelijk nu eens korter, dan wederom langer duurt.

§. 985.

Echter wordt hier alleen over het Darmkolk (colica intestinalis) gesproken, dat met het nierenkolk (colica nephritica) (*) of galkolk (colica hepatica) of met weeën als gevolgen eener op handen zijnde ontijdige geboorte niet moet verwisfeld worden; de diagnosis verdient daarom de bijzondere opmerkzaamheid van den Geneesheer.

Di-

(*) Het nierenkolk komt bij Zwangeren en Kraamvrouwen dikwijls voor, en wordt zeer ligt miskend; de Schrijver heeft het viermaal waargenomen, en het had den hevigsten graad van ontsteking bereikt; somtijds gaat het met metritis en enteritis gepaard.

Diagnosis van het Darmkolijk.

§. 986.

Bij het Darmkolijk klaagt de zwangere over eene pijnlijke gewaarwording in den onderbuik, die zich eerst in de maag of ter plaatse van dezelve, vervolgens voornamelijk om den navel openbaart, somtijds ook over den geheelen onderbuik, nu eens op de eene, dan weder op de andere plaats van denzelven waargenomen wordt. De pijn is uit haren aard niet altijd bepaald, maar houdt zich nu op de eene, dan op de andere plaats op, zij is somtijds snijgend, spannend of brandend; in het eerste geval blijft het alleen bij de idiopathische aandoening, en zij verdwijnt dikwijls van zelve na eenen zachten buikloop; doch zoo dezelve brandend is en toeneemt, dan worden ook andere organen en verrigtingen deels der reproductieve, deels der irritable sferen aangestast; er volgt walging en braking, slapeloosheid, koorts, hitte, een kleine krampachtige pols, koude extremiteiten, benaauwde ademhaling enz.

§. 987.

Het Darmkolijk is wijders of met diarrhée of hardlijvigheid vergezeld; het laatste is bij zwangeren van een prikkelbaar ligchaamsgestel dikwijls het geval.

§. 988.

Van het nieren- en galkolijk is het Darmkolijk onderscheiden door de volgende kenteekenen: 1) het Kolijk heeft in de eerste maanden der zwangerheid

plaats, en de pijn openbaart zich nu eens in de eene, dan weder in de andere zijde; 2) de pijn wordt het eerst in de maagstreek waargenomen, vergezeld met of voorafgegaan door walging en braking; 3) de beslagen tong bewijst de storing in de digestie en assimilatie; 4) de pijn wordt ter plaatse van de maag en den navel waargenomen, en daarop volgt stoelgang of diarrhée; 5) er ontstaan winden, de zwangere heeft koude gevat, of er hadden te voren indigestiën plaats; enz.

Kenteekenen van het Galkolijk.

§. 989.

De pijn, die bij het Galkolijk plaats heeft, ontstaat plotselijk zonder een' bepaalden invloed, terwijl de kranke voor het overige welvarend is. De zelve is 1) ten uiterste gevoelig, en wordt voornamelijk in de regterzijde onder de korte ribben, in de lever en in den hartkuil gevoeld, een bewijs der aandoening van de kleine kwab der lever en van de gemeenschappelijke galbuis (*ductus chole-
dochus*); 3) de zwangere gevoelt dadelijk in den beginne hitte in de handpalm; bij het darmkolijk wordt zulks niet, of later waargenomen, wanneer er koorts bijkomt; 4) met het galkolijk is dadelijk koorts vergezeld, met het darmkolijk niet, ten zij er naderhand ontsteking bijkome, voornamelijk wanneer een darm gedrukt of beklemd wordt, dan komt er koorts bij, de pijn is snijdend, brandend, en de pols klein en zamengesrokken; 5) bij het galkolijk houdt de pijn op het laatst geheel op, zoodra de steen door

door de gemeenschappelijke galbuis gegaan is , daarop volgt eenigzins geelzucht , ten minste het bindvlies van het oog of het aangezigt neemt eene gele kleur aan.

Kenteekenen van het Nierenkolijk.

§. 990.

Bij het Nierenkolijk is 1) de pijn in de lendenstreek op eene plaats bepaald en snijdend; 2) de pislozing is belet of volgt zeer zelden; de schaamstreek is buitengewoon verheven, en vormt eene veerkrachtige, zeer gespannene zwelling; 3) de pis is, zoodra de ischurie ophoudt, troebel, dik en met een sterk bezinksel (*urina jumentosa*) bezet; 4) de pijn strekt zich, wegens de drukking der nieren op de lendenzenuwen, tot aan de dijen uit, en trekt in de lenden, de ronde baarmoederbanden, de liezen en dijen heen en weder; 5) wanneer men de gemelde verschijnselen waarneemt, en de zwangere de pis volstrekt niet, of slechts in eene geringe hoeveelheid lozen kan, dan kan men deze pijnen niet met het slapen, en de spanningen, of het rekken der dijen, en met de pijnen in de liezen verwisfelen, welke op het einde der zwangerheid door de drukking der baarmoeder op deze deelen ontstaan, en waarbij de pis ongehinderd geloosd, en geene koorts waargenomen wordt; want bij het nierenkolijk is koorts aanwezig, en er wordt weinig of volstrekt geene pis geloosd.

Het Darmkolijk van de weeën en eene op handen zijnde, ontijdige geboorte onderscheiden.

§. 991.

Men kan het Darmkolijk bij Zwangeren ook gemakkelijk voor weeën houden, welke eene op handen zijnde ontijdige geboorte of eene miskraam aankondigen; het is door de volgende kenmerken daarvan onderscheiden: 1) indien het weeën zijn, dan nemen de pijnen bepaaldelijk in het kruis eenen aanvang, en strekken zich naar de schaamstreek uit; bij het darmkolijk bepalen zij zich meer tot de nabijheid van den navel, of volgen de rigting dwars over den twaalfvingerigen en aan beide zijden over den regter en linker karteldarm; 2) bij de weeën wordt de onderbuik staande de pijnen meer of minder hard, en kleiner van omtrek; doch bij het Darmkolijk neemt dezelve, naar mate de pijnen aanhouden, veelmeer in grootte toe; nimmer echter heeft er eene hardheid, gelijk aan die gedurende de zamentrekking der baarmoeder, maar meer een veerkrachtig gezwel plaats; 3) bij de weeën doen zich veranderingen aan het scheidedeel en aan deszelfs moedermond voor, deze wordt geopend, gene korter en weeker; er vloeit water af, de slijmafzonderring in de teeldeelen is vermeerderd, het voorliggende deel komt, naar mate de pijnen toenemen, meer en meer voorwaarts, en bij eene ontijdige geboorte in de eerste maanden der zwangerheid zijn de pijnen gewoonlijk met eene hevige bloedvloeijing vergezeld; bij het darmkolijk worden deze verande-

rin-

ringen niet waargenomen, ten minste nimmer oorspronkelijk; secundair kunnen zij als gevolgen plaats hebben, voornamelijk wanneer het darmkolijk zeer hevig is, en de noodige hulp verzuimd wordt: daaruit volgt, dat men ter bepaling der diagnosis onderzoeken moet, en Geneesheeren, die dit niet doen, kunnen daarin tot groot nadeel der zwangeren zeer dwalen.

Oorzaken van het Darmkolijk bij zwangeren.

§. 992.

De oorzaken kunnen verschillend zijn: 1) plotse-
lijke verkouding van den onderbuik, en voornamelijk der voeten; het loopen met bloote voeten is derhalve, gelijk de Schrijver zoo dikwijls heeft waargenomen, voor de Zwangeren bijzonder nadeelig; 2) indigestiën, waartoe Zwangeren, uit hoofde van de drukking der baarmoeder op de maag, en vooral op den karteldarm en de daardoor te weeg gebragte onwerkzaamheid der digestie buitendien zeer geneigd zijn; hierom hebben het Kolk en de indigestiën gewoonlijk hunnen zetel in dezen darm; 3) ontwikkeling en ophooping van lucht in het darmkanaal (*colica flatulenta*), meestal na het gebruik van zeer winderige spijsen, voornamelijk bij verzuimde beweging; de buik is dan uitermate opgezet, en er zijn gewoonlijk borreling, winden, oprisping (*flatus, ructus*), eene rommeling in den onderbuik, met duizeling en buitengewone benaauwdheid mede vergezeld; of 4) het Darmkolijk is een gevolg van ophooping van drekstoffen in het kolon, waar-
door

door dan zoo groot eene verandering in hetzelfde kan ontstaan, dat er slechts eene kleine opening ten doorgang van drekstoffen overig blijft, die zich derhalve in de ingewanden bovenmate ophoopen en door drukking, uitzetting en misfchien ook door ontwikkeling van lucht het Kolijk veroorzaken, dat meestal met hoofdpijn, duizeling en ontzettende benaauwdheid en beklemmdheid vergezeld is; wanneer zij gedurende hare zwangerheid een zeer zittend leven doorgebracht heeft, langen tijd volstrekt geene of ten minste zeer weinig afgang gehad heeft, het Kolijk in de laatste maanden der zwangerheid plaats grijpt, zoo zij kleederen droeg, die den onderbuik zeer drukten, bijzonder om de zwangerheid te verbergen, reeds sedert langen tijd eene drukking en pijnlijke spanning in den onderbuik gevoelde, of zich ter plaatse van den karteldarm eene gewaarwording openbaart, alsof er een knoop dwars door getrokken werd, en gedurende de zwangerheid zeer zwaar te vertieren spijsen gebruikte, dan is de ophooping van drekstoffen, als oorzaak van het Kolijk, zoo veel te zekerder bevestigd; of 5) het Kolijk is een gevolg der al te zeer verhoogde gevoeligheid van het darmkanaal; meestal bij zeer gevoelige, zwakke ligchaamsgestellen, en heeft gewoonlijk in de eerste maanden plaats, bij velen dadelijk na de bevruchting, hetgeen voor zulke gestellen de zwangerheid om dezen tijd zeer lastig en onaangenaam maakt; de buik is dikwijls buitengemeen gevoelig, kan de geringste aanraking niet verdragen en geeft ligt aanleiding tot miskraam; 6) zelden ontstaat het Darmkolk bij Zwangeren uit breuken (*herniae*), dewijk

de-

deze meestal in de zwangerheid, zoo zij niet vergroeid zijn, verdwijnen.

Voorzegging.

§. 993.

Het Kolijk der Zwangeren is, zoo lang de pijnen geen' al te hoogen graad bereikt hebben, niet gevaarlijk; maar indien deze zeer hevig worden, zoo er koorts, een kleine pols, slapeloosheid daarmede vergezeld gaan, dan is er ontsteking, en vooral eene ontijdige geboorte of eene miskraam te vreezen; bij het Kolijk door indigestiën komt dikwijls eene diarhée, en daarmede verdwijnt de ziekte.

Geneeswijze.

§. 994.

Bij de behandeling moet men bijzonder op de oorzaak letten. Indien het Darmkolk uit verkouding ontstaat, dan dienen diaphoretische middelen; de zwangere houde zich in eene warme kamer, neme rust in het bed, bedekke den onderbuik en de voeten met warm fleñel, waarmede de onderbuik van den kartel- naar den endeldarm toe voorzigtig kan gewreven worden; men late inwendig een aftreksel van vlier- en kamilbloemen met Sp. Mindereri rob samb. nemen, en van hetzelfde aftreksel klisteren zetten; bij deze behandeling zal het Kolijk meestal verdwijnen, en de plaatshebbende zweeting is doorgaans het teeken van beterschap of volkomene genezing.

§. 995.

§. 995.

Wanneer het Kolijk het gevolg van eene indigestie is, en er dadelijk in den beginne hulp verlangd wordt, de ingesta zich nog in de maag bevinden, dan late men eene klisteer uit een aftreksel van verzachtende kruiden zetten, en diene een braakmiddel toe; voorondersteld, dat de al te groote uitzetting van den onderbuik het braken niet hindert en gevaarlijk maakt, of anders eene tegenaanwijzing de aanwending niet gedooft; wanneer men later bij de zieke komt, dan schrijve men eenen Riverifchen drank, ontlastende klisteren, en met behoorlijke voorzigtigheid aangeprezene purgeermiddelen, voor.

§. 996.

Wanneer het een Windkolk is, dan moet men voornamelijk letten op hetgene daartoe aanleiding gegeven hebbe, bijzonder dáárop, welke spijsen er voornamelijk gebruikt werden; men kan hetzelfde spoedig verdrijven, of door een braak- of purgeermiddel, bijzonder uit wijnsteenroom met bitteraarde en rhabarber, alsmede door ontlastende klisteren; doch men bereikt niet altijd dit doel, het Windkolk duurt voort, en men is genoodzaakt, zoogenaamde carminativa aan te wenden, waardoor de verminderde werkzaamheid van het darmkanaal verhoogd wordt; de aftreksels van kruizemunt en melissen, van fenkel- en anijszaad, derzelve étherische gedistilleerde oliën, en der kamillen met Liq. Hoffmann. en de naphtha, het bedekken en wrijven van den onderbuik met warme flanel, inwrijvingen van

van Lavendel en salmiacgeest e. d. g. komen hier te pas, voorondersteld, dat er niet reeds ontsteking van den onderbuik aanwezig is, welke dan de anti-phlogistifche behandeling vereischt, en door de vermelde middelen slechts vermeerderd zou worden. Indien echter de hardlijvigheid hardnekkig is, of er dadelijk na het gebruik van die middelen geen stoelgang volgt, dan worden ontlastende klisteren en purgeermiddelen uit wijnsteenroom, bitteraarde en rhabarber noodzakelijk aangewezen. In het vervolg schrijve men een doelmatig diët voor, verbiede alle moeilijk te verteren en winderige spijsen, prijze eene werkzame leefwijze en veel lichaamsbeweging aan, late den onderbuik, bijzonder 's morgens en 's avonds, voorzigtig wrijven, en om de werkzaamheid der digestie te vermeerderen, eenige malen daags de tinktuur van oranjeschillen of het Elixir. van Whytt. gebruiken.

§. 997.

Wanneer het Kolijk in de eerste maanden der zwangerheid zich voordoet en een gevolg der verhoogde gevoeligheid, bijzonder bij een uitstekend gevoelig lichaamsgestel, is, dan late men al die invloeden vermijden, welke de gevoeligheid in het algemeen, en de daardoor ontstane kolijkaardige, krampachtige pijnen in den onderbuik vermeerderen; de bijslaap is bijzonder schadelijk: tot inwendig gebruik dienen emulsiën met heulsap, late den onderbuik met een flanel bedekken, en met een vlug smeersel, met Sydenham's tinktuur van opium vermengd, inwrijven, en zoo deze middelen niets uitwerken,

dan

dan dienen warme stovingen met kamilbloemen en het bilzenkruid in den vorm van pappen, dergelijke klisteren en in den uitersten nood laauwe zemel- of melkbaden, wanneer zij met behoorlijke voorzigtigheid aangewend worden.



ZESDE HOOFDSTUK.

Over de gebrekkige pislozing bij Zwangeren.

§. 998.

Gebrekkige pislozing wordt bij Zwangeren zeer dikwijls waargenomen; zij verschijnt onder de gedaante van koude pis (*Stranguria*), opstopping (*Ischuria*) of onwillekeurige lozing der pis.

Strangurie en derzelyer oorzaken.

§. 999.

De Strangurie heeft, of dadelijk in het begin der zwangerheid, somtijds dadelijk na de bevruchting, of eerst tegen het einde derzelve, ten gevolge der toenemende uitzetting der baarmoeder, plaats; in het eerste geval bereikt de Strangurie slechts een' geringen trap en wordt gewoonlijk door kramp, als een gevolg dier verhoogde gevoeligheid, welke zoo dikwijls het begin der zwangerheid pleegt te kenmerken, veroorzaakt; in het laatste geval is de ziekte van meer beduidenis, en de brandende gewaarwording in de pisbuis voor de Zwangeren onverdragelijker, inzonderheid, wanneer zij den natuurlijken aandrang tot wateren niet volgen, en er alsdan eene te groote ophooping van pis in de blaas ontstaat, of wanneer het onderste segment der baarmoeder tot

eene aanhoudende drukking aanleiding geeft. Dikwerf is de brandende gewaarwording in de pisbuis een symptoma van den witten vloed, waaraan Zwangeren dikwijls plegen te lijden, of die door venerische besmetting veroorzaakt wordt.

Act. Natur. V. II. obs. 130.

PELARGUS, *medicinische Jahrgänge*, III. p. 790.

Ischurie en derzelver oorzaken.

§. 1000.

De Ischurie wordt of door dezelfde oorzaken, welke aanleiding tot Strangurie geven, te weeg gebracht, en kan dan inzonderheid secundair ontstaan, wanneer Zwangeren, om de brandende gewaarwording in de pisbuis te ontwijken, de pis opzettelijk terug houden; of men neemt dezelve waar in de tweede en derde maand der zwangerheid, als een gevolg der diep in het bekken zakkende baarmoeder, vooral bij diegenen, welke dikwijls zwanger geweest zijn, en ten gevolge eener uitzakking (*) of omkeering der baarmoeder; of zij heeft in de laatste maanden plaats, en wordt door de drukking van het hoofd op den hals der blaas veroorzaakt.

§. 1001.

De omkeering der baarmoeder is echter zeldzamer de oorzaak der Ischurie bij Zwangeren, maar veel

(*) HAGEN in SCHMUCKER *vermischten Schriften*. II. Bd. p. 222. KLEEFELD in STARK, *n. Archiv für Geburtshülfe*. I. Bd. 3e. St. p. 307. Dezelfde. II. Bd. p. 240.

veel meer het gevolg van deze, bijzonder wanneer Zwangeren in de tweede en derde maand de pis niet op den behoorlijken tijd lozen, en uit gemak, bij eene zittende, trage leefwijs, ophouden. Zoodanig eene Ischurie is dan bijzonder gevaarlijk, brengt zeer ligt wezenlijke contractiën in de baarmoeder te weeg, en veroorzaakt ontsteking der pisblaas en miskraam.

§. 1002.

De Ischurie, door de drukking van het hoofd in de laatste maanden veroorzaakt, kan ook gevaarlijk worden, zoo zij lang aanhoudt, en de blaas zich ten minste niet somwijlen ontlast, hetgeen wel verligting ten gevolge heeft, maar telkens met een' hevigen brand en eene onverdragelijke pijn vergezeld is. De kwaal bereikt een' nog hooger trap, wanneer, bij eene aanhoudende drukking van het hoofd, en volkomene pisopstopping, ontsteking en koorts daarmede gepaard gaan, en nog andere invloeden op het geheele urinstelsel werkten, hetzelfde reeds vroeger ongesteld is geweest, de Zwangere met steenen in de nieren gekweld is, en er werkelijk nierenkoek en ontsteking der pisbuis bijkwam; eene ontijdige geboorte kan hierop ook zeer ligt volgen, die zeer pijnlijk en eene groote hindernis voor de ontwikkeling van het hoofd kan worden, gedeeltelijk wegens de ontsteking der pisbuis, gedeeltelijk wegens de steenen, die zich reeds in de blaas bevinden en eenen uitweg door de pisbuis zoeken.

J. P. NORDMANN, *de Ischuria gravidarum*. Argent. 1758.

C. C. SIEBOLD's *chir. Tagebuch*. Nürnberg 1792. N°. XLV.

LXV.

Onwillekeurige pislozing en derzelve oorzaken.

§. 1003.

Bij Zwangeren heeft ook somtijds eene onwillekeurige pislozing plaats; dit is of een gevolg van de zakking der baarmoeder in de tweede maand, of veeleer der werktuigelijke drukking van het hoofd en der baarmoeder in de laatste maanden der zwangerheid: zoo lijden zwangere Vrouwen met een' zeer overhangenden buik dikwijls aan deze kwaal; of de onwillekeurige pislozing is een gevolg der al te zeer verhoogde gevoeligheid der blaas, of van eene zwakte der pispuis, bijzonder wanneer deze reeds vóór de zwangerheid plaats had. Somwijlen echter kan de onwillekeurige pislozing niet alleen, maar ook de brandende gewaarwording bij het wateren, de Strangurie en Ischurie door de veranderde hoedanigheid der pis zelve ontstaan; nogtans vindt men de pis der Zwangeren dikwijls veel lijviger, scherper en sterker van reuk en donkerder van kleur; zoude derhalve door zoodanig eene in de pisblaas afgescheidene Urin bij eene buitendien verhoogde prikkelbaarheid de geregelde afscheiding niet gestoord kunnen worden?

MAURICEAU, t. a. pl. I. p. 138.

WELSCH, *Hebammenbuch*, p. 787.

Voorzegging.

§. 1004.

Gelijk vele ziekelijke aandoeningen der spijsverteringswerktuigen moeilijk weg te nemen zijn,
even

even zoo vindt ook de Geneesheer bij de genoemde gebrekkige pislozing dikwijls vele zwarigheden, inzonderheid wanneer de oorzaak niet kan verwijderd worden: zeer dikwijls moet men zich alleen vergenoegen, om den toestand te verzachten, en eene volkomene herstelling wordt eerst na de verlossing te weeg gebragt. De Strangurie heeft voor het overige minder nadeelige gevolgen dan de Ischurie, welke met een' hevigen brand, onlijdelijke pijn en ontsteking vergezeld gaat; somtijds kan ze den dood ten gevolge hebben, en de onwillekeurige pislozing, bijzonder wanneer zij het gevolg eener hevige Ischurie, of beleediging van het orgaan zelf is, blijft volkomen ongeneeslijk.

Geneeswijze.

§. 1005.

De behandeling der gebrekkige pislozing vordert bij Zwangeren de grootste voorzigtigheid; bijzonder schadelijk zijn bij de Strangurie en Ischurie de pisafdrijvende middelen, welke het vooroordeel en het nutteloos bedrijf der Vroedvrouwen en Kwakzalvers weten aan te raden, bij voorbeeld het gebruik van eene peterfelie-soep, het sap van zee-ajuin e. d. g. Zulke middelen helpen niet alleen volstrekt niets, maar zij verergeren de kwaal nog veel meer; want waartoe dienen afdrijvende middelen bij ziekelijke aandoeningen der blaas, die de gevolgen van eene kramp of werktuigelijke drukking zijn? Zij worden geenszins weggenomen, en terwijl die middelen de afzondering der pis vermeer-

deren , brengen zij eene nog grootere uitzetting der blaas en verergering van de kwaal te weeg.

§. 1006.

Zoo deze gebrekkige pislozing slechts in eene geringe mate plaats heeft, de brandende gewaarwording niet zeer pijnlijk is, de ophouding van het water niet te lang aanhoudt, en de blaas niet zeer uitgezet is, dan is het veel raadzamer, volstrekt geene geneesmiddelen aan te wenden; doorgaans zijn de volgende gezondheidsregelen toereikend, welke iedere Zwangere behoorde na te komen, om niet door eigene schuld eene gebrekkige pislozing te veroorzaken: 1) zij gebruike geene spijsen of dranken, welke het Urinstelsel te zeer prikkelen en de pisafscheiding vermeerderen; 2) zij houde de pis nimmer te lang op, maar late dezelve loopen, zoodra zij den geringsten aandrang daartoe voelt; 3) zij vermijde het lange staan, en iedere houding en elken lichaamsarbeid, waardoor de pisblaas wordt aangedaan; 4) zij kleede zich gemakkelijk, en ontdoe zich van alle kleederen, die den onderbuik, maar inzonderheid de schaambeensstreek knellen; 5) zij drage steeds zorg voor dagelijkschen en gemakkelijken stoelgang, en vermijde alle invloeden, welke aanleiding tot verstopping geven; 6) zij vermijde alle aandoeningen en hartstogten, waarvan vele eenen bijzonder nadeeligen invloed op het Urinstelsel hebben; 7) zij oefene den bijslaap matig, of, gedurende dat zij aan de kwaal lijdt, volstrekt niet, omdat die dubbel nadeelig is; 8) zij stelle zich niet aan verkouding

ding bloot, welke, zoo als bekend is, bij Zwangeren ook ligt eene gebrekkige pislozing kan te weeg brengen.

§. 1007.

Wanneer nu de ziekelijke pislozing in eenen hevigen graad plaats heeft, dan doen de diëtetische voorschriften (§. 1006) niet altijd de gewenschte uitwerking, en men is genoodzaakt tot andere middelen zijne toevlugt te nemen; doch men kieze dezelve nimmer, vóórdat men alles naauwkeurig onderzocht hebbe, hetgeen de Schrijver niet genoeg kan aanbevelen; buitendien moet men daarin ook bijzonder omzigtig zijn, onder welke gedaante de kwaal zich voordoet, of het Strangurie, Ischurie of onwillekeurige pislozing zij, en federt hoe lang de lijderes reeds zwanger ware.

Strangurie.

§. 1008.

Bij de Strangurie, welke na de bevruchting of in de eerste maanden der zwangerheid ontstaat, en een gevolg der verhoogde gevoeligheid is, moet de Zwangere alle invloeden vermijden, die de gevoeligheid vermeerderen; bijzonder nadeelig is hier de bijslaap, gedurende en na welken de kwaal zeer dikwijls in een' hooger en graad pleegt plaats te grijpen; buitendien prijze men, wanneer zij lang duurt, het extract van bilzenkruid en het heulsap in Emulsie en slijmerige dranken, warme inwrijvingen met de olie van bilzenkruid op de schaamstreck, stovingen

uit een aftreksel van verzachtende kruiden met kamillen, bilzenkruid en lijnzaad, derzelver inspuitingen in de scheede en tot klisteren; en wanneer al deze middelen vruchteloos zijn, laauwe baden, bijzonder in melk.

§. 1009.

Indien de Strangurie in de tweede maand der zwangerheid, als een gevolg der diepere zakking der baarmoeder in de holte van het bekken, plaats heeft, dan bedaart dezelve wel tegen het einde van de derde maand, en gaat in de vierde of vijfde maand, wanneer de baarmoeder met derzelver bodem meer rijst, geheel over; opdat echter alsdan de pislozing niet gestoord worde, zoo moet men meer rust aanbevelen in het bed of op de canapé in eene horizontale ligging op zijde, men verbiede alle inspanning van het ligchaam, bijzonder in het gaan en staan, men onderhoude eenen gemakkelijken en zachten stoelgang, schrijve bij een' hevigen brand op het water de middelen (§. 1008) voor, en wanneer deze niets helpen, dan late men eene spons in olie gedoopt en met eene koord doortrokken, in de scheede brengen, om de baarmoeder daardoor te ondersteunen, en het te diep zakken derzelve te beletten; de Schrijver heeft dit middel in Junij 1809 bij eene Zwangere, die aan dit toeval leed, met een gelukkig gevolg aangewend; de Strangurie ontstaat hier niet zoo zeer door de drukking, als wel door de verplaatfing der pisblaas, welke met derzelver bodem te zeer naar beneden getrokken wordt.

§. 1010.

Wanneer de Strangurie een gevolg is van de drukking der baarmoeder op de pisblaas in de laatste maanden der zwangerheid, dan kunnen de op §. 1008 bijgebragte geneesmiddelen, zoowel in- als uitwendig aangewend, verzachting te weeg brengen; maar het beste middel is de ligging op den rug, waardoor de drukking der baarmoeder op de pisblaas verminderd wordt; en wordt op het einde der zwangerheid dit ongemak door den al te zeer overhangenden buik bijzonder bij eene sterke helling van het bekken veroorzaakt, dan moet men vooral een' doelmatigen band om het lijf aanbevelen, om hetzelfde te ondersteunen; het verstaat zich, dat de diëtetische voorschriften ook naauwkeurig opgevolgd moeten worden.

Ischurie.

§. 1011.

De Ischurie vordert eene groote oplettendheid bij de behandeling, omdat derzelver gevolgen wegens de volkomene verhindering der pislozing gevaarlijker zijn; het vooraf in het werk te stellen onderzoek wordt nog dringender vereischt, dan bij de Strangurie, en zonder dat moeten het de Heelmeesters niet wagen, dadelijk den katheter in te brengen, die de kwaal ligt verergeren kan.

§. 1012.

Wanneer de Ischurie door dezelfde oorzaken als de Strangurie te weeg gebragt is, dan vindt de-

zelfde behandeling, die aldaar is opgegeven, volkomen plaats. De aanwending van den katheter kan bij de Ischurie wel noodzakelijk zijn, opdat de blaas niet te zeer met pis gevuld worde; maar kan dikwijls gespaard worden, wanneer men op de oorzaak en derzelve uit de wegruiming acht geeft. Het allerm minst evenwel moet men den katheter inbrengen, wanneer de Ischurie het gevolg eener krampachtige aandoening is, welke men door de vruchteloze kunstbewerking slechts zoude vermeerderen.

§. 1013.

De Ischurie door eene onvolkomene uitzakking der zwangere baarmoeder veroorzaakt wordende, moet de Zwangere niet alleen alle invloeden vermijden, die dezelve nog meer bevorderen, maar zij kan ook den katheter en de hulp van een' anderen persoon volkomen misfen, wanneer zij, bij eene doelmatige houding en ligging des ligchaams, zelve de uitzakking met hare vingeren telkens terugbrengt, en daardoor de onverhinderde lozing der pis bevordert; het dragen van eenen moederring raadt de Schrijver niet aan, omdat het ligt eene miskraam bevordert en door deszelfs al te sterke drukking op nieuw Ischurie veroorzaakt; eerder prijze men het dragen eener zachte spons, zoo als in §. 1009 aangewezen werd.

§. 1014.

Wanneer eene omkeering der baarmoeder de oorzaak van de Ischurie, of de eerste door de laatste ontstaan is, dan kan de katheter in vele gevallen
niet

niet eerder ingebracht worden, vóórdát de omkeering door aangebragte hulp uit den weg geruimd of ten minste verminderd is, zoo als zulks in het Leerboek der Praktische Verloskunde (*) aangetoond wordt; evenwel wordt de katheter hier niet altijd vereischt, naardien met het uit den weg ruimen der onregelmatige ligging van de baarmoeder of vermindering der drukking de waterlozing van zelve volgt.

§. 1015.

Indien de Ischurie in de laatste maand der zwangersheid door de werktuigelijke drukking van het hoofd ontstond, dan moet de lijdere in eene horizontale rigting met een verhoogd kruis op zijde gaan leggen, en is het hoofd nog bewegelijk, dan brenge men een paar vingers in de scheede, en schuive hetzelfde voorzigtig naar boven; somtijds komt er nog iets meer van het vruchtwater onder deszelfs vlakke, en het wordt hooger terug gehouden. Wanneer dit niet helpt, en het hoofd dieper in de holte van het bekken vastzit, dan tracht men het hoofd met de vingers eenigermate naar achteren tegen de heilig- en heupbeensvereening te rigten; de Schrijver heeft waargenomen, dat in denzelfden oogenblik de pis werd ontlast; indien naderhand het ongemak weder op nieuw plaats heeft, dan moet men deze behandeling herhalen. Zijn de pogingen, om de blaas,

(*) Des Schrijvers *Lehrbuch der praktischen Entbindungskunde zu seinen Vorlesungen für Aerzte, Wundärzte und Geburtshülfer*. Tweede, vermeerderde en verbeterde uitgave. Nurnberg by Schrag 1810. §. 283.

blaas te ledigen, vruchteloos, dan is de katheter aangewezen, die in dit geval alle voorzigtigheid vereischt, om geene ontsteking en beleediging van den hals der blaas te veroorzaken (*).

§. 1016.

Wanneer de al te veel overhangende buik oorzaak der Ischurie is, het ongemak geenen al te hoogen trap bereikt heeft en het gaan niet belet wordt, dan kan de op §. 1010 aangeprezene band om het lijf hulp en verzachting toebrengen. — De Ischurie het gevolg van verkouding zijnde, is de diaphoretische methode aangewezen; met de toenemende transpiratie wordt de kwaal zoo veel te eerder verminderd, als daardoor tevens de pis niet te zeer in de blaas opgehoopt wordt.

§. 1017.

Zoo er met de Ischurie ontsteking vergezeld gaat, die bij de omkeering der baarmoeder, of de aanhoudende drukking van het hoofd gemakkelijk ontstaan kan, doch somtijds ook in de eerste en tweede maand der

(*) Bij de geboorte kan het hoofd, zoo als de Schrijver eenige malen heeft waargenomen, den hals der blaas zoo zeer drukken, dat het inbrengen van den katheter geheel onmogelijk wordt; men doet dan beter, geheel daarvan af te zien, dan geweld te gebruiken, en nadat de moedermond genoegzaam geopend is, de verlossing liever door de tang te voltooijen, of deze, wanneer er geen gevaar bij is, aan de Natuur over te laten.

der zwangerheid bij Vrouwen, die van een zeer volbloedig, prikkelbaar ligchaamsgestel zijn, en te voren zeer overvloedige maanftonden hadden, ontstaat, dan wordt de antiphlogistische behandeling aangewezen: algemeene en plaatselijke aderlatingen, bloedzuigers aan den bilnaad en aan de schaamstreek gelegd, weekmakende stovingen en klisteren, olieachtige inwrijvingen, dergelijke Emulsiën en zachte ontlastmiddelen uit tamarinde en manna doen hier eene bijzondere werking; doch zouten komen niet te pas, hoewel het salpeter nog het minste schadelijk is in slijmige afkookfels. Van eene uitnemende nuttigheid zijn hier ook de laauwe baden, bijzonder met een aftreksel van weekmakende kruiden eenige malen daags. Zoodra de ontsteking over is, dan volgt de ontlasting der pis van zelve, of de katheter zal nu zonder nadeel kunnen aangewend worden, wel te verstaan, wanneer de overige mechanische beletfelen uit den weg genomen zijn.

§. 1018.

Wanneer de steen oorzaak der Ischurie is, en zich nog in de pisblaas ophoudt, dan wende men, wanneer geene ontsteking of kramp zulks in den weg zijn, den katheter aan, en men moet telkens den steen zoo lang terug drukken, totdat de pis geloosd is. Wanneer men echter bevindt, dat de steen klein en in de pisbuis is, waarin hij somtijds op het einde der laatste maand, wanneer het hoofd dieper in het bekken zakt, of ten tijde der geboorte gedrukt wordt, dan kan men denzelven er uittrekken, omdat de korte vrouwelijke pisbuis
gee-

geene beduidende hindernis te weeg brengt. Tot dat einde brenge men eenen vinger der linkerhand en met de regterhand eene kleine tang in de scheede, vatte den steen, terwijl men dien door eene drukking in deze naar voren brengt, met het instrument aan, en trekke hem er uit (*). Indien echter de pisbuis ontstoken en pijnlijk mogt zijn, en den steen te zeer mogt influiten, dan moet men te voren de ontsteking wegnemen, waartoe zich inzonderheid weekmakende stovingen over de teeldeelen en dampbaden met eene spons aangewend aanbevelen.

Onwillekeurige pislozing.

§. 1019.

De onwillekeurige pislozing, die van de drukking der baarmoeder en van het hoofd afhangt, wordt zelden in de zwangerheid geheel weggenomen, en verdwijnt meestal slechts volkomen na de geboorte; de Geneesheer kan ten hoogste de kwaal verligten en dragende maken. Men bevele rust en eene doelmatige ligging aan; de Zwangere moet naauwe kleederen, het rijgen, het veel staan en allen zwaren arbeid bijzonder in die stelling vermijden; zij moet meer horizontaal, nu eens op de eene, dan weder op de andere zijde liggen, om de

te

(*) De overledene Geheimraad STARK te *Jena* heeft bij eene Zwangere dit geval waargenomen en vóór de verlossing op dezelfde wijs den steen uit de pisbuis genomen.

te fterke drukking der baarmoeder op de blaas tegen te gaan, en bij eenen overhangenden buik een' band om het lijf dragen. Het middel, om het te zeer drukkende hoofd met de vingers in de hoogte te fchuiven, helpt bij de onwillekeurige pislozing doorgaans niets, want het neemt dáár, wanneer het zich ook van zijne ligging liet bewegen, dadelijk als de vingers weggenomen zijn, de vorige plaats weder in, en verdere kracht aan te wenden, is deels onmogelijk, deels gevaarlijk.

§. 1020.

Indien de onwillekeurige pislozing door al te verhoogde gevoeligheid der blaas veroorzaakt, en deze bij andere symptomata aan dezelfde oorzaak herkend wordt, dan is een aftreksel van kamillen met melissen, eene emulsie met het heulfap, de Thebaïsche tinctuur met den zoeten falpetergeest, de kamfer, krampwerende inwrijvingen in de fchaamstreek en dergelijke klisteren aan te bevelen; bovendien moet de Zwangere alle fchadelijke invloeden, inzonderheid den bijflaap, welke de gevoeligheid te zeer verhoogen, vermijden, en eene zekere keus in het gebruik van fpijs en drank in acht nemen.

§. 1021.

Wanneer zwakte of eene verlamming van den hals der blaas, en inzonderheid van derzelver fluitspier, de oorzaak van de kwaal is, waarbij deze zulk eenen hoogen graad kan bereikt hebben, dat reeds, niet alleen wanneer de blaas eene toereikende hoeveelheid pis bevat, maar bij de geringfte beweging, en bij-

bijzonder bij het niezen of hoesten, de pis onwillekeurig ontloopt, dan moet de Geneesheer voorzigtig zijn in de keus der middelen, welke de regelmatige werkzaamheid van dit orgaan herstellen; zeer ligt kunnen zij ontsteking, bloedvloeijing en miskraam in de zwangerheid na zich slepen. Men late de schaamstreek en den bilnaad met wijn, wijngeest of een ander geestrijk middel, bij voorbeeld met lavendelgeest, waschen, dezelve met een afkooksel van kinabast en aromatische kruiden stoven, en schrijve dergelijke klisteren en inspuitingen in de scheede, alsmede voetbaden voor; tot inwendig gebruik echter kan men hier ook een aftreksel van arnica en slangenwortel, den kamfer in eene emulsie, en het middel van VOGEL, bestaande uit acid. muriat. rob. junip. en een aftreksel van peterfelie aanbevelen.

§. 1022.

Zoo als echter reeds gezegd is, zijn de pogingen van den Geneesheer, om de kwaal gedurende de zwangerheid volkomen weg te nemen, dikwijls vruchteloos, en toch verlangt de Zwangere van dit lastig ongemak bevrijd te zijn, bijzonder omdat bij langen duur jeuking en hette aan de schaamdeelen ontstaan, en deze ontveld worden; men bevele dan reinheid aan, bijzonder het dikwerf waschen met koud water, en late eene spons of eene blaas, met eene spons gevuld, in de scheede brengen, om eene zachte drukking op den hals der blaas te weeg te brengen. Moederringen zijn nadeelig, omdat zij te zeer drukken. Wanneer dit ook niet helpt, blijft er niets anders overig, dan eene spons of eenige compresen
aan

aan de uitwendige teeldeelen door middel van een Tverband vast te maken, doch het verband dikwijls te verwisfelen. Met de zoogenaamde pisgaarders vindt men zwarigheden in de praktijk, omdat de Vrouwen daarmede niet best kunnen omgaan. De- zelfde palliative behandeling wordt ook bij die onwillekeurige pislozing, welke het gevolg is van eene belediging der blaas (*) of eener pislistel, vereischt.

§. 1023.

Wanneer voor het overige de Geneesheer grondig overtuigd is, dat de ziekelijke aandoeningen van het pislstelsel door de veranderde hoedanigheid der pis zelve te weeg gebragt worden, dan zou voornamelijk bij de waarneming der meerdere dikte, van den fcherperen en fterkeren reuk en van de donkerder kleur der pis, een geregeld diët het meest tot wegneming of vermindering van die ziekelijke aandoeningen toebrengen; het fpreekt van zelf, dat hier bijzonder op de vermindering van zulke fpijzen en dranken moet gelet worden, welke eenen beflissenden invloed op de assimilatie, verhoogde levenskracht van het bloed en op de affcheiding der pis hebben.

(*) Mijn broeder zond vóór eenige jaren eene Vrouw van het platte land met eene onwillekeurige pislozing naar mij toe, om dezelve te onderzoeken. Ik bevond, dat de hals der blaas, ten gevolge eener verkeerde behandeling, bij de geboorte geheel in tweeën gefcheurd was, en kon den vinger door den voorften wand der fcheede onmiddellijk in de blaas zelve gemakkelijk inbrengen.



ZEVENDE HOOFDSTUK.

Over het Zuchtgezwel der Zwangeren.

§. 1024.

Een der meest plaatshebbende gezwellen, waaraan Zwangeren onderhevig zijn, is het Zuchtgezwel (*oedema*). Het is verschillend ten aanzien der deelen, waaraan het zich vertoont; het menigvuldigste worden de onderste extremiteiten, beide of slechts eene der buitenste schaamlippen, zeldzamer de onderbuik, het aangezigt en de bovenste extremiteiten daardoor aangetast; in een zeer zeldzaam geval zag men het over het geheele ligchaam verspreid.

Verschijselen.

§. 1025.

Het Zuchtgezwel heeft gewoonlijk in de laatste twee of drie maanden der zwangerheid plaats, en is meestal niet pijnlijk, wit, koud, somtijds doorschijnende, glanzig, week en wijkt voor de drukking van den vinger; het is weinig beduidend, of bereikt eenen hevigen graad en veroorzaakt alsdan bij Zwangeren een groot ongemak, bijzonder wanneer het ver over de schaamlippen uitgebreid is; het is hinderlijk in het liggen, gaan en staan; somwijlen heeft men het zoo erg gezien, dat de Vrouwen zich volstrekt niet bewegen konden.

Oorzaken.

§. 1026.

De naaste oorzaak is eene ophooping van water of weiachtig vocht in het celwijsweeffel. Zwangeren, die tot waterzucht overhellen, en een zwak kliergeftel hebben, die aan koortfen, inzonderheid tufchenpoozende koortfen, aan diarrhëen en belette uitwafeming lijden, welke dikwijls purgeermiddelen gebruiken, en veel bloed door aderlatingen of op eene andere wijze verliezen, die een wijd bekken hebben, eene zittende onwerkzame leefwijze leiden, of dikwijls zwaren arbeid ftaande, bijzonder op koude fteenen, verrigten, en in eene koude en vochtige woning of lucht zich gedurig ophouden (*), zijn voornamelijk aan het Zuchtgezwel blootgefteld. Bij deze geneigdheid kunnen de drukking der zwangere baarmoeder op de buitendien verzwakte watervaten, inzonderheid bij eene grootere uitzetting der baarmoeder

(*) Zoo nam de Schrijver het Zuchtgezwel waar, dat in eenen hoogen graad zich over de dijën en fchaamlippen uitgestrekt had, en waarmede ten laafte buikwaterzucht (*ascites*) gepaard ging, bij eene zwangere Vrouw van twintig jaren oud, welke bij eene voorafgegane geneigdheid, door ftoringen der maanfonden en verkouding, door eene zittende en onwerkzame leefwijze, en woning in eene koude en vochtige, digt aan de rivier *de Main* gelegene kamer veroorzaakt werd; zij werd ontijdig verlost en baarde tweelingen. Deze waarneming vindt men beschreven in des Schrijvers *Annalen der klinifchen Schule an der Entbindungsanstalt zu Würzburg. Leipzig 1806. S. 105.*

der door eenen zeer grooten foetus, door tweelingen, of eene uitermate groote hoeveelheid van vruchtwater, de drukking van een sterk verbeend hoofd, aanhoudende hardlijvigheid, belette afzondering van pis en plotselinge verkouding na voorafgegane verhitting en sterk zweeten, het ontstaan van het Zuchtgezwel des te eerder begunstigen.

§. 1027.

Het Zuchtgezwel der schaamlippen is somtijds een symptoma van den scirrhus aan het scheededeel, of van eene verborgene verzwering of van een gezwel, bij voorbeeld van een vetgezwel in het bekken, of in de scheede, welke tevens de zwangerheid vergezellen; dat der bovenste extremiteiten is meestentijds een teeken der met de zwangerheid verbondene hart- of borst-waterzucht (*), en wanneer het zich voornamelijk over de schaambeenderen uitbreidde, en een groot gedeelte der onderbuikstreek innam, dan was het den Schrijver altijd een onfeilbaar symptoma van eenen druifklomp (*hydrometra hydatica*).

Voorzegging.

§. 1028.

Het Zuchtgezwel is niet altijd van beduidenis, inzonderheid wanneer het zich niet tot de dijen uitstrekt; maar bij dat der onderste extremiteiten gaat somtijds eene roosachtige ontsteking gepaard, welke bijzonder bij eene verkeerde behandeling gemakkelijk in

(*) De Schrijver heeft dit tweemaal waargenomen en zich nooit in de diagnosis vergist.

in kwaadaardige zweren overgaat, die, ten minste volgens de waarneming van den Schrijver, eerst na de verlossing volkomen kunnen genezen worden. — Het Zuchtgezwel der schaamlippen is, zoo als reeds is aangemerkt, niet alleen zeer lastig voor de Zwangeren, maar het verhindert en vertraagt ook naderhand de geboorte. — Met spanning, ontsteking en koorts met groote hitte gepaard gaande, wordt het, indien het zich tot de liezen, de lendenen en den buik uitstrekt, bedenkelijk, en kan zelfs gevaarlijk voor het leven van het Kind worden. — Beduidend is het gezwel der onderste extremiteiten en schaamlippen, hetwelk een gevolg is van scirrhus aan den moedermond, van een gezwel of van eene verborgene verzwering in het bekken. — Het Zuchtgezwel der bovenste extremiteiten is gevaarlijk, wanneer het een symptoma der met de zwangerheid verbondene Borstwaterzucht is; terwijl dat Zuchtgezwel, hetwelk blootelijk door de drukking der zwangere baarmoeder of van het hoofd veroorzaakt wordt, van weinig beduidenis is. Voor het overige wordt hetzelfde gedurende de zwangerheid dikwijls door geneesmiddelen niet weggenomen, en het gaat na de geboorte onder het beloop van het kraambed van zelf over; ja zelfs de daarmede verbondene Buikwaterzucht (*ascites*) werd genezen, en besliste zich spoedig door menigvuldige waterachtige, zeer overvloedige diarrhéen (*).

Ge

(*) Men zie onder anderen het beloop van het kraambed der zoo even aangehaalde waarneming in des Schrijvers *Annalen*, bl. 121, enz.

Geneeswijze.

§. 1029.

De geneeswijze vordert vooral, dat men op die invloeden, welke tot het ontstaan van het Zuchtgezwel gunstig zijn, oplettend zij, en dezelve zoo veel mogelijk verwijderen. Bestaat de oorzaak derhalve in de drukking van een' hangenden buik, van eene scheeve ligging of groote uitzetting der baarmoeder, dan late men in het eerste geval eenen band om het lijf dragen, en eene meer horizontale rustige ligging in acht nemen; de ligging op zijde is bij eene scheef liggende baarmoeder aan te bevelen, en bestaat de oorzaak in eene verbazende uitzetting, dan trachte men de bekleedfelen door de in §. 952 aanbevolene middelen leniger te maken.

§. 1030.

Bij hardlijvigheid trachte men door klisteren open lijf te houden, en alle schadelijkheden uit den weg te ruimen, wat voedsel aan dezelve zou kunnen verschaffen; doch wanneer die middelen niet toereikend zijn, dan schrijve men een ontlastmiddel uit tinctuur van rhabarber met een aromatisch aftreksel of cremor tartari met bitteraarde voor; het laatste mengfel doet zoo veel te meer werking, omdat door de cremor tartari de pisafscheiding vermeerderd wordt, en alsdan het Zuchtgezwel afneemt. —

§. 1031.

Indien de oorzaak in eene verhinderde afzondering der pis bestaat, die aan eene onwerkzaamheid
der

der nieren kan toegeschreven worden, dan geve men diuretica: eene thee uit bacc. juniperi, een infusum radicis juniperi, het sal tartari met het acet. squillit., de squilla met kamfer, het voorschrift van VOGEL (§. 1021), de digitalis in poeder of als tinctuur verdienen hier eene plaats, wanneer zij met omzigtigheid en eene gepaste keuze aangewend worden. Men kan dezelfde middelen ook alsdan toedienen, wanneer de aanleidende oorzaak in eene onwerkzaamheid van het watervaatstelsel, of in Borstwaterzucht ligt; doch deze wordt in de zwangerheid nooit geheel en al weggenomen, en zelfs na de verlossing neemt zij somtijds spoedig in een' hoogen graad toe, en verhaast den dood. — Indien het Zuchtgezwel door verkouding in het algemeen, en daardoor belette uitwaseming, veroorzaakt is, dan moet men vooral op de woning letten; is deze vochtig of koud, dan moet de Zwangere dezelve met eene andere droogere, warmere en gezondere verwisfelen; buitendien prijze men een' diaphoretischen leefregel en daarmede overeenkomstige geneesmiddelen aan.

§. 1032.

In de reeds bijgebragte gevallen kan men ook van uitwendige middelen gebruik maken; daartoe behooren: het wrijven der extremiteiten met een over geglommen kolen gewarmd flenel; nog meer werking doet het, wanneer men over de kolen jeneverbesfen, suiker of mastik strooit; de voet wordt naderhand, om eene gedurige transpiratie te onderhouden, met flenel bedekt, en eene horizontale lig-

ging aanbevolen; de bedekking met gewaste taf, met elzenbladeren, of matrassen, die met welriekende kruiden en kamfer gevuld worden; de inwrijvingen van geestrijke middelen en smeerfels; de wijngeest, de kamfergeest, en wel inzonderheid het linimentum diureticum (*) van KIESER; wanneer men er gebruik van maakt, moet men het voorzigtig inwikkelen, inzonderheid bij volbloedige, prikkelbare gestellen, het doet nog den besten dienst, wanneer het gezwel begint af te nemen; in plaats van dit, kan men zich ook van rijgkousen bedienen.

§. 1033.

Vindt men het Zuchtgezwel der schaamlippen alleen, of is het met dat der dijen vergezeld, dan zijn, volgens des Schrijvers waarnemingen, drooge stovingen, met welriekende kruiden, die dikwijls verwarmd en met kamfer spiritus natgemaakt worden, de werkzaamste; ook wordt bij eene aanmerkelijke zwelling en spanning de inwrijving der vlugtige kamferzalf of met het linimentum van KIESER aangeprezen, en alleen dan, wanneer het gezwel eene brandende pijn veroorzaakt en dreigt door te breken, make men eenige insnijdingen aan den binnenkant der schaamlippen, opdat het vocht er kan uitvloeijen; daarna vare men met de kruidezakjes voort, of late het gezwel met Goulardswater en met kamferspiritus waschen en stoven.

§. 1034.

(*) HUFELAND'S en HIMLY'S *Journal der praktischen Arzneykunde*, 1810. 3e. St. Maart. bl. 92; en *Asklæpeion*, N^o. 51, pag. 816. Het voornaamste bestanddeel is de terpentijnolie.

§. 1034.

Wanneer het Zuchtgezwel het gevolg is eener verborgene ziekte, of afwijking in het bekken, bij voorbeeld van een vleesch- of vetgezwel der baarmoeder, dan helpen al de genoemde in- en uitwendige middelen niets; buitendien herkent men deze en dergelijke oorzaken (§. 1027) gewoonlijk eerst na de verlossing, en wanneer men dezelve ook vroeger ontdekt, dan is er meestal in de zwangerheid niet veel aan te doen; alles, wat men bij den scirrhus der baarmoeder konde aanwenden, is het voorzigtige inwendig gebruik der belladonna en van den calomel, en uitwendig eene spons, welke in een aftreksel van cicuta gedoopt wordt, in de scheede gebragt. Doch wanneer eene verzwering of een verborgen abces in de scheede de oorzaak is, dan moet men derzelfver ontlasting naar buiten trachten te bevorderen.

§. 1035.

Het Zuchtgezwel der onderste extremiteiten wordt dikwijls, zoo als in §. 1028 aangemerkt is, vergezeld van eene roosachtige ontsteking, voornamelijk wanneer de Zwangere reeds te voren eene geneigdheid daartoe had. Men brenge dan dadelijk eene doelmatige hulp aan, inzonderheid daar deze ontsteking bij veronachtzaamde of ondoelmatige aanwending van geneesmiddelen ligt tot koudvuur en kwaadaardige zweren overgaat. Men moet derhalve dadelijk rust in het bed aanbevelen, horizontale ligging van den voet, en matrassen uit kamilbloemen met boonen-

meel, of zemelen met zout, of kamfer, en late zweetdrijvende middelen gebruiken, bijzonder ingeval door spoedige verkouding, en door natte koude tot ontsteking aanleiding gegeven wordt. Indien echter eene ophooping van gal en drekstoffen er oorzaak van is, dan begrijpt men, dat ook daarop bij de behandeling bijzonder dient gelet te worden. Ingeval nu de ontsteking niet meer verdeeld kan worden en tot koudvuur dreigt over te gaan, dan prijze men de stovingen uit loodwater en kamfer-spiritus aan, en wanneer het koudvuur reeds werkelijk plaats heeft, scarificatiën met de genoemde stovingen en dergelijke middelen, welke het koudvuur tegengaan en de regelmatige reproductie van het aangedane deel opbeuren.

L I T T E R A T U U R.

§. 1036.

JOERDENS, *praes.* SCHMIEDEL, *de tumoribus a graviditate.*
Erlang. 1757.

HENKEL, *Samml. med. und chir. Anmerkungen* III. n. 8.

LÜTZELBERGER, *de quibusdam gravidarum symptomatibus praecipue de varicibus et oedemate pedum.* Jen. 1791.



A C H T S T E H O O F D S T U K.

Over de Ziekten der Huid.

§. 1037.

Zwangeren lijden fomtijds aan de Geelzucht en aan Levervlekken, waardoor de geregelde verrigting van het orgaan der huid gestoord wordt; beide ziekelijke aandoeningen neemt men of alleen in twee zekere maanden der zwangerheid, voornamelijk in de laatste, waar; of duren bijna de gansche zwangerheid voort, en storen de werking der huid van het aangezicht, zoowel als die van het gansche ligchaam, in eene meerdere of mindere mate.

Oorzaken.

§. 1038.

De Geelzucht zoowel als de Levervlekken zijn eigenlijk geene oorspronkelijke ziekten der Huid, maar verschijnselen, welke in eene belette verrigting der lever haren naasten grond hebben. De verrigting van dit orgaan, de bereiding der gal, heeft, gelijk bekend is, eenen beslissenden invloed op de spijsvertering, en bijgevolg ook op de geheele reproductie der Vrouw, en op derzelver eene pool van het orgaan der Huid; want 1) is de lever een afscheidingsorgaan, en als zoodanig bereidt zij eene bepaalde stof, die zich met de chym vermengt en daar-

daardoor de mogelijkheid eener volkomene assimilatie oneindig bevordert; 2) een zuiveringsorgaan, omdat derzelver verrigting is, zekere stoffen van het bloed af te scheiden, welke tot de reproductie en onderhouding van verscheidene organen niet geschikt zijn, maar dezelyen over het algemeen hinderen en tegenwerken.

§. 1039.

De genoemde ziekelijke aandoeningen der huid: Geelzucht en Levervlekken, kunnen gemakkelijk door eene gestoorde verrigting der Lever in de zwangrheid veroorzaakt worden, bijzonder wanneer de afzondering van zekere stoffen belet wordt; want zoodra dit plaats heeft, gaat of de reeds bereide galstof of de gal zelve in het bloed over, en de icterische verschijnselen worden zichtbaar; ja de bruinere of donkerder kleur der huid, welke men zoo menigmaal bij Zwangeren waarneemt en die eerst na de geboorte volkomen verdwijnt, zoodat vele Vrouwen, wanneer zij het kraambed verlaten, doodsbлек zijn, berust in niets anders, dan in eene belette verrigting der lever.

§. 1040.

Vraagt men, door welke invloeden de genoemde icterische verschijnselen: Geelzucht en Levervlekken, veroorzaakt worden? Men is geneigd, om dezelyen aan de drukking der zwangere baarmoeder, inzonderheid op de holle oppervlakte der lever, toe te schrijven; maar hoe dikwijls ondergaat dit orgaan zelfs bij buitengewone uitzettingen der baarmoeder, door
veel

veel vruchtwater, tweelingen enz. te weeg gebragt, eene buitengemeene drukking, en desnoettemin worden de genoemde icterifche verschijnselen niet waargenomen! Volgens de waarnemingen van den Schrijver zijn alleen Zwangeren met een galachtig ligchaamsgeftel, bij wie veel bereide galstof in de lever bevat is, en diegenen, bij wie de lever reeds te voren een' ziekelijken aanleg had, en die aan galsteen, aanvankelijke verharding der lever e. d. g. lijden, inzonderheid tot die icterifche verschijnselen geneigd; op een zoodanig voorbeschikt, of reeds ziekelijk orgaan kan wel de drukking der baarmoeder nadeelig werken, en deszelfs verrigting in eenen meerderen of minderen graad storen. Voor het overige heeft de Schrijver wel degelijk ondervonden, dat die icterifche verschijnselen, de bruine, gele kleur der huid, de volkomen gevormde Geelzucht zelve, en de zoogenaamde Levervlekken veel meer waargenomen worden bij ongehuwde Zwangeren, die, inzonderheid bij haren dikwerf zoo treurigen toestand, aan menigvuldige ergernis, verdriet, kommer en gramfchap (*) blootgesteld zijn, waardoor de verrigting

(*) Uit velen kiest de Schrijver slechts de volgende zeer belangrijke waarneming, welke, hoewel reeds op eene andere plaats gemeld, ook hier verdient genoemd te worden, en tevens de waarde der zielkundige geneeswijfs doet kennen. Eene ongehuwde zwangere Vrouw kreeg de geelzucht; zij zag er zeer mager en vervallen uit, en de huid van haar ligchaam, benevens de conjunctiva der beide oogen, had de kleur eener citroen; verscheidene weken had hare genezing reeds geduurd en de

ting der lever gestoord wordt. Ziekteverschijnselen van dien aard schijnen door eene krampachtige zamentrekking in de afscheidende vaten der lever veroorzaakt te worden; daardoor wordt de stof, welke zij bereidt en die bij een galachtig gestel buitendien in eene groote menigte afgescheiden wordt, verhinderd, om in de galblaas over te gaan; door deze terughouding der galstof in het bloed, en het teruggaan der gal zelve uit de galblaas, worden van tijd tot tijd icterische ziekteverschijnselen, Levervlekken of Geelzucht te weeg gebragt.

§. 1041.

De Geelzucht der Zwangeren kan ook somtijds het gevolg of een symptoma der leverontsteking (*hepatitis*) zijn, wanneer namelijk invloeden plotseling

de geelzucht verminderde niet; de zieke werd steeds ellendiger; reeds was alle hoop, om haar in hare zwangersheid te genezen, opgegeven, en meende men in dezelve, in de drukking der zwangere baarmoeder op de lever, de voornaamste hindernis te moeten zoeken. Haar op eenen morgen, als naar gewoonte, bezoekende, bevond de zieke zich zeer opgeruimd en de geelzucht tot groote verbazing bijna verdwenen; de geneesmiddelen alleen hadden deze zoo onverwachte gelukkige omwending niet te weeg gebragt; haar minnaar, de Vader des Kinds, die haar verlaten had, was teruggekomen, verzekerde haar op nieuw van zijne liefde en beloofde haar te trouwen; dit onverwacht, aangenaam voorval had haar binnen weinige dagen volkomen van de geelzucht genezen; zij had eenige weken naderhand eene voorspoedige verlossing, en genas volkomen.

ling werken , fchielijke zamentrekking in de afcheidende vaten te weeg brengen , en in ftaat zijn , om de afzondering der gal fpoedig te onderdrukken en te verhinderen ; daartoe moeten bijzonder , bij den aanleg tot het opgegeven galachtig geftel , plotfelijk ontftane gramfchap en fnelwerkende koude of verkoeling na eene langdurige hitte of voorafgegane verhitting gerekend worden. Ook zou een hevige ftoot of val op die plaats de ontfteking der lever en de daaruit volgende Geelzucht kunnen veroorzaken. Dat echter alle Geelzucht in de zwangerheid tevens eene ontfteking der lever zou zijn , daarvan is de Schrijver niet overtuigd.

§. 1042.

Zoude ook de opftopping der maanftonden tot het ontftaan der gele of bruine kleur of der Levervlekken bij Zwangeren fomwijlen geen bijzonder aandeel hebben , vooral wanneer die voorheen altijd zeer overvloedig en met een' fterken reuk vergezeld waren , hetgeen des te waarfchijnlijker is , daar door deze affcheiding zekere vreemde ftoffen uit het ligchaam afgezonderd worden , welke nu bij de plaatshebbende zwangerheid in het bloed terug gehouden worden ? De Schrijver heeft bij eene voor de eerftemaal zwangere Vrouw eens de merkwaardige waarneming gedaan , dat zij gedurende hare geheele zwangerheid , vooral des nachts , zeer fterk zweette , waardoor het hemd gekleurd was , terwijl dit zweeten eerst na de verlosfing ophield , toen de kraamzuivering en de zogaffcheiding plaats hadden ; de Zwangere was buitendien volkomen gezond , en er was anders

gee-

geene oorzaak te ontdekken, waardoor dat zweeten werd te weeg gebragt.

§. 1043.

Op het einde van de laatste maand der zwangersheid, weinige dagen slechts vóór de verlosfing, plegen Zwangeren buitengewoon bruin in het aangezicht te worden, of dit fchijnt veeleer doorgaans met eene morfig bruine kleur bedekt te zijn; elk, die de Verloskunde uitoefent, zal deze waarneming reeds dikwijls gedaan hebben, en voor oude Moeders en Vroedvrouwen is het gewoonlijk een teeken van eene kort op handen zijnde verlosfing; men wordt er inderdaad zelden door bedrogen, zoo als de Schrijver nog kortelings weder heeft waargenomen, en het fchijnt hem een gevolg te zijn der plaats grijpende contractie, welke nu op de voorheen zoo zichtbare uitzetting volgde, en die zich ook in de gezigtspieren te kennen geeft, weshalve ook de physionomie eener Zwangere verfcheidene dagen vóór de geboorte geheel verandert, en het aangezicht mager en ingevallen fchijnt; daarbij komt nog de beangftiging en beklemming der borst, die een gevolg van dezelfde contractie is, welke ook in de affcheidende vaten der lever omtrent dezen tijd ontftaat, en bij bruine, tot toorn geneigde Vrouwen, alsmede bij die, welke een galachtig geftel hebben, door die morfig bruine kleur der huid bijzonder in het aangezicht kenbaar is, omdat eenigen tijd de overgang der door de lever bereide ftof in de galblaas gehinderd wordt. Of zoude die gele, bruine kleur, welke ook om dezen tijd het bindvlies van het oog een mor-

morsig dof aanzien geeft, dáárdoor ontstaan, dat met de, gewoonlijk op het einde der laatste maand plaatshebbende, contractie en zakking der zwangere baarmoeder de voorheen ongewone drukking op de galblaas ophoudt, en op éénmaal eene te groote menigte gal uitgestort wordt, welke zich met de spijsbrij vermengt?

Voorzegging.

§. 1044.

De Levervlekken der Zwangeren zijn wel niet gevaarlijk, maar in de zwangerheid moeilijk weg te nemen, en verdwijnen gewoonlijk niet eerder, dan na de verlossing. Hetzelfde geldt ook wel van de Geelzucht, doch die, welke een symptoma der leverontsteking is, kan belangrijker gevolgen hebben, bijzonder wanneer derzelver naaste oorzaak miskend wordt, en er eene verkeerde behandeling plaats heeft; ligt kan daardoor tot verhardingen, verzweeringen en vergroeiingen der lever de grond gelegd worden. De Geelzucht, die door galfteenen ontstaat, kan bij hevige pijnen, kramp en koorts ligt eene ontijdige geboorte bevorderen.

Geneeswijze.

§. 1045.

Voor de Levervlekken is er even zoo weinig baat, als het gebruiken van geneesmiddelen tegen de morsige bruine kleur der huid, en er laat zich van de uitwendige aanwending met het aanbevolen waschwatter, inzonderheid van de oplossing van den loodkalk, des te minder de gewenschte uitwerking verwachten, naarmate de Levervlekken op geen idiopathisch lijden van het orgaan der huid berusten, en ge-

woonlijk flechts in eene gestoorde verrigting der lever gegrond zijn, welke eerst na de verlossing uit den weg geruimd wordt.

§. 1046.

De ontwikkelde Geelzucht verdient veeleer de opmerkzaamheid van den Geneesheer. Men lette vooral dáárop, of zij een symptoma der leverontstekening is, en of zulke invloeden, bij voorbeeld plotselinge verkouding na voorafgegane verhitting, van te voren plaats hadden, waardoor die voortgebracht werd; wanneer daarmede eene aanhoudende koorts vergezeld gaat, de Zwangere over eene vaste, stekende pijn, bijzonder in het regter hypochondrium, klaagt, op deze plaats ook geheel bijzonder de drukking der buitengemeen uitgezette baarmoeder werkt, de pols vol, sterk, de dorst hevig, het aanzigt, en bijzonder de regterwang zeer heet en rood is, het ademen pijnlijk en telkens met eenen steek in het regter hypochondrium gepaard gaat, dan is eene aderlating dringend aangewezen; daarbij vereenige men, wanneer de buitenste bolle oppervlakte van de lever aangedaan is, weekmakende pappen, dergelijke klisteren en laauwe baden; maar tot inwendig gebruik schrijve men, na behoorlijk gedane aderlating, het zoete kwik voor, dat, met behoorlijke voorzigtigheid aangewend, in de zwangerheid doorgaans niet nadeelig is, het minste nogtans in ontstekingsziekten; de Schrijver heeft dit tot honderd twintig greinen van tijd tot tijd gegeven, en noch kwijling noch vermeerderden stoelgang waargenomen; dit middel, als ook de mercurius in het algemeen, wordt ook tegen de chronische leverontstekening aanbevolen, die men bij Zwangeren dikwijls

wijls waarneemt; men kan tevens de kwikzalf in de leverstreek laten inwrijven.

§. 1047.

Wanneer men de Geelzucht bij een buitengemeen galachtig gestel waarneemt, en er symptomen eener aangedane, mischien aan de eene of andere plaats reeds verharde, lever aanwezig zijn, dan worden de zoogenaamde oplosfende extracten van saponaria, taraxacum, chelidonium, radix graminis, de zeep en de loogzouten met laauwe baden en weekmakende stovingen aanbevolen.

§. 1048.

Indien gemoedsaandoeningen, zoo als heimelijke ergernis, kommer, gramschap, gekrenkte, te leur gestelde liefde e. d. g. aandeel daaraan hebben, dan is de Geelzucht, zoo als de in de aantekening op §. 1040 medegedeelde waarneming bewijst, in de zwangerheid moeilijk weg te nemen, bijaldien de Zwangere niet in eene andere gemoedsstemming gebragt wordt; men trachte haar derhalve opgeruimd te maken en verstrooijing te verschaffen, en wanneer het mogelijk zijn kan, den wensch van haar hart te bevredigen; buitendien, daar in dit geval, inzonderheid bij aandoenlijke, zwakke gestellen, de Geelzucht door eene krampachtige aandoening in de afscheidende vaten veroorzaakt wordt, zijn krampstillende geneesmiddelen, het opium, de hyoscyamus en de belladonna, zoowel uit- als inwendig, aangewezen.

§. 1049.

Voor het overige kan hier niet verder over de genezing der Geelzucht gesproken worden, als elders te huis behoorende; echter kan het niet on-

doelmatig geacht worden, ten slotte nog van eenige gezondheidsregelen te gewagen, waarmede Zwangeren tegen de Levervlekken zoowel als tegen de Geelzucht zich kunnen hoeden; deze zijn: dagelijks veel beweging en eene werkzame leefwijze, vrolijke gemoedsstemming, eene zuivere en gezonde lucht, het vermijden van alle tette meel- en vette vleeschspijzen, en bij eene geneigdheid daartoe, liever het gebruik van plantgewassen, inzonderheid wortelen, zuring, kervel, kers, het vermijden van versch dik bier, in plaats van dit prijze men liever zuiver water, karnemelk, Seltzer of Fachinger water aan; eindelijk het vermijden der te hevige drukking van kleederen en te vast rijgen van den onderbuik, van menigvuldig hartzeer en verdriet, van menigvuldige verkouding, bijzonder na verhittingen en indigestiën, onderhouding der pislozing, van den stoelgang en inzonderheid ook van het orgaan der huid; tot dat einde rade men ook dikwijls de huid te waschen, inzonderheid met Eau de Cologne, Eau de Lavande, met wijngeest e. d. g. waarbij men ook op het vlijtig wrijven der huid letten moet.

L I T T E R A T U U R.

§. 1050.

Act. nat. cur. IV. obs. 93. VII. obs. 50.

J. JUNCKER, *de utero gravidarum circumspecte tractando.*
Hal. 1747.

A. F. LÖFFLER, *über die Leberentzündung der Schwangeren und Wöchnerinnen, in STARK'S neuem Archiv.* II. Bd.
1e. St. N^o. 7.

H A N D B O E K
O V E R D E
K E N N I S E N G E N E Z I N G
D E R
Z I E K T E N
V A N H E T
V R O U W E L I J K E G E S L A C H T ;

D O O R
E. V O N S I E B O L D,
Consulterenden Arts en Hoogleeraar te Berlijn.

Uit het Hoogduitsch,
naar de *tweede vermeerderde en verbeterde* Uitgave,
door

J. J. G A A S W I J C K,
Praktizerenden Arts te Amsterdam.

TWEEDE DEELS VIERDE STUK.



TE AMSTERDAM, BIJ
C. L. S C H L E I J E R.

1 8 2 3.

I N H O U D.

T W E E D E A F D E E L I N G.

OVER DE ZIEKTEN VAN HET IRRITABELE STELSEL.

E E R S T E H O O F D S T U K.

	Bladz.
OVER DE ADERSPATTEN DER ZWANGEREN.	369.
VERSCHIJSSELEN.	ald.
OORZAKEN.	371.
VOORZEGGING.	373.
GENEESWIJZE.	374.
LITTERATUUR.	384.

T W E E D E H O O F D S T U K.

OVER DE BLOEDVLOEIJINGEN DER ZWANG- REN, BEHALVE UIT DE TEELDEELEN.	385.
OORZAKEN.	ald.
VOORZEGGING.	387.
GENEESWIJZE.	389.

D E R D E H O O F D S T U K.

OVER HET HOESTEN EN DE AAMBORSTIGHEID (<i>asthma</i>) BIJ ZWANGEREN.	395.
VERSCHIJSSELEN	ald.
OORZAKEN.	396.
VOORZEGGING.	397.
GENEESWIJZE.	400.

VIERDE HOOFDSTUK.

Bladz.

OVER DE ONTSTEKINGEN VAN DEN ONDER- BUIK BIJ ZWANGEREN.	404.
VERSCIJNSELEN.	405.
KENTEEKENEN DER ONTSTEKING VAN HET BUIKVLIES.	406.
————— ——— MAAGONTSTEKING.	407.
————— ——— DARMONTSTEKING.	408.
————— ——— LEVERONTSTEKING.	408.
————— ——— MILTONTSTEKING.	409.
————— ——— NIERENONTSTEKING.	410.
————— ——— PISBLAASONTSTEKING.	412.
OOZAKEN DER ONDERBUIKSONTSTEKINGEN.	413.
UITGANG EN VOORZEGGING.	421.
GENEESWIJZE.	423.

VIJFDE HOOFDSTUK.

OVER DE KOORTSEN BIJ ZWANGEREN.	436.
OOZAKEN.	440.
VOORZEGGING.	443.
GENEESWIJZE.	444.

DERDE AFDEELING.

OVER DE ZIEKTEN VAN HET ZENUWGESTEL.

EERSTE HOOFDSTUK.

Bladz.

OVER EENIGE AANDOENINGEN VAN HET ZE- NUWGESTEL NA DE BEVRUCHTING.	447.
VERSCIJNSELEN.	ald.
	oor-

ORZAKEN.	448.
VOORZEGGING.	450.
GENEESWIJZE.	ald.

T W E E D E H O O F D S T U K .

OVER DE HARTKLOPPINGEN , DUIZELING , BENAAUWDHEID EN BEZWIJMING DER ZWANGEREN.	453.
VERSCIJNSELEN.	ald.
ORZAKEN.	—
VOORZEGGING.	455.
GENEESWIJZE.	ald.

D E R D E H O O F D S T U K .

OVER DE FLAAUWTEN BIJ ZWANGEREN.	461.
VERSCIJNSELEN.	ald.
ORZAKEN.	—
VOORZEGGING.	462.
GENEESWIJZE.	463.

V I E R D E H O O F D S T U K .

OVER DE STUIPTREKKINGEN DER ZWAN- GEREN.	469.
VERSCIJNSELEN.	470.
LIJKOPENINGEN.	473.
ORZAKEN.	475.
VOORZEGGING.	479.
ALGEMEENE GRONDSTELLINGEN OMTRENT DE HANDELWIJZE VAN DEN ARTS BIJ STUIPTREKKINGEN DER ZWANGEREN.	481.
GENEESWIJZE.	482.
OVER DE AANWIJZINGEN DER VERHAASTE VERLOSSING DOOR DE KUNST.	500.
LITTERATUUR.	503.

V I J F D E H O O F D S T U K .

	Bladz.
OVER DE TANDPIJN BIJ ZWANGEREN.	505.
VERSCIJNSELEN.	ald.
OORZAKEN.	—
VOORZEGGING.	506.
GENEESWIJZE.	507.
LITTERATUUR.	510.

Z E S D E H O O F D S T U K .

OVER DE PIJNEN IN HET KRUIS BIJ ZWAN- GEREN.	511.
VERSCIJNSELEN.	ald.
OORZAKEN.	—
VOORZEGGING.	512.
GENEESWIJZE.	514.

Z E V E N D E H O O F D S T U K .

OVER DE PIJNEN IN DEN VOET BIJ ZWAN- GEREN.	516.
VERSCIJNSELEN.	ald.
OORZAKEN.	—
VOORZEGGING.	517.
GENEESWIJZE.	ald.

V I E R D E A F D E E L I N G .

OVER DE ZIEKTEN DER BORSTEN BIJ ZWANGEREN
EN OVER HET GEBREKKIGE MAAKSEL DER TEPELS.

E E R S T E H O O F D S T U K .

OVER DE ZIEKELIJKE ZWELLING EN OPHOOP- PING VAN ZOG IN DE BORSTEN.	520.
---	------

VER-

VERSCIJNSELEN.	520.
OORZAKEN.	521.
VOORZEGGING.	522.
GENEESWIJZE.	523.

T W E E D E H O O F D S T U K.

OVER DE ONTSTEKING DER BORSTEN. .	528.
VERSCIJNSELEN.	ald.
OORZAKEN.	529.
UITGANG.	530.
VOORZEGGING.	531.
GENEESWIJZE.	532.

D E R D E H O O F D S T U K.

OVER DE ONTVELLING DER BORSTEN. .	538.
VERSCIJNSELEN.	ald.
OORZAKEN.	—
VOORZEGGING.	539.
GENEESWIJZE.	ald.

V I E R D E H O O F D S T U K.

OVER DEN UITSLAG AAN DE BORSTEN. .	542.
VERSCIJNSELEN.	ald.
OORZAKEN.	543.
VOORZEGGING.	544.
GENEESWIJZE.	ald.

V I J F D E H O O F D S T U K.

OVER DE TE GROOTE GEVOELIGHEID EN TEEDERHEID, ALSMEDE HET GEBREK AAN OPRIGTING DER TEPELS. . . .	547.
I. TE GROOTE GEVOELIGHEID EN TEEDER- HEID DER TEPELS.	ald.
II. GEBREK AAN OPRIGTING DER TEPELS.	548.

ZESDE HOOFDSTUK.

Bladz.

OVER HET GEBREKKIGE MAAKSEL DER	
TEPELS.	550.
I. TE KLEINE TEPELS.	ald.
VERSCIJNSELEN.	551.
GENEESWIJZE.	ald.
II. TE GROOTE TEPELS.	554.
LITTERATUUR.	ald.

ZINSTORENDE FOUTEN.

Bl. 389. reg. 2 van ond.	} <i>staat</i> : ontruiming <i>lees</i> : ontlediging
— 394. — 2 — bov.	
— 478. — 11 — ond.	— stijfheid — stugheid
— ald. — 7 — —	— doorgang — beklemming
— 479. — 10 — —	— idiophatisch — idiopatisch



TWEEDE AFDEELING.

OVER DE ZIEKTEN VAN HET IRRITABELE STELSEL.

EERSTE HOOFDSTUK.

Over de Aderspatten der Zwangeren.

§. 1051.

Door Aderspatten (Aderbreuken, *Varices*) verstaat men de zwelling van aderlijke vaten, die een gevolg is eener onregelmatige uitzetting van derzelver rokken.

Verschijsfelen.

§. 1052.

Aan de dijen en beenen, voornamelijk aan derzelver binnenzijde, of aan de schaamlippen, puilen de aderen uit, en vormen een bepaald, week, en meestal niet pijnlijk gezwel, dat door de merkbare uitpuiling bij het aanraken en door de donker-blaauwe kleur kenbaar is; fomwijlen gaat het weg door eene

aangebragte drukking, ſchijnt te golveu of dan zelfs te verdwijnen, wanneer de Zwangere gaat leggen, doch naderhand weder te voorschiu te komen.

§. 1053.

De gedaante en grootte der Aderſpat is verſchillend; dikwijls zijn het alleenlijk verhevene donkerblaauwe vlekken: zoodanig bevond ze de Schrijver gewoonlijk in de eerſte maanden der zwangerheid; of zij hebben de grootte eener erwt of boon; menigmaal worden zij zoo groot als duiven- en hoendereijeren; wijders komen zij alleen op zich ſelven of hier en daar op verſchillende plaatſen te voorschiu, of zij hangen te zamen en maken bijna de gedaante uit van eenen druiventros. Bij het aanraken zijn zij week of hard, meestal niet pijnlijk, ſomtijds zeer pijnlijk; of de Zwangeren hebben, inzonderheid bij het gaan of ſlaan, het gevoel van ſpanning, branding en gekriebel als van mieren.

§. 1054.

De Aderſpatten komen, hoewel zeldzamer in de eerſte, gewoonlijk echter in de laaſte maanden der zwangerheid voor; zij beſlaan dan alleenlijk de dijen en voeten, meestal volgens den loop en de uitbreiding der groote of inwendige moederader (*saphena magna*), of zij ontſtaan aan de teeldeelen, bijzonder aan de ſchaamlippen, en breiden zich niet alleen tot in de ſcheede uit, maar ook ſomtijds tot aan den hals der baarmoeder, en zijn maar al te dikwijls met eene zuchtige zwelliug verzeld. Velen blijven, de meesten verdwijnen na de verloſſiug, doch komen bij

de volgende zwangerheid weder te voorschijn; anderen breken door en veroorzaken bloedingen, of gaan over in verzweringen.

Oorzaken.

§. 1055.

De naaste oorzaak is eene onregelmatige uitzetting van de rokken der aderen, welke door den beletten terugvloed van bloed in de onderste extremiteiten veroorzaakt wordt; het stilstaande bloed hoopt zich gewoonlijk tusfchen twee klapvliezen op, doet dat deel der ader uitdijen, en vormt eene foort van zak, waardoor het de knoestige gedaante bekomt.

§. 1056.

Alle invloeden, welke de werkzaamheid in den omloop van het bloed verminderen, kunnen aanleiding tot eene Aderfpat geven; doch er fchijnt altijd ook een zekere aanleg te moeten voorafgaan; prikkelbare volbloedige gefteflen, vooze ligchamen met eene bijzondere neiging tot zuchtgezwel en waterzucht, voorafgegane te menigvuldige maanfonden, aanbeijen of bloedvloeiingen uit andere deelen, dikwijls plaats gehad hebbende zwangerheid, voorafgegane kwetfing der deelen, inzonderheid der fchaamlippen, hooge jaren, fchijnen, volgens de waarnemingen van den Schrijver, den meesten aanleg tot Aderfpat te geven.

§. 1057.

Bij den §. 1056 aangewezen' aanleg kunnen de drukking der zwangere baarmoeder op de naastge-

legene organen, inzonderheid op de darmbeensadere-
 ren bij eene buitengewone uitzetting, drukking van
 het Kind, het te vast binden van den onderbuik,
 door naauwe kleederen, kousenbanden, aanhoudend
 zittende leefwijze, opgehoopte verharde drekstoffen
 in den kartel- en endeldarm, waarvan THOM (*) en
 des Schrijvers vader (†) belangrijke waarnemingen
 mededeelen, veel staande arbeid gedurende de zwan-
 gerheid, het gebruik van zeer prikkelende afdrijven-
 de middelen, het te menigvuldig aanwenden van
 buikzuiverende middelen, en dergelijke, het ont-
 staan der Ader spat begunstigen. Mischien kun-
 nen ook somtijds hardheid en likteekenen der baar-
 moeder, of onregelmatige vorming van den moeder-
 koek tot het ontstaan eener Ader spat medewerken.
 Die echter, welke reeds in de eerste maanden der
 zwangerheid waargenomen worden, zijn somtijds een
 gevolg van den krampachtigen toestand der vaten,
 waardoor de vrije terugvloed van bloed door de ade-
 ren belet wordt; de Schrijver heeft dit eenige malen
 bij blonde personen, aandoenlijke gestellen, en tot
 kramp overhellende Zwangeren waargenomen. Er
 schijnt in dit geval door den invloed der zenuwen
 op

(*) THOM's *Bemerkungen über die Heilung der Blut-
 aderknotten bei Schwangern, und die ihnen nicht unge-
 wöhnlichen Hüft- und Schenkelschmerzen*; in deszelfs *Er-
 fahrungen und Bemerkungen aus der Arznei-Wundarznei-
 und Entbindungswissenschaft. Frankf. a. M. 1799. 8°. S. 51.*

(†) C. C. SIEBOLD's, *Beobachtungen über die Blut-
 adergeschwülste*; in LODER's *Journal für die Chirurgie.*
N. B. 1e. St.

op den spierrok eene bijzondere prikkelbaarheid plaats te hebben, wier menigvuldiger trillingen ligt tot ophooping van bloed aanleiding kunnen geven.

Voorzegging.

§. 1058.

De voorzegging hangt gedeeltelijk af van de streek, waar de Aderspatten zich gevormd hebben, deels van de grootte, deels van zekere toevallige invloeden. Aderspatten aan de dijen en voeten zijn niet zoo bedenkelijk; het gevaarlijkste zijn die aan de schaamlippen, wanneer zij zeer groot en van belang zijn; deze kunnen, inzonderheid staande de geboorte, zeer ligt bersten, en tot eene doodelijke bloeding aanleiding geven. Aderspatten aan de dijen en voeten zijn ook wel aan het gevaar van verscheuring staande de geboorte blootgesteld; maar de bloeding kan gemakkelijker gestuit worden; buitendien kunnen zij bij sterke inspanning en beweging, maar inzonderheid ook dán bersten, wanneer Zwangeren bij sterken brand of jeuking daaraan met de vingers krabben (*). Voor het overige kunnen de Ader-
spat-

(*) Zoo werd de Schrijver bij de zwangere Vrouw van eenen Burgerman geroepen, welke eene Ader spat aan de binnenzijde der kuit van haren regtervoet opengekrabt had; er ontstond eene zoo hevige bloedstorting, dat er reeds ten gevolge van het verlies van bloed flauwten en stuiptrekkingen bij kwamen; zij kreeg de weeën in den volgenden nacht en er had eene te vroege geboorte plaats. Zij kwam slechts langzaam weder tot zich zelve.

spatten in de zwangerheid nooit volkomen geweerd, of niet eens verminderd worden, en zij verdwijnen eerst na de geboorte.

Geneeswijze.

§. 1059.

Men lette vooral op het ligchaamsgestel der Zwangeren, op den tijd der zwangerheid, en op de oorzaken, waardoor de Aderispatten te weeg gebragt worden.

§. 1060.

Wanneer de Aderispatten in de eerste maanden der zwangerheid ontstaan, en zij, te oordeelen naar het gevoelig ligchaamsgestel en andere verschijnselen, het gevolg eener krampachtige aandoening in het vaatgestel zijn, waardoor de terugvloed van bloed belet wordt: dan late men krampstillende, tot de klasfe der vlugtige stikstofaardige geneesmiddelen, voornamelijk in de gewrichten en voetzolen inwrijven; men wrijve tegelijk gedurig den voet met flenel, dat met barnsteen of mastik berookt wordt, in de rigting van onder naar boven; met nut kan tevens eene wollen of flenellen kous ver over de knie gedragen worden. Des avonds vóór het naar bed gaan schrijve men een' kop kamillenthee, en des noods nog werkzamer geneesmiddelen voor, waardoor men meer in het ooglopende algemeene krampachtige verschijnselen tegengaat, inzonderheid het extract van bilzenkruid, het heulsap, en late alle invloeden vermijden, welke die verschijnselen kunnen vermeederen of op nieuw te voorschijn brengen.

brengen, verbiede eenigen tijd het in dit geval bijzonder schadelijk genot van den bijlaap, en bevele matige beweging en eene werkzame leefwijze aan, om daardoor den omloop van het bloed te bevorderen.

§. 1061.

Indien de Aderspatten, inzonderheid in de laatste maanden der zwangerheid, zich voordoen, en de Zwangere een prikkelbaar volbloedig gestel heeft, of het evenwigt tusschen de massa van het bloed tot de kracht der vaten verbroken is, dan moet zij alles vermijden, wat de voortbrenging der voedingsstof van het bloed te zeer begunstigt; anders neemt de onevenredigheid tusschen de zamentrekkende werkzaamheid van het vaatstelsel, en den te bewegen last toe, er worden ophoopingën, voornamelijk in het poortaderstelsel, veroorzaakt, welke verstoppingen en eene te groote inspanning van den prikkelbaren spierrok der vaten ten gevolge hebben, die op de hoogste uitzetting eene volkomene verflapping en onwerkzaamheid in de aderen na zich sleept. Men behoort derhalve eene Zwangere in deze omstandigheden vooral het gebruik van te verhittende en te voedzame spijzen en dranken te verbieden, en haar meer verdunnende spijzen uit het plantenrijk aan te bevelen; ook is haar eene al te sterke hitte nadeelig, voornamelijk des winters in een al te heet vertrek, of in het warme jaargetijde, alsmede eene zittende en staande leefwijze; daartegenrade men het genot eener opene matig-warme lucht aan, beweging en werkzaamheid van het ligchaam,

en het gestadig onderhouden van eene dagelijksche gemakkelijke ontlasting, welke door moeilijk te verteren spijsen en indigestiën niet gehinderd, maar wel door zacht openende klisteren en afdrijvende middelen, bij voorbeeld den cremor tartari, moet bevorderd worden. Ook is het niet ondoelmatig, eenen breeden band van flanel op het bloote lijf te laten dragen, en reeds tamelijk bejaarde personen laauwe voetbaden met behoorlijke voorzigtigheid aan te raden.

§. 1062.

Indien echter in het geval §. 1061 zulke invloeden vooraf mogten gegaan zijn, welke plotseljk eene te groote verhooging der prikkelbaarheid in het slagaderstelsel te weeg brengen, en daardoor het bloed zoodanig in de aderen ophoopen, dat uit gebrek der buitendien belette werkzaamheid van hetzelfde eene onmatige uitzetting van derzelve rokken en gevaar van scheuring ontstaat, dan blijft, om zulks tegen te gaan, eene algemeene aderlating aan den arm of aan den voet het zekerste middel, voornamelijk bij Aderspatten aan de schaamlippen. Zeer dikwijls heeft de Schrijver daarvan in zijne Praktijk bij zwangere Vrouwen, die, van de extremiteiten tot boven de teeldeelen, als ware het met Aderspatten, gedeeltelijk zoo groot als kleine hoendereijsen, bezaaid waren, de zeer gewenschte werking waargenomen, dat na de algemeene bloedontlasting niet alleen het zoo nabijzijnde gevaar van scheuring voor dit maal, en voor de daarop volgende geboorte, voorbijging, maar ook, nog voordat deze plaats had, de Aderspatten aanmerkelijk afnamen.

Het

Het spreekt van zelf, dat men ook naderhand de Zwangere eenen gepasten leefregel, hoofdzakelijk rust, horizontale ligging en vermindering van alle invloeden moet aanbevelen, welke de prikkelbaarheid van het slagaderstelsel te zeer verhoogen.

§. 1063.

Bijaldien Zwangeren van een voos ligchaam, en met eenen in het oog loopenden aanleg tot ziekten van het secernerend en lymphatisch stelsel, met Ader-spatten behebt zijn, deze met zuchtgezwel aan de benedenste extremiteiten of der schaamlippen vergezeld gaan, het verblijf in eene koude, voornamelijk vochtige lucht, en in eene vochtige woning, het gebruik van slecht, gering voedsel, gepaard met eene aanhoudend staande of zittende leefwijze, voorafgegane zeer hevige bloedstortingen enz. deel aan het ontstaan dezer kwaal hebben, dan trachte men de genoemde invloeden te verwijderen, bevele beweging en een beter diët aan, voornamelijk vleesch en meer gekruide spijsen; men late des avonds eene thee van jeneverbesfen drinken, en somwijlen eenige giften kamfer nemen; bovenal wordt in dit geval tot inwendig gebruik eene oplossing van aluin en de mineraalzuren, inzonderheid het Hallers zuur, aanbevolen. Uitwendig make men gebruik van beroo-kingen door middel van jeneverbesfen, of mastik, late tevens de extremiteiten daarmede, of wel met spiritus Minder. of kamferbrandewijn wrijven, en buitendien eene wollen kous dragen of het been met flanel bekleeden. Als het zuchtgezwel afneemt, dan kunnen de zamentrekkende en versterkende middelen met nut aangewend worden.

§. 1064.

Indien het ontstaan der Aderspatten door eene scheeve ligging der zwangere baarmoeder mogt begunstigd worden, dan kan men, omdat daarin wel de oorzaak nimmer alléén te zoeken is, om alle invloeden weg te nemen, de ligging naar de telkens tegenovergestelde zijde aanbevelen, als ook, bij een' hangenden buik, de baarmoeder door een' buikband laten ondersteunen, en de ligging op den rug aanwijzen.

§. 1065.

Het is wel mogelijk, dat de drukking van een hoofd, dat scheef ligt of zeer diep in het kleine bekken getreden is, tot het ontstaan der Aderspatten somtijds gunstig is; mij dunkt echter, dat de drukking in het geval, waarin zij wezenlijk in een' zoo hoogen graad op de vaten van het bekken plaats heeft, dat de omloop van het bloed daardoor belemmerd wordt, naauwelijks kan worden weggenomen, dewijl het hoofd zonder veel geweld en gevaar niet meer van de plaats gebragt kan worden: waartoe derhalve hier de voorslag, om het hoofd met twee in de scheede gebragte vingers van de plaats op- en neêr te bewegen? Wat kan ook hier, bij de onmogelijkheid om het hoofd van de plaats te bewegen, de ligging naar de zijde of op den rug tot vermindering der drukking te weeg brengen? De handgreep zoowel als de ligging zoude slechts bij de beweegbaarheid van het hoofd het gevolg zijn, en is deze mogelijk, dan is er zeer aan een' verhinderden omloop van het bloed, aan het ontstaan van Aderspatten door onmiddellijke druk-

drukking van hetzelfde te twijfelen. Het zou derhalve raadzamer zijn, het hoofd onaangeroerd te laten, en alleenlijk somtijds eene horizontale ligging, afwisselend op den rug en op de zijde, matige beweging en de §. 1063 opgegevene gezondheidsregelen aan te bevelen; voornamelijk echter voor de regelmatige stoelontlasting en de pislozing zorg te dragen, en alles, bijzonder iedere uitwendige drukking, te verwijderen, waardoor de omloop van het bloed gestoord wordt.

§. 1066.

Aderfpatten, die oogenschijnlijk de gevolgen van opgehoopte, verharde drekstoffen in den kartel- en endeldarm zijn, vorderen dagelijks eenige malen openende klisteren, waarmede ook ontlastmiddelen tot inwendig gebruik moeten gepaard gaan; de rhabarber als tinctuur met middelzouten, of pillen uit rhabarber, Spaansche zeep, ammoniakgom en een bitter extract worden tot dit einde bijzonder aanbevolen; zij zullen eene menigte harde miskleurige, zeer hevig stinkende drekstoffen ontlasten, de Aderfpatten, zoo al niet geheel wegnemen, toch ten minste in een' buitengewonen graad verminderen, andere daarmede nog vergezeld gaande toevallen, bij voorbeeld beangstelingen, hoofdpijn, opwellingen, traagheid van het ligchaam, pijnen in de lendenen, in het kruis en in de dijen, en dergelijken, volkomen verwijderen, daardoor ook de volgende geboorte zeer verligten en eene gastrische koorts in het kraambed voorkomen.

§. 1067.

De middelen tot uitwendig gebruik bij Aderfpatten der Zwangeren verdienen nog eene bijzondere vermelding; zij zullen deze wel zelden alléén volkomen uit den weg ruimen, doch kunnen tot derzelver vermindering en uit den weg ruiming van vele nadeelige gevolgen bijdragen. Het oogmerk, dat men er mede tracht te bereiken, is den toevloed van het bloed te beletten, de rokken der vaten zamen te trekken en te versterken. Men beveelt het koud water, de stoving van SCHMUCKER, wijn en azijn, het middel van GÖTZ, bestaande uit eene oplossing van salmiak in azijn, het Goulardswater, het afkookfel van den eikenbast, der tormentilla, bistorta, der galnoten, den aluin, den wijn- en kamfergeest, den sp. sapon., de galnotentinktuur, het aftreksel van aromatische kruiden, tot waschen en als stoving aangewend, waaronder de Schrijver het middel van GÖTZ, doch voornamelijk het Goulardswater, als het werkzaamste bevond.

§. 1068.

HEISTER roemt zijne rijgkous, THEDEN de omwikkelingen met eenen band, voornamelijk met zijn wondwater bevochtigd, die ook door latere Geneesheeren en Verloskundigen, hoewel te onbepaald en met te weinig ondervinding, aanbevolen worden. De Schrijver kan ze ten gevolge zijner waarnemingen slechts met de grootste voorzigtigheid aanraden, wijl Zwangeren die zelden verdragen. De drukking der spieren en derzelver werking bij de voorgeslagene beweging mogen wel den loop van het bloed door de

de aderen bevorderen, nogtans heeft de aanhoudende drukking door banden, inzonderheid bij prikkelbare, volbloedige individuen, ligtelijk ophooping, benaauwdheid, hoofdpijn, zelfs ophooping naar de baarmoeder ten gevolge; nog minder verdragen Aderspatten van eene buitengewone grootte eene compresie, bijzonder met eene looden plaat of eene rijgkous, waarbij men gevaar loopt dat zij barsten. Alleen bij Zwangeren van een zeer voos ligchaam, waarbij de Aderspatten tevens met een zuchtgezwel gepaard gaan, en bij de geboorte, om de scheuring te verhoeden, kan men van de compresie der onderste extremiteiten door middel van eenen band of eener rijgkous gebruik maken.

§. 1069.

In plaats van eene compresie onmiddellijk op de aderen te doen, heeft de Schrijver nog het volgende denkbeeld, van welks uitvoering zich mischien werking bij Aderspatten laat verwachten, inzonderheid wanneer deze dreigen te barsten. Zou het niet doelmatig zijn, onmiddellijk eene drukking op de dijslagader aan te brengen, om het toestroomen der menigte van bloed uit de slagaderen naar de aderen te verminderen? Deze zouden minder bloed op te nemen hebben, en de loop van het bloed kon daarin gemakkelijker gemaakt worden; nogtans zou in zekere mate de betrekkelijke werkzaamheid der slagaderen tot die der buitendien minder prikkelbare aderen verzwakt worden. Intusschen zoude zoodanig eene compresie, om bloedophooping in andere organen te voorkomen, met behoorlijke omzigtig-

tigheid moeten geschieden en eene geschikte tourniquetswijze bewerking voorgeslagen worden, welke de Zwangere niet zeer bezwaarlijk valt, en ook de dijslagader alleen en niet tevens de aderen compri-meert.

§. 1070.

De Aderspatten aan de extremiteiten, en inzonderheid aan de schaamlippen, veroorzaken dikwijls een hevig branden en jeuken, dat zoo veel te meer de opmerkzaamheid van den Geneesheer verdient, dewijl dit de Zwangeren noodzaakt om te krabben, waardoor ligt eene bloedstorting ontstaan kan. Men bevele de grootste rust aan en eene horizontale ligging van den voet, afwisselend met eene matige buiging, en late de Aderspatten met Goulardswater of eene oplossing van borax stoven; daarvan kan men ook bij het hevig branden der Aderspatten aan de schaamlippen, hetwelk in den zomer voornamelijk ligt plaats heeft, door middel eener spons gebruik maken, die met een Tverband of met het verband van FRIED vastgemaakt wordt. Indien er echter eene hevige ontstekingskoorts mede mogt vergezeld gaan, en invloeden voorafgingen, welke de prikkelbaarheid in het vaatstelsel te zeer verhoogden, dan worden algemeene aderlatingen en antiphlogistische middelzouten aanbevolen, waarop men de genoemde uitwendige middelen aanwendt. De Aderspatten te koppen is gevaarlijk, en veroorzaakt ligt kwaadaardige zweren; bijaldien echter de aangedane deelen mogten ontveld zijn, dan wordt eene oplossing van wit vitriool met een slijmachtig vocht, of de zinkzalf aanbevolen.

§. 1071.

Wanneer eene Ader spat aan de schaamlippen barst, dan ontstaat er eene bloeding, die hoogst gevaarlijk worden kan; de proef, om deze door middel van een in wijngeest of een ander styptisch middel bevochtigd compres door drukking te stillen, gelukt zelden; menigmaal houdt het bloeden op, wanneer de oorzaak kan verwijderd worden; zoo niet, dan moet men de verlossing bespoedigen. Soms neemt men eene slagader spat aan de schaamlippen waar, die eene nog veel gevaarlijker bloeding ten gevolge heeft, wanneer het in de zwangerheid of bij de geboorte barst, en des te dringender de bespoediging der verlossing door de kunst vereischt (*). Indien eene Ader spat aan de onderste extremiteiten barst, dan late men den voet in koud water steken, en legge een met wijngeest of sterken azijn bevochtigd compres daarop, hetwelk door eenen band vastgemaakt wordt; daarbij bevele men eene rustige, doelmatige ligging van den voet, en late alle invloeden vermijden, welke de bloeding op nieuw zouden kunnen veroorzaken. In gevallen, welke de stilling der bloedstorting aan de onderste extremiteiten zeer verzwaren, kan de drukking der dijslagader door middel van den duim, of van een tourniquet van nut zijn.

§. 1072.

(*) OSIANDER'S *Beobachtungen einer für Mutter und Kind tödlichen Verblutung aus einer vor der Enbindung geborstenen Schlagadergeschwulst*; in deszelfs *Denkwürdigkeiten für die Heilkunde und Geburtshülfe*. I. B. 2c. St. S. 283.

Uitstortingen van bloed onder de huid en met eene hevige ontsteking vergezeld, worden, behalve door de antiphlogistische algemeene behandeling, door scarificatiën en stovingen met eene oplossing van salmiak in Goulardswater weggenomen. Bijaldien er zweren ontstaan, vermijde men alle zalven en pleisters, welke de ettering bevorderen; in derzelve plaats moeten meer zamentrekkende middelen en die, welke de etterafscheiding beperken, gebruikt worden; bij voorbeeld de lood- of zinkzalf, het afkooksel van den kinabast in kalkwater, de oplossing van aluin, of die van salmiak in Goulardswater; eeltachtige randen dezer zweren zullen door den helichen steen en stukken van onregelmatige uitzettingen der aderen, welke na de verlossing terug blijven, door de meermalen genoemde oplossing van den aluin, of van salmiak in Goulardswater, weggenomen worden.

L I T T E R A T U U R.

§. 1073.

- J. G. HAASE, *de gravidarum varicibus*. Lips. 1781. WEIZ n. Ausz. XIV. p. 172.
 BIRKHOLZ, *de quibusdam gravidarum varicibus*, ib. 1782. *Journal de Médecine*. T. LXII. p. 319.
 S. G. CRUSIUS, *de quibusdam gravidarum varicibus*. ib. 1787. rec. in WEIZ med. chir. Aufsätz. I. B. N^o. 3.
 STAMMEL, *de tumoribus varicosis*. Mogunt 1789.
 LÜTZELBERGER, t. a. pl.
 B. H. BRASSE, *de varicibus praesertim gravidarum*, c. Tab. aen. Berolini 1819. 4to.

T W E E D E H O O F D S T U K.

*Over de Bloedvloeijingen der Zwangeren,
behalve uit de teeldeelen.*

§. 1074.

Behalve uit de teeldeelen zijn de Zwangeren ook tot andere Bloedvloeijingen zeer geneigd, zoo als het neusbloeden, bloedspuwen, bloedbraken en aanbeijen. In zoo verre deze Bloedvloeijingen in den algemeenen toestand der zwangerheid en in zekere daardoor te weeg gebragte veranderingen haren grond hebben, zal hier gesproken worden.

Oorzaken.

§. 1075.

De gemelde Bloedvloeijingen ontstaan of in de eerste of in de laatste maanden der zwangerheid. In het eerste geval neemt men dezelve gewoonlijk bij zulke Vrouwen waar, welke te voren zeer overvloedig de maanstonen hadden, of wier bevruchting kort vóór dezelve plaats hadden volgde; in de zoodanige kan ook wel de werktuigelijke drukking der baarmoeder deze Bloedvloeijingen te weeg brengen. Vele Zwangeren echter kunnen tot het ontstaan derzelve medewerken, wanneer zij een te verhittend voedzaam diët houden, en zich aan andere schadelijke invloeden, welke eene te levendige

werking in het vaatgestel, alsmede tot ophooping en aanleiding geven, blootstellen.

§. 1076.

Dat echter bij sommige Zwangeren slechts neusbloeden of bloedbraken, bij anderen slechts bloedspuwen of aanbeijen zich voordoen, wordt niet alleen door de genoemde oorzaken, maar zeer dikwijls door den bijzonderen aanleg, die het ééne orgaan en vormfel daartoe boven het andere heeft, te weeg gebragt. Bij Vrouwen, die ook buiten de zwangerheid en vóór de jaren der huwbaarheid dikwijls aan neusbloeden onderhevig waren, kiest de Natuur gewoonlijk dezen weg tot ontlasting van bloed; de longen zijn buitendien reeds, als zulke vaatrijke prikkelbare organen, en uit hoofde van derzelver verrigting, tot Bloedvloeiingen geneigd; zoo nogtans de lijderes een toringachtig gestel en een' bijzonderen aanleg tot ziekten der ademhalingswerktuigen heeft, dan zal de Bloedvloeiing als eene bloedspuwing te voorschijn komen (*). Vrouwen, die buiten de zwangerheid tot braken geneigd waren, vele braakmid-

de-

(*) De Schrijver heeft meermalen bij Zwangeren eene bloedspuwing, en bij verscheidene eenen aanleg daartoe waargenomen. Bij eene Dame was het merkwaardig, dat zij telkenmale in de zwangerheid na den bijslaap eene bloedspuwing kreeg, welke ook weder in het volgende kraambed plaats had, zoo dikwijls zij haar Kind aan de borst legde, waarvan zij zich niet liet afhouden. De zwangere Vrouw van eenen Koffijhuishouder had reeds eene Phthisis, en bekwam in de laatste maanden der zwangerheid eene Haemoptysis.

delen of geestrijke dranken gebruiken, geven ligt bloed op uit de maag, en diegenen, welke eenen erfelijken aanleg daartoe hadden, en bij eene zittende leefwijze gewoonlijk naauwe kleederen dragen, te voedzaam en verhittend voedsel gebruiken, voorheen gestadig diarrhéen hadden, wier vaatgestel in den onderbuik door het misbruik van purgeermiddelen bijzonderlijk uit de drastische klasfe zeer verzwakt is, krijgen ligt aanbeijen.

Voorzegging.

§. 1077.

De gemelde Bloedvloeijingen zijn niet altijd gevaarlijk, en in vele gevallen aan de Natuur zelve dienstig, als een weldadig middel ter onmisbare bewaring van den ongestoorden en gezonden toestand der zwangerheid, voornamelijk in de in §. 1076 aangewezenen gevallen. — Het neusbloeden kan alleen dán gevaarlijk worden, wanneer het met zware hoofdpijn, een gloeiend rood en heet aangezicht, neiging tot slaap, drukking in de slaapstreek en in den nek, ongeschiktheid tot denken, suizen in het oor, schemeren voor de oogen en een gevoel van volheid in den neus gepaard gaat. Bij eene zeer irritabele zwangere Vrouw, die eene tusfschenpoozende koorts had, nam zulks de Schrijver waar in de laatste aanvallen der koorts, en het schein een critisch verschijnsel te zijn, omdat naderhand de koorts weg bleef. — Het bloedspuwen veroorzaakt gevaar, wanneer het de longen met vernietiging of storing dreigt, en wanneer het

bij teringachtige Zwangeren plaats heeft. Wanneer het bloedbraken gemakkelijk geschiedt, en spoedig overgaat, verwekt het nog geene bezorgdheid; zoo het echter met groote moeite, en met een hevig branden in de maagstreek verzeld gaat, dan wordt het bedenkelijk. — De aanbeijen zijn eene weldadige ontlasting voor de Zwangeren, inzonderheid omdat zij bij eene zittende leefwijze verstoppingen in den omloop van het bloed tusfchen de baarmoeder en het ei, ontijdige geboorten en bloedvloeiingen uit den Uterus verhoeden. Aanbeijen, die niet vloeijen of plotselijk gestopt worden, zijn gevaarlijker, zoodra zij zeer hard, verheven, brandend en gevoelig zijn, en met hevige pijnen in den buik en het kruis gepaard gaan; dan is er ligtelijk bloeding uit de baarmoeder, ontsteking in den onderbuik en ontijdige geboorte te vreezen. Wanneer de knobbels niet pijnlijk zijn, en deze zich niet voordoen ten gevolge van verschijnselen, die eene te levendige werking van het slagaderlijk stelsel te kennen geven, dan zijn zij niet gevaarlijk, doch kunnen de volgende geboorte moeilijker en pijnlijker maken. — Bloedvloeiingen, die te lang aanhouden, en in te grooten overvloed plaats hebben, kunnen de reproductie der Zwangeren in het algemeen, alsmede de voeding van den foetus, zeer verzwakken; of zij hebben ook wel zulk eene zwakte en atonie der baarmoeder ten gevolge, dat bij eene plaatshebbende geboorte de gevaarlijkste Bloedvloeiing uit dat orgaan te vreezen is (*).

Ge.

(*) Veelmalen heeft de Schrijver dit gevolg bevestigd

ge.

Geneeswijze.

§. 1078.

Wanneer de Bloedvloeijingen door de in §. 1075 genoemde oorzaken te weeg gebragt worden, derzelver verschijning met den, vóór de zwangerheid plaats gehad hebbende, typus der maanston- den gelijkelyk plaats heeft, de Zwangere niet alleen zich wel bevindt, maar ook werkelijk verligt gevoelt, de Bloedvloeijingen noch te overvloedig zijn, noch voor groote verzwakking, flaauwten en stuipen doen vreezen, en het orgaan zelf met geene nadeelige storing of volkomene vernietiging dreigen, dan is er geene dringende aanwijzing, om dezelve te stoppen; integendeel zoude eene plotselijke stilling met gevaar vergezeld zijn, en gemakkelĳk eene bloedstorting der baarmoeder en ontijdige geboorte ten gevolge hebben. Men zorge slechts dáárvoor, dat die niet te overtollig en te aanhoudend worden, late alle invloeden vermijden, welke derzelver ontstaan begunstigen, bevele rust aan en eene ligging op de linker- of regterzijde met het hoofd omhoog, verwijdere alle drukking van naauwe kleederen en te warme bedden,

zor-

gevonden, en onder anderen bij de gemelde teringachtige Vrouw, die, wel is waar, haar Kind voldroeg, doch dadelĳk bij de eerste weeën eene zoo vreesfelĳke bloedstorting der baarmoeder kreeg, dat hare verlossing spoedig door de keering moest verhaast worden, om na de ontruiming de atonische baarmoeder tot contractie te brengen.

zorge voor eene koele temperatuur, verbiede alle te verhittende en te voedzame spijsen en dranken, en trachte door klisteren of des noods door antiphlogistifche purgeermiddelen open lijf te houden.

§. 1079.

Wanneer echter deze Bloedvloeijingen gevaar mogten veroorzaken, en het neusbloeden, het bloedbraken en de aanbeijen door de in §. 1077 aangewezen gevallen vergezeld worden, dan zijn algemeene en plaatselijke bloedontlastingen, alsmede de antiphlogistifche behandeling, dringend aangewezen. — Zoo zij nogtans in te grooten overvloed zich voordoen, en de Zwangere door dezelve te zeer afgemat is, er onmagt en stuipen op handen zijn, dan moet men dezelve met behoorlijke inachtneming op de individueele ligchaamsgesteldheid der zieken, op den bijzonderen graad van zwakte en derzelver verscheidenheid, en op de individueele ligging, vorming en verrigting van het orgaan stillen.

§. 1080.

Bij de Haemoptysis, welke aan buitengewone asthenie en atonie der longen toegeschreven wordt, bevele men het kaneel, den aluin opgelost in aqua cerasorum, de aqua laurocerasi of — amygdalarum amararum, het ijzervitriool voornamelijk met het heulsap, aan; tot drank diene men het Hallers zuur toe met een aftreksel van zoet hout, en stovingen van wijngeest of sterken azijn over de borst, en in uiterste gevallen van koud water. Dezelfde methode wordt ook bij het hevig neusbloeden vereischt,

eischt, alleenlijk worden de fomentatiën over het voorhoofd gelegd; men laat ook het koude water opfnuiven, en dit zoowel als de overige middelen door den neus inspuiten, en wanneer de bloeding daarna niet ophoudt, een tampon uit plukfel, die met wijngeest, azijn, of eene oplossing van aluin natgemaakt is, inbrengen, waarbij men echter de Zwangere vrij hoog met het hoofd moet laten liggen. Nog werkzamer is de tampon bij de aanwending van BELLS instrument, waardoor tevens de bloedende vaten gecomprimeerd worden. — Bij het bloedbraken zij men voorzigtig met het gebruik der bloedstillende zamentrekkende middelen, omdat er ligt Gastritis ontstaan kan; daarom is het goed, in den beginne het braken alleenlijk te bedaren en te verligten, en tot dat einde bevele men laauwe voetbaden, alle halve uren eene klisteer uit kamillen, lijnzaad en lijnolie aan, en zoo het met de stonden in verband staat, bloedzuigers, inzonderheid wanneer de maagstreek zeer pijnlijk is. Inwendig geve men de potio Riverii, slijm- en zuurachtige dranken, gerstewater met citroen, tamarindenhui e. d. g., en, wanneer er met het braken meer een krampachtige toestand vergezeld gaat, de ipecacuanha in kleine giften, krampstillende klisteren en den Riverischen drank met het heulsap. Als het braken ophoudt, dan moet men een gepast diët aanbevelen, verbiede het gebruik van moeilijk te verteren spijsen en verhittende dranken, het zitten met het ligchaam voorover en het te vast rijden van het lijf, en schrijve tonische middelen voor, om de geregelde werkzaamheid der maag te herstellen.

len, waartoe de aftreksels van herba trifol. fibr. — millefol., lign. quass. en derzelver extracten voornamelijk geschikt zijn.

§. 1081.

De Aanbeijen moeten met betrekking tot de stilling van het bloed met meer voorzigtigheid behandeld worden; deze mag men ten eenemaal slechts bij het door een al te overvloedig bloedverlies te weeg gebragte gevaar tegengaan; de middelen tot dat oogmerk zijn het Hallers zuur, het kaneel, de aluin, het ijzervitriool, het heulsap, het extract van catechu en derzelver tinctuur, enz. gepaard met de opgegevene stovingen en tampons aan den aars angewend. Zijn het slechts zakaanbeijen, dan bevele men, om de Bloedvloeijing te verhoeden, een gepast diët en verdunnende spijsen, vooral uit het plantenrijk, aan; men rade de lijderes aan op zijde te liggen, en wanneer die hevig branden of pijn veroorzaken, dan wende men uitwendig weekmakende afkookfels en zalven aan; zoo zij echter zeer hard en ontstoken zijn en hevig branden, dan legge men bloedzuigers, doch vermijde dezelve te scarificeren, omdat zij ligt van een' kwaadaardigen aard worden. Inwendig geve men antiphlogistica, tartarus depuratus met magnesia en borax. Mogten de aanbeijen bij de volgende verlossing pijnen en hindernissen veroorzaken, dan late men dezelve door middel eener spons, die in een aftreksel van vlierbloemen en bilzenkruid met melk natgemaakt is, fomenteren, en behandelde dezelve met de grootste behoedzaamheid

heid gedurende de ontwikkeling van het kind. Voor het overige is het hier de plaats niet, om zoo breedvoerig over de geneeswijze dezer Bloedvloeijingen te handelen, en moet naar de bijzondere Therapie derzelve verwezen worden. Doch ééne vraag mogt men opperen, of niet in menig geval eene spoedige verlossing het middel tot stilling dier Bloedvloeijingen kon en moest worden: de Schrijver houdt deze in de zwangerheid, zoo lang er geene weeën plaats hebben, niet aangewezen; het gevaar, hetwelk met eene overhaaste verlossing (*accouchement forcé*) vergezeld gaat, is dikwijls veel grooter dan bij de Bloedvloeijingen zelve (*), en, wanneer zij ook gedurende de geboorte

plaats

(*) Zoo werd de Schrijver bij de gemelde toringachtige Vrouw geroepen, om op raad van haren Doctor, wiens poging, om de zoo hevige Haemoptysis te stillen, vruchteloos gebleven was, de verlossing te bespoedigen, waarvan hij alleen verwachtte, dat de bloeding gestild en de zieke gered zou worden; deze zich zeer zwak, in slaauwte, koud over het geheele ligchaam, de pols bijzonder klein, nauwelijks voelbaar, bevindende, gaf nog bloed op, en had reeds eene buitengewone menigte bloed verloren; zij had bijna nog twee maanden tijd eer zij moest bevallen, en bij het onderslaan vond men geene de minste verschijnselen eener op handen zijnde geboorte. Overtuigd dat het opgeven van bloed volstrekt niet met den toestand der zwangerheid in verband stond, en dat eene spoedige verlossing hetzelfde niet wegnemen, maar wel bij den nog volkomen gesloten' moedermond de lijderes in een nog grooter levensgevaar zoude storten, liet de Schrijver zich volstrekt niet tot de operatie bewegen, en sloeg hem voor, om, behalve groote giften heulsap tot

plaats hebben, dan moet men daarvan vast overtuigd zijn, dat ook alleen door de ontruiming van het baringsorgaan de bloeding konde belet worden.

ALBERT, *de haemorrhoidibus gravidarum et puerperarum.*
Halaë 1727.

P. G. SCHACHER, *de haemorrhagiis gravidarum.* Lips. 1717;
in HALLERI *disput. pathol.* T. IV. N^o. 136.

inwendig gebruik, de gansche borst, hetgeen te voren nog niet geschied was, met doeken, die in wijngeest gedoopt moesten worden, te stoven. Zijn raad werd aanstonds opgevolgd, het bloedopgeven hield nu en in het vervolg volkomen op, de Zwangere herstelde, en voldroeg haar Kind; doch de geboorte had met eene hevige bloedstoring uit de baarmoeder plaats, welke alsmede de schoudergeboorte des Kinds eene spoedige verlossing door de keering noodzakelijk maakte, zoo als reeds gezegd is.



DERDE HOOFDSTUK.

*Over het Hoesten en de Aamborstigheid (asthma)
bij Zwangeren.**Verschijselen.*

§. 1082.

Zwangeren lijden ook niet zelden aan Hoesten, hetwelk of in den beginne of op het einde der zwangerheid plaats heeft, somtijds ook den ganschen tijd aanhoudt. Sommigen hoesten des morgens, anderen op elken tijd van den dag, weêr anderen des avonds, of alleen des nachts, en worden daardoor van hare rust, van den slaap en andere verkwikkingen des ligchaams beroofd. Het Hoesten is slechts ligt, zwak of zeer hevig, droog of met het opgeven van fluimen of bloed vergezeld; hetzelfde gaat ook somtijds met asthmatische toevallen gepaard, of het asthma kan ook op zich zelf alleen bestaan; meestal is dan de ademhaling kort en klein, en bij het inademen voelt de Zwangere inzonderheid eene buitengewone benaauwdheid, die eenen zoo hoogen graad bereiken kan, dat zij niet kunnen liggen, maar gedurig opzitten en aan het venster of in de opene lucht adem moet scheppen.

Oorzaken.

§. 1083.

Het Hoesten en het Asthma vooronderstellen meestal reeds ziekelijke, verzwakte, zeer prikkelbare of gevoelige ademhalingswerktuigen. Ontstaat het Hoesten in de eerste maanden der zwangerheid, dan is het dikwerf eene krampachtige aandoening, ten gevolge eener vermeerderde gevoeligheid der borstzenuwen, meestal slechts symptomatisch, en door de verhoogde zamenstemming te weeg gebragt, waardoor de baarmoeder ten tijde der zwangerheid met verscheidene organen in betrekking komt (*): de Hoest is dan meestal droog, en er ontstaat bij den geringsten invloed eene dikwijls langeren of korteren tijd aanhoudende contractie der ademhalingswerktuigen, waaraan ook het middellrif dikwijls deel neemt, en dan zoo tegen de borst gedrukt wordt, dat er te weinig ruimte voor de longen ontstaat. Bij zeer irritabele, en in het algemeen zeer tot ontstekingen overhellende Vrouwen, is de Hoest een gevolg der in de zwangerheid te zeer verhoogde irritabiliteit der longen, openbaart zich bijzonder bij zoodanige Zwangeren, die te voren zeer overvloedige maanstanden hadden, en gaat somwijlen met het opgeven van bloed gepaard. Niet zelden is de Hoest bij

de-

(*) Zoo kreeg eene Dame, die door den Schrijver verscheidene malen verlost was, altijd dadelijk in het begin der zwangerheid zulk een' hoest, die haar telkenmale tot een bepaald kenmerk eener nieuwe zwangerheid diende. Zij was eene blondine en van een gevoelig gestel.

dezen zuiver catarrhalisch, en ontstaat des te lichter, wanneer de Zwangere zich aan eenen kouden dampkring of aan eene verkouding, bijzonder na voorafgegane verhitting, blootstelt. In de laatste maanden der zwangerheid draagt ook bij bovendien zeer irritabele longen de uitzetting der zwangere baarmoeder dan zeer veel tot den Hoest bij, wanneer zij de organen van den onderbuik met het middelrif tegen de borst dringt, daardoor de verigtingen van deze spier en der longen stoort, en deze bij den beletten omloop des bloeds tot hoesten aanzet, die daardoor eene vrijere werking trachten te verkrijgen. Doch de Hoest kan ook op plaatselijke gebreken en eigenaardige ziekten der longen gegrond zijn, en is dan voornamelijk als idiopathisch te beschouwen, bij voorbeeld longknobbels, longtering; somtijds is dezelve een symptoma der borstwaterzucht, en dan meestal ook met asthmatische toevallen vergezeld. Uit dergelijke oorzaken, als de Hoest, kan ook het Asthma ontstaan; waartoe Zwangeren met een' dikken hals en krop voornamelijk geneigd zijn.

Voorzegging.

§. 1084.

Een zachte Hoest, inzonderheid wanneer die in de eerste maanden der zwangerheid plaats heeft, en van een' krampachtigen aard is, is niet gevaarlijk, en gaat meestal van zelve in de vierde maand der zwangerheid weder over. De met uitwerpsels gepaarde Hoest is minder gevaarlijk dan de drooge,
en

en de symptomatische minder, dan de idiopathische. Een sterk aanhoudende Hoest, welke een gevolg is van de vermeerderde irritabiliteit der longen, is zeer hinderlijk voor de verrigting der longen, werkt op deze nadeelig, veroorzaakt scheuring der bloedvaten, bloedspuwen, koorts en hoofdpijn, en door de schokking, welke de baarmoeder door middel der buikspieren en van het middelrif ondergaat, kan de moederkoek op verscheidene plaatsen losraken, waardoor bloedvloeijing en ontijdige geboorte ontstaan, en alsdan ook volgen kunnen, wanneer de vliezen scheuren en het water te vroeg afloopt. Een zeer hevige aanhoudende hoest in de zwangersheid kan ook tot ongeregelde liggingen van het Kind, tot scheuring, breuken en uitzakkingen der baarmoeder aanleiding geven, gelijk de Schrijver de beide laatste gevolgen zelf waargenomen heeft. Is de Hoest met Asthma vergezeld, of lijdt de Zwangere aan dit alleen, dan kan hetzelfde voornamelijk in de negende maand der zwangersheid zeer gevaarlijk worden, en door apoplexie een' plotseligen dood te weeg brengen (*). Als de Zwangere te

(*) De Schrijver werd te *Wurzburg* bij eene plotselinge gestorvene Vrouw geroepen, om de keizersnede te verrigten; zij leed in den laatsten tijd harer zwangersheid aan een Asthma met menigvuldig Hoesten vergezeld, en had eenen zeer dikken hals; in den nacht kreeg zij zulk eenen hevigen aanval van asthma, dat zij, uit vrees van te stikken, ten bedde uitsprong, de kamer verliet en vóór de deur op de plaats lucht zocht te scheppen; zij had dezelve nauwelijks bereikt, of zij viel zeer dicht bij den trap dood. Van den dood bij mijne aankomst vol-

te voren aan eenen Hoest, ten gevolge eener longtering, lijdt, dan gaat die dikwijls in de drie eerste maanden der zwangerheid over, doch keert naderhand op nieuw terug, en veroorzaakt in de laatste maanden wel hevige pijnen en menigvuldige bloedspuwingen, doch zelden den dood vóór de verlossing. — Een aanhoudende Hoest, welke met veel verlies van sappen door het opgeven van slijm of bloed gepaard gaat, de lijdere van de rust en noodzakelijke verkwikking berooft, en dikwijls den omloop des bloeds tusfchen de Moeder en het Kind stoort, kan ook invloed op de voeding van hetzelfde hebben; offchoon het ook voldragen is, zoo zal het toch als een zeer zwakkelijk, gebrekkelijk gevoed Kind geboren (*) worden, dat gewoonlijk zijn leven niet lang behoudt.

Ge-

volkomen overtuigd, ondernam ik spoedig haar te verlossen, doch niet door de keizerfmede, maar door de keering op de voeten, omdat het hoofd over den ingang volkomen bewegelijk was, en de moedermond gemakkelijk verwijd kon worden.

(*) Dit toch is niet altijd het geval; de Schrijver verlostte eene teringachtige Vrouw van een zeer sterk en doorvoed Kind met de tang; hare eigene voeding had daarbij buitengemeen geleden, zij geleek naar een levendig geraamte en stierf zeer spoedig weinige dagen na hare verlossing. Vele teringachtige Vrouwen bevinden zich gedurende hare zwangerheid zelfs oogenschijnlijk beter; maar na de verlossing neemt de ziekte in een hooger grad toe, en zij sterven meestal nog in het kraambed.

Geneeswijze.

§. 1085.

De genezing van den Hoest in de zwangerheid blijft zeer dikwijls eene moeilijke taak voor den Geneesheer, en vereischt veeltijds, bijzonder wanneer dezelve symptomatisch is en het naast in de veranderingen, welke de zwangerheid te weeg brengt, zijnen grond heeft, of als een idiopathisch lijden uit eene gewigtige storing en ziekte der ademhalingswerktuigen voortvloeit. Hetzelfde geldt ook van het Asthma. Vooral echter moet de geneeswijze daardoor bepaald worden, of de Hoest symptomatisch of idiopathisch zij, en door welke oorzaken dezelve voor het naast te weeg gebragt worde.

§. 1086.

Zoo de Hoest symptomatisch en van eenen gevoelligen, krampachtigen aard is, dan maakt men gebruik van geneesmiddelen, welke de verhoogde gevoeligheid verminderen; daartoe behooren: het extract van hyoscyamus, de ipecacuanha in kleine giften, de belladonna, en voornamelijk het heulfap in emulsie, of als tinctuur, alléén, of met den spiritus nitrico aethereus, en eene melissen- en kamillentheë; ook het Dowerspoeder verdient bijzonder des avonds vóór het naar bed gaan aanbevolen te worden, wanneer de Hoest de Zwangeren van de zoo noodzakelijke verkwikking en rust in den nacht berooft. Daarmede vereenige men antispasmodische klisteren, dergelijke baden met behoorlijke voorzigtig-

tigheid aangewend, voornamelijk voet- en halfbaden, en inwrijvingen in de streek van den hartkuil en van den hals, bijzonder naar den loop der luchtpijp. Dezelfde middelen kan men ook bij het symptomatische krampachtige Asthma aanwenden; buitendien bevele men hierbij nog aan het liquor ammonii succinici, het castoreum, de moschus, en wanneer er toevallen van verstikking dreigen, de tinctuur van moschus en van amber. In het vervolg late men de borst en den hals gedurig met flanel bedekt houden, en alle invloeden vermijden, welke de gevoeligheid in het algemeen, en die der ademhalingswerktuigen in het bijzonder, te zeer verhoogen.

§. 1087.

Wanneer de Hoest het gevolg is der verhoogde irritabiliteit van de ademhalingswerktuigen, de Zwangere van een irritabel, volbloedig gestel is, en voorheen hare stonden zeer overvloedig had, de Hoest droog, of met het opgeven van bloed vergezeld is, dan zijn algemeene aderlatingen aan den arm, in kleine portien verscheidene malen herhaald, zeer nuttig; daarbij geve men kleine giften salpeter in een slijmachtig afkooksel van altheawortel, en late alle invloeden verwijderen, welke de irritabiliteit, bijzonder die der ademhalingswerktuigen, te zeer verhoogen. Wordt de Hoest buitendien door eene vaste en brandende pijn op de Borst vergezeld, en door een bijzonder idiopathisch lijden der longen, bij voorbeeld, door longenknobbels, door gedeeltelijke ontstekingen bij longteringen enz. te weeg gebragt, dan doen bloedzuigers, op de pijnlijke brandende

deelen gelegd, veel dienst. Wanneer de pijn en de hette volkomen over zijn, en er geen bloed meer uitgeworpen wordt, dan neme men zijne toevlugt tot een afkookfel van senega en tot de tinctuur van opium, waardoor de Hoest volkomen weggenomen wordt. Alleenlijk gebeurt het somtijds, dat deze op denzelfden tijd, wanneer te voren de stonden plaats hadden, wederkomt; zoo er alsdan op nieuw eene brandende pijn en een uitwerpen van bloed plaats heeft, dan herhaalt men de plaatselijke bloedontlastingen.

§. 1088.

Bijaldien de Hoest meer eene catarrhale aandoening is, dan moet men der Zwangeren een' gepasten leefregel voorschrijven; het noodzakelijkste middel is het vermijden van alle verkouding, en een gestadig verblijf in eene matige warmte; daarbij laat men een aftreksel van vlierbloemen en van althea met spiritus Mindereri gebruiken, en dán alleen, wanneer de catarrhus een' hooger grad van ontstekking mogt bereikt hebben, wordt de in §. 1087 aangewezen antiphlogistische behandeling aanbevolen. Is de catarrhus met gastrische of galachtige onreinigheden vergezeld en wordt dezelve inzonderheid door de prikkeling daarvan onderhouden, dan zullen braak- en buikzuiverende middelen, met voorzigtigheid toegediend, dien wegnemen. Doch wanneer bij den Hoest het uitwerpen van fluimen en de verrigting der longen ten gevolge der zeer verminderde irritabiliteit gehinderd, en de Hoest met veel roghelen vergezeld is, dan zijn de se-

ne-

nega, de arnica, kleine giften van braakwijnsteen, de goudzwavel, de kermes, de squilla en de kamfer zeer werkzaam, welke middelen ook bij het Asthma voornamelijk dienstig zijn.



VIERDE HOOFDSTUK.

*Over de Ontstekingen van den Onderbuik
bij Zwangeren.*

§. 1089.

De Ontstekingen van den Onderbuik komen, wel is waar, menigvuldig voor bij Zwangeren, doch worden zeer dikwijls miskend, of geen voorwerp van geneeskundige behandeling, omdat die gedurende de zwangerheid meestal met minder in het oog loopende verschijnselen zich voordoen, en wijl dezelve somtijds plaats hebben, zonder dat daardoor de zwangerheid in haren voortgang gestoord wordt; of omdat die verschijnselen, welke op het einde der zwangerheid plaats grijpen, tot aan de geboorte voortduren, ook deze laten voorbijgaan, doch eerst in het kraambed met de gevaarlijkste symptomata te voorschijn komen, en dan meestal doodelijk worden, wanneer in de zwangerheid de gepaste hulp verzuimd werd; daarom verdienen de Ontstekingen van den Onderbuik de bijzondere opmerkzaamheid van den Geneesheer; en al mogt men zich mischien blootelijk beroepen op de Therapie, die de genezing der Ontstekingen van den Onderbuik ten onderwerp heeft, zoo hebben toch diegenen, welke met den toestand der zwangerheid in verband staan, met betrekking tot derzelver diagnosis, begin, einde, prognosis en indicatie zoo veel eigenaardigs, dat

dat het niet overtollig zal zijn, daaraan in een Praktisch Handboek over de Ziekten van het Vrouwelijke Geslacht een bijzonder Hoofdstuk te wijden.

Verschijselen.

§. 1090.

Zwangeren klagen zeer dikwijls over pijnen in den Onderbuik; deze gevoelen zij of slechts in eenen minderen of in eenen zeer hoogen graad, aanhoudend, of zij houden gedurende den nacht op, doch keeren voornamelijk bij dag na zwaren arbeid, beweging en bijzonderlijk na het eten zoo veel te heviger terug; zij zitten of op eene bepaalde plaats, of zijn in den geheelen omtrek der oppervlakte van den Onderbuik verspreid, of hebben haren zetel meer binnenwaarts; zij doen zich in het begin of in de laatste maanden, meer tegen het einde der zwangerheid, voor. De Zwangeren, voorheen reeds van een irritabel gestel, of door de zwangerheid zelve daartoe overhellende, hebben eene voorbijgaande hui-vering, doch bijzonder vliegende hette, een rood aangezicht, begrensde roode wangen, een branden in de handen, en bespeuren, dat zelfs na de geringste verhitting deze symptomata zoowel als de pijnen toenemen.

§. 1091.

De pijnen (§. 1090) met de overige symptomata zijn altijd kenteekenen eener Ontsteking in den Onderbuik; doch deze kan zelve weder naar gelang van het deel en het orgaan verschillen, hetwelk

door de ontsteking voornamelijk aangetast is; het menigvuldigste is de zetel derzelve het buikvlies, of slechts eene bepaalde plaats van hetzelfde, of somwijlen deszelfs geheele omtrek, of, waar de pijn dieper gevoeld wordt, kunnen de darmen met het net, de maag, de lever, de milt, de nieren, de pisblaas of de baarmoeder de organen wezen, welke ontstoken zijn; wij zullen de ontsteking der baarmoeder voorbijgaan, omdat daarvan in een bijzonder Hoofdstuk zal gesproken worden.

Kenteekenen der Ontsteking van het Buikvlies.

§. 1092.

Bijaldien het pijnlijk gevoel op de binnenste oppervlakte van den onderbuik met een gezwel der aangedane plaats en met koorts gepaard gaat, dan is het eene Ontsteking van het Buikvlies (*Peritonitis*); indien die plaats dadelijk bij de geringste aanraking op de oppervlakte en bij de drukking van kledingstukken pijn veroorzaakt, deze zeer brandend is, en bij iedere inspanning, bij het inademen en oprigten van het ligchaam, of wanneer zich de Zwangere naar de eene of andere zijde beweegt, vermeerdert, dan is nog bijzonder de bovenste of buitenste vlakte van het buikvlies, welke naar de onderbuikspieren gekeerd is, het deel der ontsteking; deze is ook juist de menigvuldigste bij Zwangeren, waaraan zij weken en maanden kunnen lijden, en is ook diegene, welke dikwijls zich door vasthechting bepaalt, en daarom de naauwste vergroeiing van het peritoneum met de onderbuikspieren aan de eene of

an-

andere plaats ten gevolge heeft, waardoor de arbeid der weeën bij het plaatshebbend baren, wanneer dit door de medewerking der buikspieren ondersteund zal worden, zeer pijnlijk, bezwaarlijk, of geheel onmogelijk wordt. De Ontsteking van het Buikvlies te gelijker tijd met die van het net en de darmen gepaard gaande, dan is de pijn nog heviger, en er komt angst, misfelijkheid, braken enz. bij; maar nog bereikt de Ontsteking in de zwangerheid niet dien hoogen graad, en is zelden met de gevaarlijke, meer in het oog loopende symptomata vergezeld, welke echter na de verlossing des te vreesfelijker plaats hebben, en de eigenlijke kraamkoorts wordt, wanneer de Ontsteking zich nog niet vóór de verlossing openbaarde, of door de aangewezenen hulp uit den weg geruimd werd, volkomen gevormd.

Kenteekenen der Maagontsteking.

§. 1093.

De teekens der Maagontsteking (*Gastritis*) zijn eene vaste, brandende, stekende pijn in de maagstreek, bestendige benaauwdheid om den hartkuil, zeer pijnlijk braken, uitwendige koude bij inwendige hette, brandend opstijgen in de keel, groote dorst, pijnlijk kloppen in de praecordia, zeer gevoelig slikken, eene gewaarwording alsof de schouderbladen neêrgetrokken werden, stinkende adem, geelzucht, verstopping van den stoelgang en der pis, groote zwakte, kramppijnen, flauwten, stuiptrekkingen, ingevallen oogen, ijlhoofdigheid, enz. De pols is te zamen-

getrokken, snel, ongelijk, tusfchenpoozend, doch niet zoo klein en veranderlijk, als bij de Maagontsteking buiten de zwangerheid.

Kenteekenen der Darmontsteking.

§. 1094.

De Darmontsteking (*Enteritis*) heeft bijna dezelfde teekens als de gastritis; flechts het braken neemt men niet terftond in den beginne en in dien hoogten graad waar, als bij de laatstgemelde; het is ook niet zoo pijnlijk, en volgt niet dadelijk op het gebruik van drank; bovendien zijn nog de vaste pijn in de diepte der navelftrek, wanneer de Ontsteking in het begin der zwangerheid plaats heeft, en dezelfde pijn met eene spanning aan beide zijden van den onderbuik en over den bodem der baarmoeder, bij de in de laatste maanden plaats hebbende Ontsteking, vergezeld met koude aan de extremiteiten en een' bijzonder verdraaiden blik, — eigenaardige teekens der *Enteritis* in de zwangerheid.

Kenteekenen der Leverontsteking.

§. 1095.

Is het Leverontsteking (*Hepatitis*), en bepaalt deze zich bijzonder tot derzelver buitenfte bovenfte oppervlakte, dan klaagt de Zwangere over eene vaste pijn op de regterzijde van de levertrek; fomwijlen vindt men deze plaats iets gezwollen en hard; daarmede is eene hevige koorts vergezeld, de pijn neemt voornamelijk toe bij het diep inademen,

en het liggen op deze zijde is ondragelijk voor de Zwangeren; bij de pijn in de holle zijde der lever is de ontsteking met icterische verschijnselen, bitteren mond, walging, braken en benaauwdheid verzeld; ook openbaart zich deze soort van Ontsteking der Lever gewoonlijk in de laatste maanden der zwangerheid.

Kenteekenen der Miltontsteking.

§. 1096.

Bij de Miltontsteking (*Splenitis*) lijdt voornamelijk het linker hypochondrium, dit is voornamelijk pijnlijk, bijzonder bij eene drukking, bij eene diepe ademhaling en het hoesten; de pijn zelve is kloppend, vast, brandend, stekend, spannend, diep zittend, en men voelt, wanneer de uitzetting der baarmoeder niet reeds te zeer toegenomen is, een uitpuilend gezwel, hetwelk den vorm der milt begrenst; daarmede vergezellen zich dyspepsie, misfelijkheid en duizeligheid, en bij de poging, die de Zwangeren doen, om overeind te staan, het hoofd regtop te houden en zich in het bed op te rigten, komen er ligt flauwten bij. Eigenaardig zijn ook de icterische verschijnselen, waardoor de hepatitis van de Miltontsteking in zoo verre onderscheiden wordt, dat in deze het linker, in gene het rechter hypochondrium het pijnlijkste, het ziekelijkste is, en dat de icterus bij deze symptomatisch is. Behalve de gele, juist niet zeer uitstekende kleur der huid, ontbreken de overige icterische eigenaardige verschijnselen, de donker bruine pis, en de drooge

witachtige drekstoffen. De pis is in dit geval licht geel, bijna gansch van eene natuurlijke kleur. De pols der linkerzijde is meer onderdrukt, dikwijls zelfs tusfchenpoozend, de ligging op de beide zijden moeilijk, bijzonder in den beginne op de linkerzijde, de pijn trekt naar den linker fchouder, naar de geheele bovenfte helft van de linkerzijde des ligchaams; de koorts houdt het beloop eener remitterende, is van minder hevige verschijnselen vergezeld en zelfs de verheffingen zijn matig.

Kenteekenen der Nierenontsteking.

§. 1097.

De Nierenontsteking wordt in de zwangerheid zeer ligt miskend, inzonderheid omdat derzelver kenteekenen zich niet zoo duidelijk voordoen, dezelve ook langeren tijd, en tot na de verlossing kan voortduren, wanneer zij, zoo als dikwijls het geval is, eerst in de laatste maanden ontstaat, maar dan in het volgende kraambed met duidelijker symptomata zich aankondigt. Derzelver teekens rigten zich voor het overige deels naar de ligging der nieren, deels naar de storing van derzelver verrigting. De Zwangere klaagt eerst over pijn in de lendenstreek, in de nabijheid van de ruggegraat, die in den beginne zeer zacht, bij tusfchenpoozen, maar dan aanhoudend, brandend is, in de diepte gevoeld wordt, en zich bij iedere schokking door niezen, hoesten, aanraking en bijzonder bij het liggen op de zijde, in welke de nier ontstoken is, vermeerdert. Door de pijnen in de lendenen, waar-

aan Zwangeren zeer dikwijls lijden, en van de ontstekings der lendenpijnen, onderscheidt zich de Nephritis door de gestoorde verrigting der nieren, en de verandering in de pis. De afzondering der pis is zeer verminderd, deze is rood, brandend vurig, ook bloederig of etterachtig; bovendien heeft de Zwangere een pijnlijk gevoel in de rigting langs de pishuis naar de blaas toe, en is zeer dikwijls met braken vergezeld. De afzondering der pis houdt, wel is waar, gewoonlijk dan alleen volkomen op, wanneer beide nieren ontstoken zijn; doch de Schrijver heeft ook eenmaal deze bij eene Kraamvrouw verscheidene dagen geheel belet gevonden, waar bepaaldelijk slechts de ontsteking in de linker nier alleen plaats had, terwijl men in de regter ook volstrekt geene van de pathognomonische teekens der ontsteking waarnam, en bijzonder de strek in de nabijheid der laatste rug- en der vier eerste lendenwervelen geheel onpijnlijk was. De koorts bij de ontsteking in de zwangerheid is eene Synocha, die in deze zonder bijzondere toeneming aanhoudt; doch in het volgende kraambed doet de koorts zich ook zeer dikwijls als Synochus voor; in het eerste geval is de pols meestal vol, ook hard met vermeerdering van pijn; in het tweede geval afwisselend, nu eens klein en zamengesrokken, dan eens vol, doch nooit zoo sterk kloppend, als in de zwangerheid.

Kenteekenen der Pisblaasontsteking.

§. 1098.

De Ontsteking der Pisblaas (*Cystitis*) heeft de volgende teekens: de Zwangere klaagt over eene aanhoudende en stekende pijn en eene hette in de schaamstreek, welke hare rigting tot aan het perinaeum en heiligbeen nemen, en bij toenemende ontsteking door de scheede, bijzonder in derzelver voorsten wand, tot de schaamlippen en naar de dijen zich uitstrekken; de schaamstreek is heet, gespannen en pijnlijk, voornamelijk echter de voorste en bovenste wand der scheede naar de schaambeenderen toe bij het onder slaan met de vingers; daarmede gaat gewoonlijk ischurie, strangurie of dysurie gepaard, en de bij deze slechts droppelswijze afloopende pis is vurig, rood, heet, brandend en dikwijls bloederig. Bij deze pathognomonische teekens komen nog kolijkpijnen, benaauwdheid, braken, persing tot stoelgang, hardlijvigheid, pijnlijke zwelling der roede van den kittelaar, en gewoonlijk der pisbuis aan den voorsten wand der scheede achter de schaambeensvereeniging: want meestal is het de hals, het achterste deel, of de bodem der blaas, welke bij Zwangeren ontstoken wordt; doch de ontsteking kan ook aan het voorste deel en in den ganschen omtrek plaats vinden. In het eerste geval kan ook de baarmoeder door dezelve aangedaan zijn, en in het tweede geval is de pijn over de schaambeenderen bijzonder aanmerkelijk; de ontsteking in den bodem der blaas openbaart zich bij Zwangeren het

ligtst

ligtst in de tweede en derde maand, en wegens de verminderde ruimte der pisblaas en van de te groote gevoeligheid openbaart zich een gedurige aandrang tot wateren. Ontstekingen aan den hals der blaas komen meer in de laatste maanden der zwangerheid voor; van daar dat ook de pijn voornamelijk achter den voorsten en bovensten wand der scheede, de pijnlijke zwelling der pisbuis achter dezelve, als ook der roede van den kittelaar plaats heeft. De koorts is bij de ontsteking der blaas in de zwangerheid niet zeer aanmerkelijk; daarom wordt dezelve ook ligt miskend; zij kan ook bijzonder in de laatste maanden langer duren, en na de verlossing komt de koorts duidelijker als Synocha te voorschijn.

Oorzaken der Onderbuiksontstekingen.

§. 1099.

Reeds in de zwangerheid zelve ligt de voornaamste aanleidende oorzaak der Onderbuiksontstekingen. Het is klaar, dat de bij Zwangeren gewoonlijk zeer verhoogde prikkelbaarheid van het vaatstelsel, alsmede de vermeerderde levenskracht van het bloed zelve, waarvan ons de pols en het bloed eener Zwangere de zekerste bewijzen opleveren, en naderhand de gedurende de zwangerheid in het vaatstelsel van den onderbuik plaats vindende ophooping, en vooral ook de drukking, welke, inzonderheid bij ongewone uitzetting en verscheidene onregelmatige liggingen der baarmoeder, de slagaderen en aderen voornamelijk in verschillende organen lijden, veel daar-

daartoe bijdragen; omdat daardoor de omloop van het bloed niet alleen in het orgaan zelf, maar ook de vrije terugvloed van hetzelfde door den onderbuik naar het hart, alsmede het wegvloeijen van het hart moeilijk moet gemaakt worden; van daar dan ook ligtelijk de toestand van ontsteking der in §. 1091 genoemde deelen en organen van den onderbuik, bijzonder van het peritonaeum, van de maag en der lever.

§. 1100.

Nogtans worden de Ontstekingen van den Onderbuik bij den aanleg §. 1099 zoo veel te ligter te weeg gebragt, wanneer nog bijzondere schadelijke invloeden derzelve ontstaan in de zwangerheid begunstigen. Daartoe behooren menigvuldige verkouding, voornamelijk eene te dunne kleeding van den onderbuik na voorafgegane verhitte, het blootvoets loopen, het gebruik van te verhittende spijsen en dranken, het innemen van zeer verhittende afdrijvende middelen, inzonderheid der sabina, te groote hitte in den zomer, te hevig vermoeijende bewegingen, voornamelijk het dansen. Meestal hebben ook in dit geval verkoudingen het meeste aandeel: zoo kan op eenen koelen zomeravond, of wanneer na voorafgegane onweder en regen, gelijk zulks in ons klimaat zoo gewoon is, de dampkring spoedig koel wordt, en dan bij eene Zwangere, die zich op zulk eenen tijd aan verkouding blootstelt, in den heetsten zomer even zoo goed ontsteking van den onderbuik ontstaan, als in het barste jaargetijde, in den koudsten winter, wanneer de noordewind bijzon-

zonder aanleiding tot ontstekingen geeft. Een der schadelijkste invloeden, welke de ontsteking van den onderbuik, bijzonder echter Peritonitis, te weeg brengen, is het vast rijgen en knellen van den onderbuik, door ijdelheid of schaamte, om de zwangerheid verborgen te houden.

§. 1101.

Het ontstaan der bijzondere soorten van Onderbuiksonststekingen in de zwangerheid wordt echter ook meestal weder door den zamenloop van eigenaardigen aanleg en medewerkende schadelijke invloeden begunstigd. Zoo zijn, wel is waar, diegenen, welke Peritonitis veroorzaken, in het algemeen dezelfde, welke §. 1100 opgegeven werden; doch de uitzetting van het peritonaeum, welke hetzelfde in de zwangerheid wegens deszelfs celachtige gesteldheid ondergaat, schijnt eene der gewigtigste oorzaken te zijn, die tot overhelling en het ontstaan der Peritonitis in de zwangerheid aanleiding geven; hevige inspanning des ligchaams, waardoor de buik zeer gedrukt wordt, knelling van den onderbuik door naauwe kleederen, of de gewoonte om met het lijf tegen een hard ligchaam aan te leunen, aanhoudend zitten met het hoofd voorover, een val of stoot op den onderbuik, en dan onmiddellijke verkoudingen van denzelfden bij eene dunne kleeding, of des nachts in het bed schijnen de Peritonitis reeds in de zwangerheid voornamelijk te weeg te brengen.

§. 1102.

De Gastritis wordt bij Zwangeren of in de eerste of op de laatste maanden der zwangerheid waargenomen; in de eersten kan ligt het zoo gewoonlijk op dien tijd plaats hebbende braken daartoe aanleiding geven, wanneer het zeer aanhoudend is, en door de Zwangeren, om het te stillen, zeer verhittende dranken en geneesmiddelen gebruikt worden, bij voorbeeld brandewijn, likeuren, bitterwijnen, maagelixers e. d. g.; in de laatste maanden en voornamelijk in de negende werkt de drukking van den bodem der baarmoeder op de maag, en maakt dezelve zeer tot braken geneigd; doch eene zeer ongewone uitzetting der baarmoeder verwekt zelve nog geene Gastritis, wanneer niet bijzondere invloeden, bij voorbeeld het gebruik van zeer verhittende en specerijachtige spijsen en dranken, het opvullen van de maag met harde, gistende spijsen, het gebruik van zeer hevige braak- of purgeermiddelen, uiterlijk geweld, door hevige gramfchap of ergernis veroorzaakt braken, voornamelijk echter koude dranken en ijs enz. derzelver volkomene ontwikkeling begunstigen.

§. 1103.

De Enteritis doet zich als eene ontsteking in de zwangerheid voor, die of in de dunne, of in de dikke darmen derzelver zetel heeft; gene komt gewoonlijk in de eerste helft tot aan de zesde maand te voorschijn; in de volgende, en voornamelijk in de beide laatste maanden, wanneer de uitzetting en de drukking der baarmoeder meer naar boven en

naar

naar buiten, naar de dikke darmen, tegen den dwarschen, of den regter en linker karteldarm werkt, zal de Ontsteking voornamelijk in dezen ontstaan; dit laat zich door de ondervinding en door den zetel en de rigting, welke de pijn neemt, aanwijzen. De invloeden, welke de Enteritis in de zwangerheid kunnen te weeg brengen, zijn afdrijvende middelen bijzonder in de eerste maanden uit sabina of aloë, drastische purgatiën, verkoudingen van den onderbuik en der voeten, uiterlijke gewelddadigheden, hardnekkige verstoppingen, kolijken en voornamelijk derzelver verkeerde behandeling, de persloop, een koude dronk, bijzonder onmiddellijk na gramfchap of voorafgegane verhitte, bekleemde breuk, enz.

§. 1104.

De Hepatitis ontstaat gewoonlijk in de achtste of negende maand der zwangerheid, wanneer de drukking van den bodem der baarmoeder bijzonder op het holle deel der lever werkt, en de afzondering der gal kan tegengaan; doch het ontstaan eener ontsteking vooronderstelt gewoonlijk een ziekelijk orgaan, of eenen zekeren aanleg tot Leverontsteking en geelzucht, terwijl zeer dikwijls Zwangeren bij de grootste uitzetting der baarmoeder in de zwangerheid toch geene Leverontsteking bekomen. Zulke Vrouwen zien er ook buiten de zwangerheid geelachtig uit, zijn tot hartzeer, verdriet, ergernis en zelfs tot hevige gramfchap geneigd, waardoor er meer galstof bij dezelve in het bloed afgescheiden wordt, en zoo verkeeren zij in de zwangerheid ligt in

gevaar, van door eene Leverontsteking aangetast te worden, voornamelijk wanneer ook de weersgesteldheid, bij voorbeeld, heete zomer met koele avonden, gedurende welke zich Zwangeren bij eene te dunne kleeding van den onderbuik ligt aan verkoudingen blootstellen, de ontwikkeling dezer ziektevorm zeer bevordert. Soms lijden Zwangeren ook aan galsteen, verhardingen, gezwollen en knobbeis in de lever, als wanneer bij de uitzetting der zwangere baarmoeder de vrije terugvloed van bloed door den onderbuik naar het hart, zoo als deszelfs wegvloeiing uit hetzelfde, bezwaarlijk wordt gemaakt, en dan ligt een' aanleg tot Ontsteking der Lever moet te weeg brengen. Daardoor zijn ook Zwangeren tot Miltontsteking geneigd, welke in dit orgaan en deszelfs belangrijke vaten tot verstoppingen aanleiding kan geven; doch ook hebben verkoudingen van den onderbuik, na verhitte in den zomer bij koele avonden, daarin een bijzonder aandeel, of de Miltontsteking is ook een gevolg van ontstekingen van naastgelegene organen, bij voorbeeld, der lever, van het buikvlies, enz.

§. 1105.

De Ontsteking der Nieren kan door de drukking der zwangere baarmoeder alsdan ontstaan, wanneer er reeds een aanleg tot deze ziekte inzonderheid bij zoodanigen plaats vindt, die aan steen en graveel, of menigvuldige storingen in de pisafscheiding ook buiten de zwangerheid lijden. Echter moet de drukking der baarmoeder bijzonder naar

de lendenstreek plaats hebben, zoo als men die bij het scheefliggen der baarmoeder naar de eene of andere zijde, of ook dán waarneemt, wanneer deze in de laatste maand der zwangerheid niet naar voren zakt, maar achterwaarts in eenen hooger en graad dan naar voren zich uitzet, hetgeen het gevolg eener eigenaardige vorming van de ruggegraat zijn kan. Buitendien kan de Ontsteking der Nieren op verkouding bij en op nat en koud weder, bijzonder in den herfst en in het voorjaar, volgen, of zij ontstaat ook door uiterlijke gewelddadigheden, door eenen val, slag, stoot, drukking der lendenstreek, bijzonder bij het aanhoudend liggen op den rug, door het ophouden der pis, door scherpe, prikkelende, diuretische middelen, door hevige schuddingen en inspanningen van het ligchaam, bijzonder door varen, rijden, en door andere dergelijke invloeden, welke de Ontsteking der Nieren ook buiten de zwangerheid veroorzaken.

§. 1106.

De Ontsteking der Pisblaas neemt men wel op iederen tijd der zwangerheid waar; maar het menigvuldigste komt zij toch in de tweede of in de beide laatste maanden voor; want op dien tijd hebben er voornamelijk aanleidende oorzaken plaats, welke derzelver ontstaan zoo zeer begunstigen: de drukking der baarmoeder, welke in de tweede maand dieper in het kleine bekken zakt, waarbij ook de bodem der blaas ten deele verdrongen wordt; de drukking van het hoofd vooral in de beide laatste maanden der zwangerheid, wanneer het dieper

E e 2

dan

dan gewoonlijk in het kleine bekken zakt, en zeer groot is; de in de laatste maand bijzonder als een gevolg der sterkere helling van het bekken zeer overhangende baarmoeder, geven zeer dikwijls aanleiding tot Strangurie, Dysurie of Ischurie, welke Ontsteking der Pisblaas ten gevolge hebben (*). Bij de zwangerheid buiten de baarmoeder wordt de Cystitis ook waargenomen als een gevolg der werktuigelijke drukking en van den ontstekingsprikkel, inzonderheid wanneer het ei zich in de nabijheid der pisblaas vasthecht en het hoofd van het Kind aanvangt, om over het scheedegezwel in het bekken te zakken. Buitendien kunnen he-

(*) Zoo behandelde de Schrijver eene jonge Vrouw, die voor de eerstemaal zwanger was, en zes dagen aan Ischurie leed, waar reeds Ontsteking der Pisblaas bijgekomen was; zij was in de tweede maand harer zwangerheid. Hij dacht aanstonds aan de mogelijkheid eener achteroverbuiging der baarmoeder, doch bij het onderslaan werd zulks niet bevestigd; de baarmoeder stond diep tusschen de middelste en onderste opening van het bekken, en uit hoofde van hare beroepsbezigheid — zij was de vrouw van eenen bakker — moest zij, hetgeen zij vóór haar huwelijk niet gewend was, den ganschen dag aan de toonbank met het hoofd voorover zitten, waardoor de drukking op de pisblaas vermeerderd werd; tevens kon ook altijd verkouding daaraan deel hebben, waaraan zij wegens togt aan het venster blootgesteld was, bijzonder omdat zij wegens de groote hitte van den oven, en het daardoor gedurige zweeten, voor den nadeeligen invloed der koude vatbaarder werd.

hevige uitwendige drukking der schaamstreek, bijzonder door naauwe kleederen en te vast rijgen van den buik, achteroverbuiging of uitzakking der baarmoeder, eene ongeschikte aanwending van den catheter, of het aanhoudend dragen van een' moederring, verkoudingen bijzonder in den herfst en winter door te dunne bedekking der schaamstreek, door het gebruik van koude dranken, voornamelijk van te koud bier, van mos na voorafgegane verhitting enz. Ontsteking der Pisblaas te weeg brengen.

Uitgang en Voorzegging.

§. 1107.

De Ontstekingen van den Onderbuik kunnen, wel is waar, in alle uitgangen deelen, welke zij ook buiten de zwangerheid hebben; dat is: zij kunnen in ettering, verharding, vergroeiing en koudvuur overgaan; doch het is merkwaardig, dat zij, inzonderheid de Peritonitis en Enteritis, aanhoudender zijn en langer' tijd dan buiten de zwangerheid duren, en dat zij in deze slechts zeer zelden in koudvuur overgaan. De Peritonitis muscularis, bij welke Zwangeren dikwijls verscheidene weken over eene vaste pijn in den onderbuik klagen, en die niet algemeen in het buikvlies verspreid is, brengt geen groot gevaar aan en gaat somtijds over, wanneer er eene bloedvloeijing der baarmoeder ontstaat, of zij bepaalt zich tot eene vergroeiing van het Peritoneum met het net, of der buikspieren aan de pijnlijke plaats; somtijds blijft er eene verharding na, die men duidelijk onderscheiden kan. De Peritonitis,

tis, welke in de negende maand bij eene grootere uitzetting der baarmoeder ontstaat, vermindert in de laatste maand, wanneer de buik geslonken is; indien echter de Peritonitis eerst op dezen tijd ontstond, bijzonder na voorafgegane verkouding algemeen in den buik verspreid is, en met koorts, die het kenmerk van Synocha heeft, gepaard gaat, dan doet zich dezelve eerst na de verlossing meestal in een' verschrikkelijken graad voor, wanneer nog in de zwangerheid de gepaste behandeling, bijzonder aderlatingen verwaarloosd werden, en dan ontstaat gewoonlijk de gevaarlijkste, meestal doodelijke kraamkoorts. — Enteritis, welke bij Zwangeren in de eerste drie maanden ontstaat, veroorzaakt ligt abortus, gaat in de laatste maanden, voornamelijk wanneer zij in den kartel- of endeldarm haren zetel heeft, ligt tot ettering over, waarbij diarrhéen komen; de Zwangere vermagert daarbij zeer, er volgt eene slepende koorts op, en na de verlossing, zij moge te vroeg of op den behoorlijken tijd plaats hebben, is de dood meestal onvermijdelijk. — De Leverontsteking in de zwangerheid is wel niet gevaarlijk, maar gaat toch veel moeilijker over, en zoo zij in de negende maand ontstaan ware, dan vermindert zij eerst in de laatste, echter volkomen na de geboorte: voor het overige gaat zij in de zwangerheid ligter tot verharding dan tot ettering over. — De Ontsteking der Nieren bij Zwangeren, welke niet uit den steen haren oorsprong heeft, is niet zoo gevaarlijk; de Ontsteking verdeelt zich, zeldzamer nog gaat zij in de zwangerheid tot ettering en verharding over, doch keert zeer ligt na de ver-

los-

lossing met het volgende kraambed in een' hoogen graad terug. — Geene ontsteking veroorzaakt zoo ligt abortus, als de Cystitis bij Zwangeren, wanneer zij in de eerste drie of vier maanden te voorschijn komt, en bijzonder het gevolg of de oorzaak eener achteroverbuiging of uitzakking der baarmoeder is; na den abortus wordt dezelve veel gemakkelijker verdeeld, doch veroorzaakt niet zelden voor een' korter' of langer' tijd een onvermogen tot terughouding van pis, hetwelk een gevolg eener nablijvende asthenie en atonie, of eener scheuring der pisblaas zijn kan. Ontsteking der Pisblaas in de laatste maand, waaraan de drukking van het zeer diep in het bekken gezakte hoofd deel heeft, verdeelt zich moeilijker, en gaat ligt tot koudvuur of ettering over, wanneer er beleedigende proeven met den catheter genomen worden, om de pis bij de gewoonlijk haar verzellende Ischurie te ontlasten. In twee door den Schrijver waargenomene gevallen eener zwangerheid buiten de baarmoeder, was de pisblaas in derzelver ganschen omtrek geheel plat gedrukt en zoo dik als kalfsleder geworden.

Geneeswijze.

§. 1108.

Alle Ontstekingen van den Onderbuik in de zwangerheid vereischen de antiphlogistische geneeswijze; echter moet er dikwijls eene zekere keus in de middelen zelve plaats vinden, welke zich naar den graad en naar het bijzondere karakter der ontsteking

rigt, en dan moet dikwijls daarbij nog op zekere bijzondere oorzaken en omftandigheden gelet worden, welke in de zwangerheid zelve en derzelve veranderingen haren grond hebben.

§. 1109.

Indien het Peritonitis is, en de pijn zich algemeen in den onderbuik verspreid heeft, deze ten uiterste gevoelig, de hitte des ligchaams brandende, droog, de pols klein, eenigzins hard, of ook vol is, de Zwangere een prikkelbaar gestel heeft, de wangen door een brandend rood begrensd zijn, de Ontstekking door verkouding, bijzonder na voorafgegane verhitte, ontstaan is, en voornamelijk in de laatste maanden der zwangerheid zich voordoet, dan zijn algemeene aderlatingen dringend aangewezen, totdat de pijnen verminderen en de pols zachter wordt. Als de bloedontlastingen voornamelijk in de laatste maand verzuimd worden, en de Zwangere met Ontstekking en koorts in het kraambed komt, dan is de ziekte meestal doodelijk, er ontstaat een verzwakkend zweet, de ontstekingskoorts neemt dan spoedig het karakter eener zenuwkoorts aan, inzonderheid wanneer de verlossing zeer verzwakkend en met veel bloedverlies vergezeld was. Voor het overige kunnen er bij de Peritonitis in de zwangerheid aderlatingen in eene grootere menigte gedaan worden, dan bij die in het kraambed. Buitendien wordt in de gemelde gevallen het nitrum in een slijmig afkookfel aanbevolen; voornamelijk wanneer de lijderes voor de eerstemaal zwanger, zeer prikkelbaar en volbloedig is, de onder-

derbuik door de baarmoeder zeer uitgezet en gedrukt wordt, en de Ontsteking op eene voorafgegane verkouding volgde; daarmede vereenige men inwrijvingen met laauwwarme oliën, matig warme stovingen en klisteren van verzachtende kruiden, bijzonder met het bilzenkruid, en laauwe baden. Als de pijn en de koorts ophouden, dan geve men het liquor ammonii aceticus, insgelijks met slijmige afkooksels vermengd.

§. 1110.

Zit de pijn bij de Peritonitis slechts op éene plaats, en is zij niet algemeen verspreid, heeft ook de koorts geen en zoo hoogen graad bereikt, dan zijn bloedzuigers aangewezen; naderhand gaat men tot de §. 1109 gemelde stovingen in den vorm van pappen over, en houdt daarop de pijn nog niet op, dan blijft, volgens des Schrijvers meermalen gedane waarnemingen, de inwrijving der mercuriaal- en altheazalf één der werkzaamste middelen, hetwelk men dan ook aanbevelen kan, wanneer ten gevolge der Ontsteking van de Peritonitis enkele verharde plaatsen nablijven, welke de toenemende uitzetting der baarmoeder of de in het vervolg plaatshebbende geboorte bij het verarbeiden der weeën pijnlijk maken.

§. 1111.

Gaat de Ontsteking gedurende de zwangerheid in ettering over, dan zijn de teekens: het ophouden der pijnen, meermalen koude en huivering, menigvuldiger en golvende pols, sluipende koorts

des avonds, en troebele pis met een etterachtig bezinkfel. Bij dezen Uitgang der Ontsteking volgt in het gelukkigste geval opflorping van den etter (*), of er ontstaat een ettergezwel naar buiten, hetwelk doorbreekt, en den etter ontlast, of dezelve hoopt zich op onder de verdubbeling van het Peritonaeum in het bekken, verspreidt zich tot aan het dijgewricht, er ontstaat caries aan de beenderen van het bekken, of van de dij, en de dood. — Bij den gelukkigsten Uitgang trachte men de opflorping te bevorderen, het overige der Ontsteking te verdeelen, en daardoor de ettering te beperken. Tot dat einde worden de calomel in kleine giften en inwrijvingen der mercuriaalzalf aanbevolen, waarmede men ter bevordering der opflorping van den etter het liquor ammonii carbon., de flores arnicae, rad. seneg. — squilla, de digitalis purpurea en de kamfer vereenigt. — Als er uitwendig — meestal boven de schaambeenderen aan den onderbuik of in de heupstreek — een ettergezwel gevormd wordt, dat doorbreken zal, dan bevele men verzachtende (*emollientia*) en ettermakende middelen (*maturantia*), en bespeurt men fluctuatie, dan make men voorzigtig gebruik van eene incisie, om het indringen der buitenlucht te beletten. Wanneer

(*) Onder meerdere door den Schrijver waargenomen gevallen, behoort hier deszelfs gelukkige genezing eener Peritonitis en Psoitis bij eene Zwangere, met derzelver gevaarlijke gevolgen, medegedeeld in zijn *Journal für Geburtshülfe, Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten*, I. B. 1e. St. S. 141.

er caries en eene sluipende koorts ontstaat, dan kina, bevordering der reproductie en zoodanige behandeling, welke in de derde Hoofdafdeeling breedvoerig zal verhandeld worden. — De verlossing verhaaste men nimmer zonder dringende aanwijzing, inzonderheid wanneer de Zwangere de beweging van het Kind gestadig voelt, en er nog geene weeën plaats gehad hebben; alleen in dit geval, en wanneer de Barendes zoo verzwakt is, dat de geboorte niet door eigene werkzaamheid der Natuur, of alleenlijk met volkomene uitputting zou kunnen geschieden, is de kunstmatige verlossing aangewezen.

§. 1112.

De Gastritis, welke bij Zwangeren van een prikkelbaar volbloedig gestel, bijzonder op het gebruik van zeer verhittende spijsen en dranken, en daarop gevolgde verkouding, of op het drinken van zeer sterke likeuren, brandewijn e. d. g. om het braken of andere ziekelijke storingen der digestie weg te nemen, ontstond, met een hevig branden in de maag, zeer gespannen en pijnlijke praecordia, met eene Synocha, en met vollen, sterken, eenigzins harden pols verzeld is, vereischt dringend eene algemeene of plaatselijke bloedontlasting. Daarmede vereenigen slijmige, olieachtige middelen en laauwe, slijmige en waterachtige dranken, verzachtende klistieren, en bij eene grootere uitzetting der baarmoeder in de negende maand de olieachtige inwrijvingen en verzachtende stovingen op de maagstreek. Grenst de koorts bij de Gastritis meer aan den Synochus, neemt men meer in het oog loopende gastrische symp-

symptomata waar, zijn schadelijke stoffen oorzaak, is de tong beflagen, de lijderes niet zeer prikkelbaar en volbloedig, alsdan alleen is de bloedontlasting of ten eenenmale ongeraden of alleenlijk met bijzondere voorzigtigheid aan te bevelen.

§. III3.

De Enteritis, welke in de eerste helft, bijzonder in de eerste drie maanden, in de dunne darmen zich openbaart, en een gevolg van hevige verkouding na voorafgegane verhitting of van het gebruik van zeer sterke afdrijvende middelen is, vereischt spoedige hulp, wanneer men den zoo ligt te ontstaan abortus wil voorkomen; algemeene en plaatselijke bloedontlastingen, olieachtige en slijmige middelen met het nitrum in kleine giften, laauwe dranken en klisteren, verzachtende stovingen, bijzonder in den vorm van pappen, inwrijvingen met olie van bilzenkruid zijn hier inzonderheid aangewezen. De Enteritis, welke in de laatste maanden der zwangersheid ontstaat, en voornamelijk de dikke darmen aangetast heeft, vereischt wel dezelfde behandeling, wanneer de vergezellende koorts eene Synocha is; doch verschijnt ook veel menigvuldiger als Synochus, en er worden dan ook zacht ontlastende middelen uit wijnsteen, tamarinden en manna met nut aangewend. Als voor het overige de Enteritis in de dikke darmen zich niet verdeelt, dan gaat zij zeer ligt tot ettering over; alsdan worden voornamelijk in- en uitwendig verzachtende middelen, laauwe halfbaden uit melk of een aftreksel van verzachtende kruiden aanbevolen, en zoo er nu etter met

den

den stoelgang zich ontlast, etterachtige, slijmige en waterachtige diarrhéen plaats hebben, geene Ontsteking meer voorhanden is, dan wordt de kina, de columbowortel, de myrrhe en de IJslandsche mos, voornamelijk met melk afgekookt, tot inwendig gebruik toegediend. Deze diarrhée echter wordt zeer moeilijk weggenomen, er komt eene sluipende uiterende koorts bij, de geboorte volgt meest al te vroeg en de dood in het kraambed des te zekerder, naar mate reeds de lijderes zeer verzwakt werd, en er ten gevolge der ettering aanmerkelijke storingen in de bewerktuiging der darmen ontstaan zijn.

§. IIII.

De Leverontsteking vereischt insgelijks bij Zwangeren dringend de antiphlogistische geneeswijze; één der onontbeerlijkste middelen is de bloedontlasting, bijzonder bij volbloedige, irritabele, sterke gestellen, wanneer de koorts het karakter eener Synocha heeft, en de ziekte in dat jaargetijde ontstaat, hetgeen der Ontstekingsziekten zeer gunstig is. Buitendien kan, wel is waar, de Leverontsteking van een' Synochus vergezeld zijn, in welken, bijzonder bij hevige pijnen, de aderlating wel niet verzuimd, maar alleen met meerdere voorzigtigheid moet aangewend worden. Met den Typhus zal er in de zwangerheid niet ligt eene Leverontsteking te voorschijn komen; doch bij zoogenaamde chronische Leverontstekingen, of veeleer bij diegenen, welke een meer langzaam beloop en bijzonder in het holle deel der lever derzelve zetel hebben, door zwakkere invloeden veroorzaakt worden, geenen grooten om-

omtrek beslaan, en meer zwakkelijke, niet zeer prikkelbare, volbloedige Zwangeren aantasten en niet door zeer in het oog loopende verschijnselen gekenmerkt worden, zijn de bloedontlastingen niet aangewezen; meestal ontstaat bij zoodanige personen de Hepatitis meer door kommer, verdriet, treurigheid en vrees, als zijnde van eene zwakke lichaamsgesteldheid, en de verrigtingen der digestie en assimilatie bij haar gestoord. De koorts, die de Ontsteking verzelt, draagt het kenmerk van den Synochus.

§. III5.

Behalve de bloedontlasting, wordt bij de Leverontsteking der Zwangeren, die van een zeer volbloedig, irritabel gestel zijn, het nitrum aangeprezen, wanneer de zetel der Ontsteking meer aan de bolle zijde der lever is, dezelve in den winter of in het voorjaar ontstaat, bij eene vaste en stekende pijn, bij eenen vollen sterken pols, sterken dorst, roode wangen, pijnlijke ademhaling enz.; zoodra echter de ontstekingstoestand na de bloedontlastingen en na het eenigen tijd aanhoudend gebruik van het nitrum opgehouden heeft, gaat men over tot de calomel, welke in de zwangerheid in grootere giften bij ontstekingstoestanden kan gegeven worden, omdat het zeldzamer kwijling veroorzaakt. — Bijaldien echter de Leverontsteking meer van eene ontstekingachtige galkoorts verzeld is, dezelve zich meer in den heeten zomer, of ook na verhitte en hevige hartstogt openbaart, dan is de wijnsteen, het zoogenoemde bruispoeder, uit bitteraarde en wijnsteenzuur, aange-

we-

wezen, doch ook alleenlijk tot in het tweede tijdperk, als wanneer insgelijks de calomel kan aangewend worden; bij zwakkelijke gestellen zij men echter over het algemeen voorzigtiger met het inwendig gebruik van het kwik, men bediene zich of van een' zachteren, minder aantastenden vorm, of verordene hetzelfde alleen tot uitwendig gebruik op de leverstreek. Wanneer voor het overige bij de Hepatitis in de laatste maanden der zwangerheid de drukking der baarmoeder bijzonder op het bolle deel der lever aandeel heeft, dan worden olieachtige inwrijvingen, laauwe voetbaden en het liggen op de linkerzijde aanbevolen.

A. F. LÖFFLER, *über die Leberentzündung bei Schwangern und Wöchnerinnen*; in STARK'S *neuem Archiv*. II. Bd. 1e. St. N°. 7.

§. III 6.

In de Miltoontfteking, welke zich bijzonder door eene diathesis phlogistica kenmerkt, en waarbij de pijn hevig en de pols meer onderdrukt is, wordt de bloedontlasting, en de overige antiphlogistische geneeswijze, het nitrum, de wijnsteen, de tamarinden, de azijnhonig, klisteren uit zeep en verzachtende kruiden, dergelijke stovingen en laauwe halfbaden vereischt. Als de Ontfteking niet zoo hevig, meer in het warme jaargetijde ontstaan is, gastrische verschijnselen met eene neiging tot braken zich voordoen, dan zijn de bloedontlastingen niet aangewezen, maar moeten door ontlastmiddelen, wijnsteen, magnesia met het wijnsteenzuur, tamarinden en zacht ontlastende klisteren, vervangen worden; uitwendig late men de kwikzalf inwrijven,

en

en zoodra de koorts ten eenenmale over is en de lijderes aan de betere hand komt, dan worden het Hallers zuur, de balsamus vitae, de tinctura aurantiorum in kleine giften, de bittere extracten en de zeepachtige middelen aangeprezen.

§. III7.

Bij de Ontfteking der Nieren is vooral ook de bloedontlasting één der voornaamste middelen, inzonderheid, omdat, als men dezelve verzuimt, die ontfteking in de zwangerheid ligter tot ettering overgaat; de aderlating is des te dringender aangewezen, wanneer de Zwangere van een irritabel, volbloedig gestel, de koorts eene met hevige toevallen en pijnen vergezelde Synocha, de ontfteking in den winter op eene hevige verkouding, en bij eene diathesis phlogistica ontstaan, de huid zeer droog, de afscheiding der pis ten eenemaal belet of deze zeer rood en vurig is. Met de bloedontlastingen vereenige men de overige anti-phlogistische geneeswijze; het nitrum in slijmige afkookfels, en, wanneer de Ontfteking der Nieren meer op eene diathesis catarrhalis rheumatica berust, dan wordt de spiritus Mindereri, slijmige, zuurachtige en verkoelende dranken aangewezen; buitendien worden laauwe baden, verzachtende stovingen en klisteren aanbevolen. Wanneer aan de Ontfteking der Nieren steenen tot naaste oorzaak hebben, dan is die meestal met braken vergezeld, hetwelk ook telkens na het gebruik der geneesmiddelen plaats heeft; men moet zich alsdan slechts tot de genoemde dranken en uitwendige middelen bepalen.

§. III8.

Bij iedere Ontsteking der Pisblaas moet men vooraf naauwkeurig onderzoeken, of deze niet door de drukking der baarmoeder, inzonderheid bij eene onregelmatige ligging, of door de drukking van het hoofd onderhouden wordt. Ontstond de Ontsteking der Pisblaas in de eerste maanden der zwangrheid ten gevolge van het dieper zakken of eener achteroverbuiging der baarmoeder; is de vergezellende koorts eene Synocha, de Zwangere zeer prikkelbaar en volbloedig, de pijn over de schaamstreek zeer hevig en brandend; zijn de scheidde, de pisblaas en de uitwendige teeldeelen gezwollen; had de ontsteking des winters en bij aanhoudende koude plaats, en is er een consensueel braken mede vergezeld, ziet de Zwangere zeer rood en gloeiend uit, en is zij zeer benaauwd: dan zijn algemeene bloedontlastingen, en bij een' zachteren graad van koorts bloedzuigers dringend aangewezen; daarmede vereenige men kort daarop olieachtige inwrijvingen, laauwe en verzachtende stovingen, voetbaden en dergelijke klisteren, ten ware de mogelijkheid van derzelver aanwending door de onregelmatige ligging der baarmoeder belet wierde. Tot inwendig gebruik verordene men nitrum en in het aangewezen geval den spiritus Mindereri, zoo als bij de Ontsteking der Nieren is opgegeven geworden. Zoodra het gezwel en de ontsteking niet meer aanwezig zijn, dan laat men de Zwangere op eene der beide zijden met een verhoogd kruis liggen, en zoekt de te diep gezakte baarmoeder door eene ingebragte spons meer

in de hoogte te houden; dadelijk volgt de gewoonlijk belette afzondering der pis van zelve, of men wendt nu met alle voorzigtigheid den catheter aan. Even zoo tracht men bij de voor- of achteroverbuiging der baarmoeder de onregelmatige ligging derzelve naar de grondbeginfelen der Verloskunde te herstellen, en dan insgelijks den catheter aan te wenden, ingevalle de pislozing daarop niet van zelve volgt; zoo zulks geen plaats heeft, en scheuring der pisblaas dreigt, blijft er niets overig dan den blaassteek te doen.

§. 1119.

De Ontsteking der Pisblaas, welke door de drukking van het hoofd of door de scheeve overhangende baarmoeder veroorzaakt wordt, vereischt wel ook de in §. 1118 opgegevene antiphlogistische behandeling, alleenlijk laat men in dit geval eenen buikband ter ondersteuning der baarmoeder dragen, en in het eerste eene ligging op zijde met een zeer verhoogd kruis in acht nemen; het omhoog heffen van het hoofd kan slechts dán van nut zijn, wanneer het nog bewegelijk is; buitendien trachte men slechts door klisteren steeds open lijf te houden, en alles tegen te gaan, wat de drukking op de Pisblaas kan vermeerderen. Wanneer na deze behandeling de pislozing niet volgt, en wegens hevige drukking van het hoofd de aanwending van het catheter zonder gevaar van kwetsing niet mogelijk is, dan blijft ook alleen de blaassteek het eenigste middel. Wanneer er na volkomene verdrijving der ontsteking nog brand en pijnen ten gevolge van de verhoogde gevoeligheid der pisblaas, of min of meer

eene ettering op de eene of andere plaats nablijven, dan worden slijmige middelen met het heulsap of het extract van bilzenkruid geheel bij voorkeur aanbevolen; even zoo zal de kamfer bij de catarrhalische Ontsteking der Blaas in het tweede tijdperk van eene voorname uitwerking zijn.



V I J F D E H O O F D S T U K .
*Over de Koortfen bij Zwangeren.***§. 1120.**

Zwangeren hebben fomwijlen ook aanvallen van Koorts, welke nu eens in een' minderen of meerderen graad, dan weder alleenlijk in het begin, tegen het einde of op iederen tijd der zwangerheid plaats hebben. De Koortfen hebben of het kenmerk van Afwisselende (*remittens*) en verschijnen als Synocha, Synochus of Typhus, of de eene of andere dezer Koortfen neemt het kenmerk aan eener Tusschenpoozende (*intermittens*) of doet zich dadelijk in den beginne als Tusschenpoozende voor.

§. 1121.

Is de Koorts eene Synocha, dan kenmerkt zich de Zwangere reeds voornamelijk door een prikkelbaar volbloedig lichaamsgestel, er had vooraf eene hevige koude plaats, waarop eene aanhoudende hitte volgt; de pols is buitengemeen vol, sterk, hard, schielijk, waarop wel te letten is, omdat de pols eener Zwangere meestal ook buiten den aanval van Koorts voller en sterker slaat; het aangezicht is zeer rood, gloeiend, opgezet, de huid ruw, droog en zeer rood; de oogen zijn levendig en glinsterend, de oogleden pijnlijk; de reuk is verloren; de tong witachtig of hoog rood; de mond en de lippen zijn droog,

de

de tong kleeft aan het gehemelte, de dorst is hevig; de slaap kort, afgebroken; de stoelgang zeldzaam, zeer droog; de pis gering, hoog rood, vlammend; het ademen, offchoon niet moeilijk, toch snel, diep ophalend en heet; de pols staat in verband met de ademhaling, want hoe sneller de pols slaat, des te gezwinder is de ademhaling; de hitte der Koorts is dadelijk sterk en over het geheele ligchaam verspreid, tegen den avond en gedurende den nacht toegenomen, tegen den morgen eenigzins aan het afnemen; zij staat voor het overige altijd in evenredigheid met het toenemen van de hardheid en snelheid van den pols, en met de gewigtigste toevallen der Koorts; zij is niet zoo bijtend en brandend, als bij de Rotkoorts (*typhus putridus*). In den hevigsten graad verschijnt ook wel eene hevige en woedende ijshoofdigheid (*deliria ferocia et furiosa*), en alle verrigtingen der irritabiliteit, voornamelijk de spierkrachten, zijn buitengemeen verhoogd.

§. 1122.

Wanneer de Koorts een Synochus is, dan is de voorafgegane koude matig, niet zoo rillend, hevig en aanhoudend, als bij de Synocha en de tusfchenpoozende Koortfen; eveneens is het met de hitte gesteld; de pols is zeer menigvuldig en snel, meer zacht en nimmer zoo hard als bij de Synocha, de krachten der Zwangere zijn meer ter neêr gedrukt, zij gevoelt eene drukking op het voorhoofd, dofheid, duizeligheid, hevige pijnen aan het voorste deel van het hoofd en in de ruggegraat, trekkende pijnen in de dijen en knieën; de verrigtingen der repro-

ductie voornamelijk der digestie en assimilatie gaan traag; de eetlust is verminderd, daarbij komt dadelijk in den beginne misfelijkheid, matheid, lusteloosheid, betrokkenheid, geelachtige gelaatskleur, blaauwe kringen om de oogen, een lijmige leelijke smaak, morsige, wit of geel beslagene tong, walging, neiging tot braken, werkelijk braken, drukking op den hartkuil, saffraangele, dikwijls zeer gebondene, hoog roode of lijmige, troebele pis, miskleurige afgang, groen, zwart, bruin of met veel slijm vermengd, van een' doordringenden, stinkenden reuk, zeer menigvuldige diarrhëen, of ook verstopping van den stoelgang, enz.

§. 1123.

Bij den Typhus, dien men bij Zwangeren zeldzamer waarneemt, gelijk zulks de typheuse epidemiën bewijzen, gaan gewoonlijk ook hitte en koude vooraf, die echter zoo hevig niet zijn, wanneer dezelve oorspronkelijk, en niet het gevolg van eenen Synochus is, bijzonder wanneer die door eene herfenontsteking te weeg gebragt wordt. De Zwangere klaagt over eene buitengemeene zwakte, de pols is trillend, ongelijk en zwak, er vertoonen zich verscheidene zenuwtoevallen, beven, huiveren, krampen, hartkloppingen, benaauwdheid, draaijing vóór het hoofd, duizeligheid, ijlhoofdigheid, groote onrust, slapeloosheid met afwisselende slaapzucht, neêrslagtigheid met afwisselende opgeruimdheid en levendigheid, angstige gedachten, suizen der ooren, menigmaal hardhoorendheid, dan weder te scherp gehoor, peestrekkingen, stuipen, algemeene en plaatselijke verlammingen; de pis is waterachtig,

achtig, melk- of zemelachtig, in eene tamelijke menigte; nu eens hard- dan weder loslijvig; de hik; het ademen geheel vrij, doch afwisselend en gewond; de huid geheel droog, of ook met veel zweet bedekt; bij Zwangeren hebben ligt bloedvloeijingen uit de baarmoeder of neusbloedingen plaats; de krachten verminderen telkens meer en meer, er volgen flauwten, stuiptrekkingen, groote beklemdheid en na eene korte schijnbare beterschap, en ophouden der hevigste verschijnselen, volgt de dood. De Zenuwkoorts kan echter zelve wederom bij Zwangeren als nervosa inflammatoria, gastrica, pituitosa en putrida verschijnen; de beide eerste complicatiën zijn de gewoonlijkste, en de inflammatoria zag de Schrijver bij Zwangeren altijd met phrenitis verzeld.

§. 1124.

De tusfchenpoozende Koorts, welke niet zelden bij Zwangeren na eene remittens plaats heeft, onderscheidt zich door eene zeer sterke koude, waarop eene hevige hitte, vervolgens een algemeen zweet volgt, en wanneer dit over is, eene zoogenoemde koortsvrije tusfchenruimte, apyrexie, plaats grijpt. De Koorts zelve kan eene derdendaagfche, anderendaagfche of alledaagfche zijn; ja de anderendaagfche, volgens de waarneming van den Schrijver, in eene alledaagfche overgaan, welke dan bij Zwangeren eenen ontstekingsachtigen aard aanneemt, en daarom zoo ligt in de hitte op eene bloedstorting of neusbloeding uitloopt. Daarnaar rigt zich ook de koude, die, zoo als bekend is, bij de derdendaagfche Koorts het hevigste, minder fterk in de

anderendaagsche, het geringste in de alledaagsche is. Bij Zwangeren kan men voornamelijk bij de tusfchenpoozende Koorts vele gastrifche verschijnselen befpeuren, bij voorbeeld, eene beflagene tong, een' lijmigen, zelfs bitteren fmaak, afkeer van vleesch, fletsheid van het aangezigt, eene troebele, lijmachtige pis. Zelden is de tusfchenpoozende Koorts bij Zwangeren van eenen zenuwachtigen aard; doch fomwijlen neemt men de syncoptica waar, welke bij herhaalden paroxismus ligt met den dood eindigen kan, inzonderheid wanneer de geboorte gelijktijdig met den aanval van Koorts plaats heeft.

Oorzaken.

§. 1125.

Alle invloeden, welke eene Koorts buiten de zwangerheid veroorzaken, kunnen ook deze in de zwangerheid te weeg brengen; doch menige Zwangere helt flechts naar deze of gene foort van Koorts over.

§. 1126.

De Synocha is die foort van Koorts, welke het meest voorkomt, en zich openbaart ten gevolge van de opftopping der maanftonden, als eene belette ontlasting, en uit hoofde der in de zwangerheid bovendien verhoogde levenskracht van het irritabele ftelfel, bijzonder bij degenen, welke bij een in het oog loopend prikkelbaar geftel zeer verhittende en fterk voedende fpijzen en dranken gebruiken, zeer prikkelende afdrijvende middelen innemen, en na eene voorafgegane verhitting zich aan plotfelijke ver-

verkouding blootstellen, voornamelijk in dat jaargetijde, hetwelk buitendien voor het ontstaan der Synocha gunstig is. De Synocha kan dan of uit het gestel of uit het orgaan haren oorsprong nemen; in het laatste geval kan zij een gevolg der ontsteking van ieder orgaan zijn: zoo neemt men dezelve waar bij de phrenitis, bij de peripneumonie en voornamelijk bij eene ontsteking in den onderbuik.

§. 1127.

Voor den Synochus hebben de Zwangeren ook een' bijzonderen aanleg, omdat menige verandering in de zwangerheid ook het naast op de organen der digestie en assimilatie werken; echter wordt dan de Synochus zoo veel te ligter bij diegenen te weeg gebragt, welke vele sappen verliezen door niet aangewezenen aderlatingen, door bloedstortingen, braken, diarrhéen e. d. g., waarop treurige gemoedsaandoeningen invloed hebben, hierom inzonderheid bij Zwangeren buiten den Echt, die slechte spijzen gebruiken, eene zittende leefwijze hebben, in vochtige, slechte, ongezonde woningen zich ophouden, enz. Daar echter de Synochus zelf of als eene biliosa inflammatoria, biliosa pituitosa, zeldzamer toch als putrida verschijnen kan, zoo wordt deze of gene complicatie weder door bijzondere, meestal dergelijke oorzaken te weeg gebragt, welke gene ook buiten de zwangerheid plegen te bepalen.

§. 1128.

De Typhus kan in de zwangerheid door alle invloeden ontstaan, welke de levenskracht bijzonder

verzwakken; daar nogtans deze ten gevolge van den eigenaardigen toestand der zwangerheid zeer verhoogd is, zoo ontstaat de Typhus zelden bij Zwangeren, en dan alleen slechts door uitwerking van zeer verzwakkende invloeden, in eenen zeer hoogen graad. De in de zwangerheid zoo zeer verhoogde levenskracht, de toestand van het hooger leven in dezelve, is ook oorzaak, waarom Zwangeren van besmettelijke, epidemische, aanstekende Zenuwkoortsen zelden of nooit aangetast worden, en haar de zwangerheid zelfs voor de aanstekende pest kan beveiligen. Bovendien kan de Typhus nervosus voornamelijk bij zeer gevoelige Zwangeren, met welken ook de gevoeligheid in de zwangerheid de overhand boven de irritabiliteit verkregen heeft, door zulke invloeden opgewekt worden, welke de gevoeligheid onmiddellijk aandoen, met name: treurige gemoedsaandoeningen, buitensporig liefdesgenot enz. De ontstekingachtige Zenuwkoorts kan bij zeer prikkelbare Zwangeren ligter dan buiten de zwangerheid ontstaan, bijzonder na het misbruik van zeer verhittende dranken en afdrijvende middelen.

§. 1129.

De tusschenpoozende Koorts bij Zwangeren wordt meestal aan dezelfde oorzaken toegeschreven, welke dezelve ook buiten de zwangerheid te weeg brengen; de warme, doch vochtige, natte en koude lucht kan derzelver ontstaan voornamelijk begunstigen, waarom men die dan meestal alleenlijk in het voorjaar en den herfst waarneemt. Voor het overige zag de Schrijver dezelve bij Zwangeren ook bui-

buiten dien tijd ontstaan, en zij schijnen menigmaal in eigenaardige veranderingen, welke door de zwangerheid op de irritabiliteit van het lymphatisch stelsel te weeg gebragt worden, haren grond te hebben; daarom duren ook fomwijlen tusfchenpoozende Koortfen de geheele zwangerheid door en wijken voor geen middel, verdwijnen echter van zelve dadelijk na de verlosfing zonder eenig geneesmiddel.

Voorzegging.

§. 1130.

De Voorzegging hangt voornamelijk af van den tijd, wanneer eene Zwangere de Koorts krijgt. In de eerste drie maanden zijn de Koortfen het gevaarlijkste, en hebben meestal een' abortus ten gevolge: dit geldt bijzonder van de tusfchenpoozende Koortfen; de koude is in deze het gevaarlijkste tijdstip; hoe fterker en aanhoudender die is, des te ligter ontstaat er eene miskraam, fomtijds in den aanval zelven of dadelijk als de hitte plaats heeft; het gevaarlijkste is daarom de derdendaagsche, omdat de koude in deze het hevigste is. Remitterende Koortfen, welke in den laatsten tijd der zwangerheid ontstaan, hebben zelden eene ontijdige geboorte ten gevolge, ten zij de Zwangeren er zeer fterk door aangetast worden, en reeds eenen zekeren aanleg daartoe hebben. Wanneer deze Koortfen nog na de geboorte aanhouden, dan worden zij voor de moeder hoogst gevaarlijk, en hebben meestal den dood ten gevolge.

Geneeswijze.

§. 1131.

Bij iedere Koorts, welke eene Zwangere aantast, moet men vooral derzelve soort trachten te bepalen en daarnaar de behandeling inrigten. Het kan eene Synocha, een Synochus, Typhus of Intermittens zijn; de geneeswijze dezer verschillende soorten van Koorts vereischt niets bijzonders; men gaat hier als buiten de zwangerheid te werk, en in dit opzigt kan ook de Therapie in een Handboek over de Ziekten der Vrouwen zeer wel voorbijgegaan worden. Slechts eenige aanmerkingen zullen hier niet ongepast zijn: 1) men geve wel acht op den tijd der zwangerheid, op welken de Koorts komt, en hoe lang deze reeds geduurd heeft; 2) men verzuime nimmer nauwkeurig te onderzoeken, om zich te overtuigen, of de teeldeelen aan het ontstaan der Koorts aandeel hebben, dan of deze en inzonderheid de baarmoeder gewigtige veranderingen, storingen of ziekten aanduiden, welke over het ontstaan der Koorts opheldering kunnen geven; of er al weeën hebben plaats gehad en geene ontijdige geboorte voorhanden zij, enz.; 3) Zwangeren, die de Koorts hebben, moeten de grootste rust in acht nemen; 4) bij de Synocha kan men inzonderheid irritabele Vrouwen, wanneer er eene miskraam op handen is, en in de eerste drie maanden der zwangerheid, onbeschroomd aderslaten; alleenlijk moet men daarmede bij gevoelige Vrouwen, die ook wel in de

de zwangerheid, overeenkomstig de verandering van haar ligchaamsgestel, welke door het hooger leven in de zwangerheid te weeg gebragt wordt, van eene Synocha aangetast kunnen worden, met meerdere omzigtigheid te werk gaan, en niet te veel bloed in ééns aftappen; voor dezulke zijn kleine aderlatingen meer dienstig; 5) met braakmiddelen moet men in de eerste maanden bij degenen, welke tot miskraam geneigd zijn, wel is waar, voorzigtig te werk gaan; indien die echter bij een' Synochus gastricus of biliosus volstrekt aangewezen zijn, moet men dezelve zonder bedenken met de vereischte verliggende middelen aanwenden; het menigvuldig aanhoudende braken, hetwelk dikwijls Zwangeren weken en maanden zonder eenig gevaar doorstaan, kan den Geneesheer des te zekerder aansporen, om braakmiddelen toe te dienen; 6) wanneer gastrische Koortsen purgeermiddelen aanwijzen, dan make men daarvan bij tijds gebruik, zonder immer drastische middelen aan te wenden; het electuarium lenitivum, de tamarinden, de manna, de middelzouten e. d. g. komen hier voornamelijk te pas; 7) wanneer bij tusschenpoozende Koortsen gastrische verschijnselen zich voordoen, dan worden in den beginne ontlastmiddelen aangeprezen, waarop men bittere middelen, welke de digestie bevorderen, en dan eerst groote giften van den koortsbast in substantie volgen laat. Indien de tusschenpoozende Koorts in de zwangerheid naar geen middel wijkt, dan wachte men de verlossing af, en lette of de Koorts naderhand wegblijft, of als tusschenpoozende wederkomt, dan

dan of zij het kenmerk eener remitterende Koorts aanneemt; meestal verschijnt zij als Synochus gastricus, die zeer geneigd is om tot Rotkoorts over te gaan, waarnaar dan de behandeling moet ingerigt worden.



DERDE AFDEELING.

OVER DE ZIEKTEN VAN HET ZENUWGESTEL.

EERSTE HOOFDSTUK.

*Oyer eenige aandoeningen van het zenuwgestel
na de bevruchting.*

Verschijselen.

§. 1132.

Zwangeren hebben na de bevruchting zeer dikwijls eene gewaarwording van huivering, die of alleen in den onderbuik, of over het geheele ligchaam en de extremiteiten verspreid is; of zij worden door eene koude met afwisselende warmte overvallen; kort daarop worden zij door een onaangenaam gevoel, pijnlijke trekkingen in de lendenen en in den onderbuik aangetast, hetwelk meestal met zwaarte en matheid in de dijen vergezeld gaat; vroeger of later komen er ook nog andere verschijnselen bij, zoo als: eene bijzonder ongewone matheid, afkeer voor den geliefde, verdrietelijke luim, tegenzin

in bezigheden, zelfs in zoodanige, die anders de aangenaamste waren; deze of gene verhoogde zintuigen, bij voorbeeld van het gezigt, van het gehoor, verandering in het gevoel, neiging tot hevige, dikwijls zeer ongewone, anders nooit, althans zelden merkbare gemoedsbewegingen, of ook wel dat zij anders daartoe overhellen en nu daarvan vrij zijn, zoo als krankzinnigheid, zwaarmoedigheid, enz.

Oorzaken.

§. 1133.

Verscheidene van de in §. 1132 genoemde verschijnselen zijn dikwijls alleen de gevolgen van eenen bijslaap, die de gevoeligheid van het vrouwelijke lichaam onmiddellijk sterk aandoet, bijzonder bij een uitstekend gevoelig hysterisch gestel; zij hebben dienvolgens reeds zeer dikwijls gelijktijdig met het werk der bevruchting plaats, en met de reeds werkelijk gevolgde bevruchting, waarbij zij alsdan zich des te sterker voordoen, zoo zij ook buitendien bij onvruchtbare omhelzingen plaats hadden.

§. 1134.

Wanneer evenwel de ziekelijke aandoeningen (§. 1133) niet spoedig na de gevolgde bevruchting ophouden, en verscheidene dagen en zelfs langen tijd in de zwangerheid duren, dan ligt de oorzaak zonder twijfel ook in de uitwerking der nieuwe en verhoogde voortbrengingskracht van het teelfstelsel, zoodat naar hetzelfde eene menigte bewerktuigelijke sappen toegevoerd worden, welke de
nood-

noodzakelijke voedingstof tot voeding van den foetus met zijne ontwikkelingswerktuigen bevatten, waardoor klaarblijkelijk de uiterlijke gevoeligheid van het overige Organismus verhoogd wordt. Wanneer men op het gewigtig verband der zenuwen in de geslachtsorganen met dat van het Organismus in het algemeen, alsmede op de algemeene medegevoeligheid, waarin derzelver bijzondere verrigtingen met die van alle overige organen staan, tévens let; wanneer men wijders in overweging neemt, dat de aanvankelijke werkzaamheid ter reproductie van een nieuw ligchaam, op de zamenstemming der werkzaamheid tot reproductie van het individu, en bij gevolg op de gevoeligheid en prikkelbaarheid in de reproductie in het algemeen zulk een' magtigen en noodzakelijken invloed moet hebben, dan zal men het des te gemakkelijker kunnen verklaren, waarom de genoemde verschijnselen bij buitendien zeer gevoelige gestellen als middelbare ziekelijke aandoeningen der gevoeligheid moeten ontstaan. Deze verschijnselen mogen dan ook waarschijnlijk na elk bevruchtingswerk zich voordoen, hoewel niet altijd wegens den geringen graad van gevoeligheid even zeer bemerkbaar, en zijn dan zelfs, zoo zij al duidelijk te voorschijn treden, wederom verschillend naar den individueelen graad van gevoeligheid, en daarom bij sommigen meer in het ooglopende dan bij anderen.

Voorzegging.

§. 1135.

Bij Vrouwen, die ook buiten de zwangerheid aan dergelijke toevallen, bijzonder na elken bijslaap, leden, alsmede bij hysterische, zijn dezelve van geen gevolg en gaan meestal spoedig na de plaatshebbende bevruchting over; zoo zij al verscheidene dagen en nog langeren tijd aanhouden, dan veroorzaken zij, wel is waar, bij sommige Vrouwen onrust en zorgen, maar zijn geenszins gevaarlijk.

Geneeswijze.

§. 1136.

Meestal is er tegen deze ziekelijke aandoeningen (§. 1135) weinig of geene hulp, wanneer zij eenmaal door den toestand der zwangerheid zelve het naast gegrond zijn, en als gevolgen der inzonderheid aangedane verhoogde gevoeligheid zich voordoen. In den beginne behoeft men slechts eenen gepasten leefregel voor te schrijven, waarvan zij, zonder denzelven geheel uit het oog te verliezen, naar omstandigheden meer of min kunnen afwijken; daartoe behooren: 1) rust; 2) een niet te schitterend licht, voornamelijk wanneer de gevoeligheid in een' zeer hoogen graad plaats heeft; 3) men verwijdere alles, wat voor de Zwangere maar eenigzins onaangenaam kan zijn; 4) zij vermijde eenigen tijd den bijslaap, en alle invloeden, welke op de gevoeligheid onmiddellijk werken; bijzonder schadelijk zijn

zijn ook te verhittende spijsen en dranken, welke te zeer prikkelen, en dan de gevoeligheid van het zenuwgestel te zeer verhoogen; 5) men bevele beweging aan in de opene lucht, voornamelijk bij helder weder; 6) bij kwade luim en neiging tot zwaarmoedigheid trachte men de Zwangere te vervrolijken en haar aangenaam gezelschap te verschaffen; 7) men late haar dikwijls een kopje kamillentheë drinken, en bijaldien de Zwangere buitendien van een gevoelig, hysterisch gestel is, en de genoemde verschijnselen een' hooger en graad bereiken, dan worden zoodanige geneesmiddelen aangeprezen, die de verhoogde gevoeligheid verminderen; de liquor C. C. succin., met een aftreksel van kamillen, de gedistilleerde olie van kamillen met vitrioolether, het aftreksel van valeriaan, de tinctuur van bevergeil e. d. g. verdienen hier eene plaats. Uitwendig kan men ook die deelen, welke het naast zijn aangedaan, met dergelijke geneesmiddelen laten inwrijven, zoo als: de vluchtige ammoniak met lavendelgeest, de essentia balsamica e. d. g., of, wanneer het inwrijven niet raadzaam is, dan bedient men zich van warme bedekkingen met flanel, die met de genoemde middelen besprengd wordt.

§. 1137.

Somtijds zijn de verschijnselen (§. 1132) een gevolg van plethora of van te weelderige bloedbereiding en van verhoogde reproductie in het gansche Organismus; meestentijd zijn zulke Zwangeren zeer volbloedig, hebben een prikkelbaar reproductief gestel, een zeer rood levendig voorkomen, eten zeer

voedzame spijsen, en leven over het algemeen in een' zeer gunstigen zorgeloozen toestand, waarbij tevens eene onwerkzame leefwijze komt. In deze gevallen zijn zoodanige middelen aangewezen, welke de te verhoogde werkzaamheid der reproductie en te weelderige bloedbereiding verminderen; door zich koel te houden, geene te voedzame, maar meer verdunnende spijsen uit het plantenrijk, het gebruik van meer koude dan warme spijsen, zachte ontlastmiddelen uit cremor tartari met bitteraarde, ja zelfs met behoorlijke voorzigtigheid aangewende bloedontlastingen, zal men zijn oogmerk bereiken.



T W E E D E H O O F D S T U K .

*Over de hartkloppingen, duizeling, benaauwdheid
en bezwijming der Zwangeren.*

Verschijselen.

§. 1138.

Zwangeren zoowel van een gevoelig als van een irritabel en volbloedig gestel, lijden of in de eerste of laatste maanden harer dragt aan hartkloppingen, duizeling, benaauwdheid en bezwijming, nu eens in eenen minderen, dan eens in eenen hooger graad; meestal is er ook eene buitengemeene neiging tot slapen met eene bijzondere zwaarte in het hoofd mede verzeld, dat zij deswege gewoonlijk met de handen plegen te ondersteunen. Indien de kwaal langer duurt, dan beginnen dikwijls de oogen te fonkelen, de ooren te suizen, er komt hoofdpijn bij, het aangezicht wordt opgezet en rood, hetgeen veeltijds de voorboden van eene aannaderende beroerte zijn.

Oorzaken.

§. 1139.

Men is geneigd, het ontstaan der genoemde toevallen (§. 1138) hier en daar onbepaald aan die vol-

bloedigheit toe te fchrijven, waardoor de zwangerheid zich meestal pleegt te onderscheiden; maar, omdat men dezelve ook even zoo dikwijls bij zeer fterke volbloedige geftellen volftrekt niet waarneemt, en inderdaad de gedurende de zwangerheid in de eerfte maanden voorvallende bloedvloeijingen, bij voorbeeld de weder te voorfchijn komende maanftonden, die ziekelijke aandoeningen in het geringfte niet verminderen, zoo kan in ieder geval de oorzaak niet aan volbloedigheit toegefchreven worden. Hoezeer dezelve bij zeer irritabele volbloedige geftellen, voornamelijk wanneer zij te voren de ftonden zeer overvloedig hadden, in de zwangerheid zeer voedzame en fpecerijachtige fpijzen en dranken gebruiken, en die toevallen inzonderheid bij groote hitte, bij het gebruik van zeer prikkelende fpijzen en dranken, en over het algemeen bij de werking van zulke invloeden voelen toenemen, bij welken de prikkelbaarheid in het vaatftelfel te zeer verhoogd wordt, door volbloedigheit veroorzaakt kunnen worden, en inderdaad ontftaan; zoo kunnen zij aan den anderen kant bij zeer gevoelige geftellen het gevolg der te zeer verhoogde gevoeligheid van het zenuwgeftel zijn, welke bijzonder in de eerfte maanden der zwangerheid door de verhoogde levenskracht en vormkracht in de teeldeelen, en den vermeerderden toevloed van vochten naar dezelve, ontftaat, waardoor een hoogere graad van prikkelbaarheid der zenuwen in de verwijderde organen moet te weeg gebracht worden. De drukking der zwangere baarmoeder kan bijzonder in de laafte maanden der zwangerheid de kwaal wel doen voortduren, maar

zal alleen dezelve nooit veroorzaken; doch meestal hebben Zwangeren buiten de dragt reeds eenen aanleg tot die ziekelijke aandoeningen, waaruit men verklaren kan, dat zij bepaaldelijk alleen aan die toevallen lijden.

Voorzegging.

§. 1140.

Wanneer hysterische en gevoelige zwangere Vrouwen voornamelijk in de eerste maanden door de toevallen (§. 1138) aangetast worden, dan zijn zij nietsbeduidend; gevaarlijker worden zij bij irritable volbloedige gestellen, inzonderheid in de laatste maanden harer dragt; zoo zij in eenen hoogen graad toenemen, dan is er ligt beroerte te vreezen, die een' spoedigen dood ten gevolge kan hebben (*).

Geneeswijze.

§. 1141.

Aan Zwangeren, die aan de toevallen (§. 1138) lijden, moet men de volgende leefregelen aanbevelen, welke, offchoon zij niet altijd dezelve volkomen uit den weg ruimen, echter zeer veel daartoe kunnen bijdragen: 1) zij mogen bijzonder des nachts niet op den rug, maar hooger met het hoofd en het bovenlijf, nu eens op de eene, dan weder op de an-

(*) Reeds drie malen heeft de Schrijver deze bij Zwangeren na de genoemde toevallen op dien tijd zien ontstaan, waarop een spoedige dood volgde.

andere zijde liggen, om de ophooping en de drukking op de darmbeenslagaderen te verminderen; 2) men verbiede het vele zitten, bijzonder met het ligchaam voorover, en rade eene matige beweging en gepastere bezigheid aan; 3) de Zwangeren moeten zich luchtig kleeden en alle knelling van klederen beletten; 4) zij moeten alle te verhittende, vervolgens moeilijk te verteren en winderige spijzen en dranken vermijden; 5) zij mogen niet te warm slapen of zich te warm kleeden, zij trachten zich steeds in eene matige luchtgesteldheid op te houden, en in het algemeen alle invloeden te ontwijken, welke te zeer verhitten en benaauwdheden veroorzaken kunnen; 6) zij moeten steeds voor de vrije verrigtingen van hare ontlastingen, bijzonder voor den stoelgang, zorg dragen; deze wordt niet alleen door een gepast diët, vele beweging en werkzame leefwijze over het algemeen bevorderd, maar ook worden zacht ontlastende klisteren, bijzonder uit een aftreksel van kamillen met zeep, en bij zeer hardnekkige verstoppingen ook zachte purgeermiddelen, met een gelukkig gevolg aangewend.

§. 1142.

Indien de toevallen eenen hooger en graad bereiken en op de genoemde leefregelen niet verminderen, dan moet men, wanneer zij inzonderheid in de eerste maanden der zwangerheid het gevolg eener zeer verhoogde gevoeligheid zijn, zoodanige geneesmiddelen toedienen, welke de prikkelbaarheid in het zenuwgestel opwekken; het liquor ammonii succin., de tinctuur van bevergeil, met een aftreksel van ka-

kamillen of valeriaan, heeft de Schrijver het werkzaamste bevonden; daarmede vereenige men dergelijke middelen om te ruiken en in te wrijven, welke ook veel tot vermindering dier toevallen zullen bijdragen; daarbij moet de Zwangere alle invloeden vermijden, die de gevoeligheid te zeer verhoogen. Indien echter die toevallen zich openbaren bij irritabele en volbloedige gestellen, welke te voren de stonden zeer overvloedig hadden, zeer prikkelend en voedzaam eten gebruiken, de pols vol en hard is, over het suizen in de ooren, hoofdpijn, fonkelen in de oogen enz. klagen, dan is eene aderlating, en de antiphlogistische behandeling in het algemeen met verdunnende spijsen uit het plantenrijk, aan te bevelen, en de in §. 1141 voorgeschrevene leefregelen moeten zeer naauwkeurig opgevolgd worden.

§. 1143.

Doch wanneer er wezenlijk beroerte plaats heeft, en men nog vroeg genoeg geroepen wordt, dan kan het nog gelukken, om de Zwangere te redden. Men geve eene gepaste ligging, en vindt men, ten gevolge van het irritabele en volbloedige gestel, de prikkelbaarheid bijzonder in het vaatgestel aangetast, het gezigt zeer opgezet en rood, het ademen snorkend, de pols zeer gespannen, hard, niet zeer vol en langzaam, dat de handen en voornamelijk de voeten zeer koud zijn, maar het gezigt heet is enz., dan wordt eene algemeene bloedontlasting op den arm en des noods uit de buitenste halsader dringend aangewezen. Behalve

dit late men de borst, de voeten en armen aanhoudend met warme doeken wrijven, en in den mond eenige droppels vlugtige ammoniak gieten, en eenige klisteren uit een aftreksel van kamillen met zeep aanwenden, maar het hoofd, inzonderheid wanneer de bezwijming nog voortduurt, na de haren behoorlijk geschoren te hebben, koud stoven; de stovingen van SCHMUCKER zullen den toevloed van bloed verminderen, en de spanning in de vaten beperken; buitendien kunnen mosterdpappen op de voetzolen, Spaansche vliegpleister op de kuitën, en zelfs op den schedel veel tot vermindering der ophoopingën bijdragen, en de bewustheid weder opwekken. Het spreekt van zelf, dat men in het vervolg nog nadere opheldering trachte te verkrijgen, of niet bijzondere invloeden het ontstaan van den aanval der beroerte begunstigen, om op de verwijdering daarvan te letten. Zoo vereischen indi-
gestiën de bijzondere aanwending van ontlastmidde-
len, bij voorbeeld uit een afkooksel van tamarinde, Glauberzout enz., die men eenige dagen daarna laat gebruiken, en daarbij op een behoorlijk diët acht geeft.

§. 1144.

Wanneer Zwangeren van een gevoelig gestel eenen aanval van beroerte krijgen, de irritabiliteit meer in het zenuwgestel aangetast is, de invloeden, die dezelve te weeg bragten, zulks te kennen geven, de Zwangere minder rood in het aangezicht en meer koud dan warm, de pols klein, krampachtig, of trillende en veranderlijk is, en daarbij toch de
be-

bezwijming en de bewusteloosheid in eene groote mate plaats hebben, dan worden die geneesmiddelen, welke de irritabiliteit in het zenuwgestel spoedig opbeuren, tot inwendig gebruik aangewezen; zoodanige zijn: het liquor ammonii succin., de spiritus sulphurico aethereus, de tinctuur van bevergeil, van amber en muskus met een gesatureerd aftreksel van kamillen en melissen; uitwendig make men gebruik van het wrijven des ligchaams en der extremiteiten, en men bedekke het hoofd met warme doeken, welke met den vlugtigen salmiakgeest, den vitrioolether, of met een ander geestrijk middel bevochtigd zijn, of men late het hoofd met een aftreksel van aromatische kruiden stoven, waaronder men wijn of wijngeest laat mengen. Algemeene aderlatingen zijn in het gemelde geval doorgaans niet aangewezen, doch wanneer het aangezicht somtijds zeer rood is, meerdere bezwijming en merkbare ophooping en plaats hebben, dan wende men plaatselijke bloedontlastingen, bij voorbeeld bloedzuigers of koppen achter beide ooren aan, waarna men, in geval de Zwangere nog niet tot bewustheid komt, mosterdpappen laat aanleggen. Tot verhoeding van herhaalde aanvallen moet de Zwangere de in §. 1141 opgegevene voorschriften met de behoorlijke bepaling streng in acht nemen, en zij moet inzonderheid alles vermijden, wat de prikkelbaarheid van haar zenuwgestel te zeer verhoogt; de geneesmiddelen, welke men noodig vindt in het vervolg voor te schrijven, moeten ook ten doel hebben, om die prikkelbaarheid te vermindern.

§. 1145.

Zou niet bij eenen aanval van beroerte eene verhaaste verlossing (*accouchement forcé*) het middel kunnen worden, om de zieken te redden? De Schrijver kan om gewigtige redenen zich daarvoor volstrekt niet verklaren, wanneer er niet reeds weeen hebben plaats gehad, en de aanval zelf gedurende het baren ontstaan zij; eene verhaaste verlossing zal buitendien geen nut doen, integendeel den dood verhaasten.



DERDE HOOFDSTUK.

*Over de Flauwten bij Zwangeren.**Verschijselen.*

§. 1146.

Zwangeren vallen fomtijds in Flauwten, die met klam zweet, beven der extremiteiten en verlies van alle bewustheid gepaard gaan, en verschillend van duur zijn; zij kunnen slechts verscheidene minuten, maar ook $\frac{1}{4}$ tot $\frac{1}{2}$ uur duren, eer de Zwangeren weder tot bewustheid komen; fomwijlen gaan zij in eene volkomene Asphyxie over.

Oorzaken.

§. 1147.

De naaste oorzaak dezer kwaal is eene voorbijgaande verlamming in de verrigtingen van het zenuwgestel; Vrouwen van een uitstekend gevoelig gestel, van eenen hysterischen aanleg en neiging tot vallende ziekte zijn meer dan anderen aan flauwten in de zwangerheid onderhevig, en deze ontstaan dan bijzonder in het begin van hare dragt, gewoonlijk als een gevolg der verhoogde levenskracht in de teeldeelen, en van den grooteren toevloed van vóchten derwaarts, waardoor de gevoeligheid

van het overige Organismus te zeer verhoogd wordt; tot de zoodanigen behooren: aandoeningen, inzonderheid plotselinge schrik of ergernis, te groote inspanning van het ligchaam, te menigvuldige bijslaap, hevige pijnen door de drukking der in de tweede maand van zwangerheid in het bekken dalende of in de laatste maanden te zeer uitzettende baarmoeder, te sterke en plotselijke uitpuiling van den buik, van daar somwijlen bij eenen hangenden buik, pijnen door de drukking van een groot hoofd, te groot verlies van vochten door aderlatingen, buikzuiverende of afdrijvende middelen, te menigvuldig, aanhoudend braken, bijzonder wanneer de Zwangere daarom gedurende langeren tijd weinig of geen voedsel gebruiken kan, bloedvloeijingen bijzonder uit de teeldeelen, te menigvuldig aanhoudende diarrhëen, eene belediging der baarmoeder enz. Zelden is volbloedigheid er de oorzaak van; intuschen neemt men toch Flauwten bij Vrouwen waar, die vóór hare dragt zeer gevoelig waren, en slechts als een gevolg der verhoogde irritabiliteit meer tot een prikkelbaar gestel overhellen, en meer bloed dan voorheen bereiden; bij dezen schijnen de Flauwten door de prikkeling van het zenuwgestel, ten gevolge der ontstane volbloedigheid, te weeg gebragt te worden.

Voorzegging.

§. 1148.

Flauwten, die dadelijk weder overgaan, zijn van geene beduidenis, zoo min als die, waarmede hysterische gestellen dikwijls vóór de zwangerheid be-
hebt

hebt waren. Maar wanneer eene Flaauwte van langen duur is, de aanval dikwijls wederkomt, deze met hevige hoofdpijn verzeld gaat, er toevallen van vallende ziekte of van stuipen bijkomen, dan is de Flaauwte voor het leven van Moeder en Kind gevaarlijk. Ten deele rigt zich ook het gevaar naar de oorzaak; Flaauwten, die het gevolg van bloedvloeijingen zijn, geven hetzelfde voornamelijk te kennen, het meeste toch, wanneer Flaauwten door eene scheuring der baarmoeder veroorzaakt worden.

Geneeswijze.

§. 1149.

Telkens wanneer eene Zwangere eene Flaauwte krijgt, late men haar vooral op zijde in eene horizontale rigting te bed of op eene sofa liggen, en lette dan op de oorzaak; zoo de Flaauwte aanhoudend is, dan verzuime men nimmer het uit- en inwendig onderzoek, om zich te overtuigen, of niet de geboorte, — hetzij zulks op den gezetten tijd of te vroeg geschiede — een begin genomen hebbe, en of er niet eene uitwendige of inwendige bloedstorting der baarmoeder tot dezelve aanleiding zou kunnen gegeven hebben, dan of de oorzaak in het algemeen in eene zekere gewigtige verandering met het dynamische of mechanische der zwangersheid en geboorte in verband staat.

§. 1150.

Wanneer de Flaauwte alleenlijk een' hysterischen paroxismus tot oorzaak heeft, dan komt de in §. 504 op.

opgegevene behandeling zoowel in het eene als in het andere geval te pas, wanneer invloeden in het algemeen bij verhoogde gevoeligheid Flauwten te weeg brengen, die onmiddellijk op dezen werken, bij voorbeeld aandoeningen, afmatting na eene te groote inspanning van het ligchaam, na het genot van den bijslaap, enz. Worden de Flauwten door hevige pijnen, ten gevolge der dieper in het bekken zakkende baarmoeder in de tweede maand der zwangerheid, te weeg gebragt, dan bevele men rust en eene horizontale ligging met een verhoogd kruis in het bed aan, en ondersteune des noods de baarmoeder door eene ingebragte spons; maar wordt de Flauwte ten gevolge eener te pijnlijke uitzetting der baarmoeder in de negende maand of door de zakking derzelve in de laatste maand der zwangerheid te weeg gebragt, dan is de §. 951 en 952 bepaalde behandeling aangewezen. Indien de Flauwte het gevolg is eener pijnlijke gewaarwording, die door de drukking van het hoofd onderhouden wordt, dan prijzen men insgelijks eene meer horizontale ligging op zijde met een verhoogd kruis aan, trachte alle uit- en inwendige drukking te benemen en late tot ontlasting van den endeldarm menigvuldige klisteren zetten. — Wanneer eene door het misbruik der aderlatingen, van buikzuiverende middelen of door ander verlies van vochten te weeg gebragte zwakte de oorzaak is, dan diene men, behalve een gepast en voedend diët, voornamelijk zulke geneesmiddelen toe, welke de prikkelbaarheid in de zoo verzwakte reproductie opbeuren, zoo als: het heulfap, de aromatische aftreksels met bittere extracten, de

quas-

quassia, de balsamus vitae H., de essentia corticum aurantiorum, de kina, enz. Bij aanhoudende hebbelijke diarrhéen zie men voornamelijk op de oorzaak, waardoor dezelve onderhouden worden, en bepale daarnaar de geneeswijze, zoo als §. 967—§. 974 werd opgegeven. Bloedvloeijingen vorderen de voor dezelve gepaste behandeling, welke hier overgeslagen wordt, dewijl dezelve, behalve die uit de teeldeelen, reeds §. 1074—§. 1081 zijn afgehandeld geworden, en men over de bloedvloeijingen der baarmoeder in de zwangerheid naderhand nog in een bijzonder Hoofdstuk zal spreken. Eene Flauwte, door scheuring der baarmoeder te weeg gebragt, vereischt de in de Verloskunde opgegevene behandeling, en indien deze in het §. 1146 aangehaalde geval uit volbloedigheid mogt ontstaan, dan kan de met de behoorlijke voorzigtigheid aangewende anti-phlogistische methode aangewezen, en bij hevige ophooping en naar het hoofd en aanhoudende Flauwten zullen zelfs kleine aderlatingen, doch bijzonder bloedzuigers, dienstig zijn.

§. 1151.

Eene Zwangere, die, inzonderheid bij eene uitstekende gevoeligheid, zeer tot Flauwten geneigd is, en ligt door de geringste uitwerking daardoor overvallen wordt, heeft de volgende gezondheidsregelen in acht te nemen: 1) zij moet alle invloeden vermijden, waardoor aandoeningen gaande gemaakt worden; 2) zij hoede zich voor verhittende dranken; 3) zij onthoude zich zoo veel mogelijk van den bijlaap; 4) zij drukke het ligchaam niet door nauwe

kleederen; 5) zij vermijde al zulke plaatsen, waar door de zamenkomst van vele menschen de lucht onzuiver en te heet wordt, of waar zij zich aan verkoudingen blootstelt; 6) zij late zich niet te dikwijls kappen, waardoor de haren te zeer getrokken worden, het menigvuldig kammen e. d. g. veroorzaakt ophooping, hoofdpijn en flauwten; 7) wanneer er Flauwten in den morgenstond plaats hebben, bijzonder na het opstaan, zoo lette men, of de aanleiding dáárin te zoeken is, dat de Zwangere te lang nuchter blijft, of dat zij een ontbijt gebruikt, hetwelk haar niet bevalt, en telkens Flauwten ten gevolge heeft; in het eerste geval moet zij vroeger iets nuttigen; als het laatste plaats heeft, moet men een geschikter ontbijt aanraden; 8) men onderzoekte of de Flauwten niet door den reuk van eenig voorwerp in de kamer ontstaan zij; zoo ja, dan moet dat voorwerp weggenomen worden, bij voorbeeld de reuk eener bloem, van tabak, van reukkaarsjes, van pomade, van sterk riekende olie verwe of de indruk eener zekere kleur op het oog, al hetwelk de Zwangere uit hoofde van eenen eigenaardigen afkeer in de zwangerheid niet kan verdragen; 9) zij zorge bijzonder bij hardlijvigheid dagelijks voor open lijf, en vermijde alles, wat dezelve zoowel als winden te weeg brengt; men bevelde derhalve beweging, benevens een' gepasten leefregel, aan, en late, ingeval er winden aanwezig zijn, een weinig melissen- of fenkelwater, of een aftreksel daarvan gebruiken.

§. 1152.

Eene Flaauwte, die in de zwangerheid in eene volkomene asphyxie overgaat, vereischt eene voorzigtige behandeling, opdat men niet door hevig schokkende middelen het ei en den moederkoek te vroeg losrukke, en bloedvloeijingen der baarmoeder, alsmede ontijdige geboorte, te weeg brenge; voornamelijk geldt dit van de aanwending der electriciteit, van het te sterk wrijven, betasten, en dergelijke middelen, welke met te sterke schokking en beweging van het ligchaam gepaard gaan; in plaats van deze en dergelijke middelen, wordt het bedekken met warme doeken, welke met geestrijke middelen natgemaakt zijn, aanbevolen, vervolgens reukmiddelen, en het besprengen van het aangezicht en de borst met koud water; vooral klisteren, inzonderheid van warmen wijn, kamillen en andere aromatische aftreksels met het liquor anodynus, vitriool-ether e. d. g. Daarbij stelle men bij eene in bezwijming liggende Zwangere telkens het uit- en inwendig onderzoek in het werk, dat om de in §. 1148 aangehaalde redenen onontbeerlijk is, voornamelijk wanneer de asphyxie door eene scheuring of bloedsstorting der baarmoeder, of ten gevolge eener zwangerheid buiten de baarmoeder, te weeg gebragt werd. Komt de Zwangere na twee of drie dagen niet tot zich zelve, dan moet men haar nooit vroeger laten begraven, vóórdat de kenteekenen van verrotting zich vertoonen: voornamelijk lette men op de doodvlekken op den rug, of op de zijde van het ligchaam; wanneer dit teeken ontbreekt, dan moet

men de begraafing ook niet vroeger toelaten, en in het geval, dat er naar den tijd der zwangerheid geschiktheid voor het leven van het Kind kan verwacht worden, slechts eerst na voorafgegane verlossing, welke in de meeste gevallen, bijzonder bij regelmatige vorming van het bekken door den natuurlijken weg, door middel der keering of der forceps mogelijk is, omdat de moedermond zich gemakkelijk laat uitzetten; terwijl daarentegen de keizersnede eerder eenen gewisfen dood kan te weeg brengen.



VIERDE HOOFDSTUK.

Over de Stuiptrekkingen der Zwangeren.

§. 1153.

De Stuiptrekkingen worden te regt onder de gevaarlijkste aandoeningen der Zwangeren en Barenden gerekend. Jammer maar, dat derzelver ontstaan dikwijls zoo moeilijk gekend wordt, dus ook de geneeswijze niet altijd op vaste therapeutische gronden berust, en in de meeste gevallen slechts kwakzalverij (*Empyrie*), dikwijls met het maken van eenen zeer grooten ophef, den voorrang bekomt, bijzonder door Verloskundigen, die Vroedmeesters in de geringste beteekenis van het woord zijn, en volstrekt geene grondige pathologische en geneeskundige kennis in zich vereenigen, of door Artsen, wien het aan de noodige praktische verloskundige kennis ontbreekt: klaarblijkelijk heeft dit de vorderingen in de Aetiologie, Pathologie en Therapie dier belangrijke ziekte belet.

§. 1154.

De Stuiptrekkingen der Zwangeren, die als onwillekeurige bewegingen der anders aan den wil van den mensch onderworpenen spieren zich voordoen, en welker aard in eene spoedig afwisselende hevige zamentrekking en uitzetting van het aangetaste orgaan of deel bestaat, worden onderscheiden van

kramptrekkingen, welke gene zeer wel voorafgaan of opvolgen kunnen, daardoor, dat er steeds eene onregelmatige contractie waargenomen wordt, waarvan de gevolgen onbewegelijkheid, dikwijls onbuigzaamheid en verstijving zijn.

§. 1155.

De Stuiptrekkingen kunnen of in de zwangerheid, en bij deze in derzelver verschillende tijdperken, of met verschijnselen der reeds aangevangene geboorte ontstaan. Wijders zijn zij toevallig, aanhoudend, of keeren op gezette tijden weder; dan dient men plaatselijke Stuiptrekkingen van algemeene behoorlijk te onderscheiden; in het eerste geval bepalen zij zich blootelijk tot de spieren, en de Zwangere blijft bij hare zinnen; in het laatste zijn ook voornamelijk de hersenen er in betrokken, derzelver verrigtingen zijn gestoord, en de Zwangere valt gewoonlijk in eenen toestand van vallende ziekte.

Verschijselen.

§. 1156.

Vóórdat de Stuiptrekkingen zelve plaats hebben, kondigen zij zich menigmaal lang te voren door zekere verschijnselen aan, als: vermoeidheid, beven, bezwijming, hoofdpijn, fonkelen in de oogen, suizen in de ooren, geeuwen, duisterheid van het gezicht, hartkloppingen, angst, kramptrekking in enkele spieren, huivering, koude langs de wervelkolom, kleine onregelmatige polsflagen, waterachtige in menigte afloopende pis, enz.

§. 1157.

Vreesfelijk zijn de verschijnselen der plaatshebbende Stuiptrekkingen zelve. De schielijke zamentrekking en even zoo schielijk weder volgende ontspanning der deelen is geweldig, onwillekeurig en doelloos; het aangezicht bleek en betrokken; de mond scheef; nu eens staren, dan weder rollen de oogen heen en weêr met zeer verwijde oogappelen; er komt schuim op den mond, de tanden knarsen, tong en lippen worden door onwillekeurig bijten gekwetst, het ademen is ongeregeld en valt moeilijk, de polsflagen zijn klein, veranderlijk, krampachtig en dikwijls in den aanval zelfs lang niet voelbaar; zij laat hare pis en haren drek loopen, eene menigte zweet bedekt de geheele oppervlakte der huid, verstand en bewustheid zijn weg, de Zwangere werpt zich heen en weder, en verscheidene menschen zijn somtijds naauwelijks in staat, om haar op het bed en ongekwetst te houden. — Soms tijds worden deze Stuiptrekkingen ook van eenen verstijvenden (*tetanischer*) aard, en veroorzaken nu eens eene voor- (*Emprosthotonus*), dan eens eene achterwaartsche verstijving (*Opisthotonus*) met boogswijze krommingen van den geheelen romp, wederom afwisselend met de menigvuldigste stuipachtige kramp trekkingen (*klonischen Krämpfen*). Soms tijds ontstaan zij plotselijk, zonder andere voorbode dan zeer hevige hoofdpijn, of gastrisch-galachtige toevallen, en de bewustheid keert alleenlijk in de minder hevige gevallen weder terug; in de hevigste echter worden de tusschen-

poozingen door eenen slapenden of snorkenden toestand aangevuld, waaruit bij eenen gelukkigen afloop de Zwangere als uit eene diepe flauwte, zonder bewustzijn van het voorgevallene, somtijds eerst met den tweeden of derden dag ontwaakt. — Buiten dien bespeurt men bij de geboorte pijnen in het kruis, krampachtige zamentrekkingen der baarmoeder, de in- en uitwendige moedermond zijn geopend, somtijds is de beweging van het Kind zeer levendig, en wanneer de stuiptrekkingen in hevigheid toenemen, dan ontstaat er eene scheuring in de baarmoeder, of wel eene ontijdige geboorte. Alleenlijk zulke stuiptrekkingen, welke onmiddellijk door eenen hoogen graad van zwakte en ontlediging veroorzaakt worden, zijn meestal in den aanval zelve doodelijk. Bij de meeste overigen volgt de dood als in eene aanhoudende stuiptkoorts, gedurende welke de zieke van hare zinnen beroofd, in het aangezicht paarsch en gezwollen is, zwaar ademt en rogchelt. In al deze gevallen neemt men wel eens ophooping van schuim in de longen waar, doch gewoonlijk geene eigenlijke ontsteking.

§. 1158.

De duur en wederkeering der stuiptrekkingen is verschillend. Meestendeels houden zij na eenige minuten, maar ook dikwijls na eenige uren, weder op, het afgematte ligchaam wordt volkomen rustig, de bewustheid en de spraak keeren wel zeer dikwijls, maar niet altijd na den eersten aanval, terug. De zieke is rustig, klaagt over vermoeidheid en pijn.

pijnlijkheid van het ligchaam , en meestal over hoofdpijn. Na een half of geheel uur , of ook wel na eenen langeren tijd , wordt de rust door eenen nieuwen en gewoonlijk heviger' aanval afgebroken , die nog langer duurt , en wanneer de ziekte met den dood eindigt , dan volgt deze gewoonlijk reeds op den eersten , tweeden of derden dag. Soms heeft er geene tuschenpoozing plaats , en de eerste aanval duurt voort tot den dood , welke na verloop van twaalf tot zestien uren volgt.

Lijkopeningen.

§. 1159.

Bij het openen der aan stuiptrekkingen gestorvene Zwangeren heeft de Schrijver bij kleine hoofden met zeer zamengedrukte aangezigten de beenderen zeer dik , de hersenvaten of zeer ledig of met veel bloed gevuld , de hersenvliezen , inzonderheid het spinnewebvlies , ontstoken , de zelfstandigheid en de zenuwen der hersenen zeer week , de hersenholten met de gewone of met eene groote hoeveelheid water gevuld , den heuvel der gezigtszenuwen zeer naauw zamengedrukt , de adervlecht meestal , en de hersenvaten over het algemeen bloedledig bevonden , wanneer Zwangeren en Barenden aan Stuiptrekkingen sterven , welke het gevolg van een aanmerkelijk bloedverlies zijn. Eenige malen vond de Schrijver het ruggemerg ontstoken en met water gevuld. De borstholte en de hartzak bevatteden in drie gevallen eene buitengemeene hoeveelheid water ; in één geval was de borst- en hartzakwater-

zucht het gevolg van eenen waren met de eene hartkamer en het daarmede overeenkomende oor zamengegroeiden polyp; de Zwangere, eene naaister van omtrent dertig jaren oud, die niet alleen in hare dragt, maar vele jaren te voren steeds eene zeer zittende leefwijze had, en daarbij het ligchaam voorover hield, werd plotselijk door Stuiptrekkingen tusfchen de achtste en negende maand overvallen, zonder dat zelfs de geringste verschijnselen van eene aanstaande geboorte plaats gegrepen hadden; buitendien vindt men wel zeer gewoonlijk polypeuse vergroeiingen bij Zwangeren en Barenden, bijzonder wanneer zij in het algemeen op eene hevige bloedstorting der baarmoeder of een zeer groot bloedverlies volgen of daarmede vergezeld gaan. Hier zijn echter de polypen niet de oorzaken, maar een gevolg der stuiptrekkingen, hetgeen op verscheidene gronden kan verklaard worden. In den onderbuik der aan Stuiptrekkingen gestorvene Zwangeren vond de Schrijver nimmer onregelmatige verschijnselen, die hem opheldering over het ontstaan derzelven zouden hebben kunnen geven; gewoonlijk waren de organen in eenen volkomen gezonden en geregelden toestand; tweemaal was de hoeveelheid waters tegennatuurlijk, bijzonder bij eene Zwangere, die aan hydrothorax, ascites en anasarca in de zwangerheid geleden had, en bij eene andere alleen de lever aan derzelver bolle oppervlakte met het buikvlies vergroeid.

Oorzaken.

§. 1160.

De eene Zwangere is meer aan Stuiptrekkingen onderhevig dan de andere; blijkens waarnemingen zijn de aanleidende oorzaken de volgende: hysterische aanleg en zeer verhoogde gevoeligheid in het algemeen, hierom bij Zwangeren van een zeer teeder maakfel, dun gebeente, fijne spieren, wit vel met snel afwisselend rood, en van eene levendige, zeer vlugge verbeeldingskracht (*); buitendien ook wel de irritable reproductive gesteldheid bij Zwangeren, met zeer dikke beenderen, en uitstekend gespierd ligchaam, voornamelijk met vaste beenderen van het hoofd, de zwangerheid zelve, waardoor de aandoenlijkheid van het zenuwgestel zeer dikwijls in eenen hoogen graad vermeerderd, en bijzonder in de laatste maanden eene grootere hoeveelheid bloeds naar het hoofd gevoerd wordt, het gestadig verblijf in eene natte en koude woning, voornamelijk bij gebrek aan voedsel, misbruik van geestrijke dranken in de zwangerheid, aanhoudend waken met inspanning van den geest, aandoeningen en hartsogten, voornamelijk aanhoudende kommer, verdriet, gekrenkte liefde of het gevoel van schaamte bij ongehuwde Zwangeren; zenuwkoorts, aanvallen van tusfchenpoozende koortfen, een wanftaltig en
naauw,

(*) Zoo nam de Schrijver waar, dat twee zusters, die even zeer aanleg daartoe hadden, in de zwangerheid door de vreesfelijste Stuiptrekkingen overvallen werden.

naauw, voornamelijk te groot bekken, ziekten en afwijkingen der hersenen, enz.

§. 1161.

De schadelijke invloeden en gelegenheidsoorzaken, die in de zwangerheid, bijzonder bij den genoemden aanleg, Stuiptrekkingen te weeg brengen, zijn: prikkeling der hersenen en van het zenuwgestel door volbloedigheid en het voortbrengen van eene grootere hoeveelheid bloeds, die ten gevolge eener verhoogde werkzaamheid der reproductie in de zwangerheid ontstaat, voornamelijk bij dezulken, wier bijzonder aandoenlijk zenuwgestel, ook buiten de zwangerheid, aanmerkelijk was; hersenontsteking, de hoofd- borst- en hartzakwaterzucht, hetzij ze eene oorspronkelijke of afgeleide ziekte zijn (*); zeer overvloedige bloedstortingen, bij voorbeeld neusbloeden, bloedbraken en voornamelijk bloedstortingen der baarmoeder, e. d. g.; de scheuring der baarmoeder is wel somtijds het gevolg, doch kan ook de oorzaak der Stuiptrekkingen zijn, eensdeels wegens de hevige prikkeling, die voorheen als een gevolg der hevige inspanning en daardoor zelve ontstaat, anderdeels wegens de met dezelve plaats grijpende bloedstorting der baarmoeder; de stervende of bereids dood zijnde foetus. In het eerste geval kunnen
bij

(*) De Schrijver heeft nu reeds driemaal de Stuiptrekkingen door borst- en hartwaterzucht bij Zwangeren zien ontstaan; in één geval vond hij eenen waren postyp in het hart. Zie §. 1159.

bij zeer aandoenlijke Zwangeren, bij wie reeds de gewone beweging van het gezonde Kind een pijnlijk gevoel veroorzaakt, Stuiptrekkingen eensdeels door de pijnlijke, stuipachtige bewegingen van hetzelfde, anderdeels ook door dergelijke oorzaken, welke stuip-trekkingen van den foetus te weeg brengen, stuip-trekkingen der moeder doen ontstaan; in het tweede geval, wanneer de vrucht reeds dood is, kan die als een vreemd, buiten de wederkeerige organische gemeenschap gesteld, dikwijls reeds tot verrotting overgegaan ligchaam, door deszelfs drukking werken, en de zenuwen tot wederwerking opwekken, en zulks te meer, naar mate meestal bij Zwangeren, ten gevolge van afmatting en algemeene zwakte, van onrust, angst en slapelooze nachten, enz., waarover zij korter of langer tijd vóór den wezenlijken uitgang der vrucht klagen, de gevoeligheid verhoogd is. Behalve de genoemde oorzaken, verdienen nog opgemerkt te worden: het te menigvuldig genot van den bijslaap, het gebruik van afdrijvende, buikzuiverende, bijzonder drastische middelen, te menigvuldige of geheel tegenstrijdige aderlatingen, indigestiën van de maag, plotselijke verkouding, bijzonder na voorafgegane verhitting, zoowel algemeene als plaatselijke (*), hevige pijn door eene bekleemde breuk, het vast rijgen van den onderbuik, om de zwan-
ger-

(*) De Schrijver nam Stuiptrekkingen bij eene Zwangere na het drinken van koud water waar; in een ander geval had de Zwangere zich met dansen vermaakt, zich plotselijk verkoud, en daarop waren Stuiptrekkingen gevolgd.

gerheid te verbergen (*), eene aanhoudende of langdurige pisopstopping, of door kramp of door uitzakking, achteroverbuiging der baarmoeder, of door drukking van het hoofd te weeg gebragt, enz.

§. 1162.

Staande de geboorte kunnen er Stuiptrekkingen ontstaan, ten gevolge van den gewonen aandrang der weeën bij zeer aandoenlijke gestellen, in welk geval zij niet zoo zeer door de hevigheid der pijnen ontstaan, als wel door dat de zamentrekkingen der baarmoeder, als ware het, knagend en niet genoeg meêgevend zijn; daarnaar regelen zich ook voornamelijk de krampachtige weeën, die in eene aanhoudende en uiterst krampachtige zamentrekking der baarmoeder bestaan, zonder dat de moedermond verwijd en de geboorte bevorderd wordt, of de zamentrekkingen der baarmoeder ontmoeten eene te groote tegenkancing in den moedermond, die door deszelfs stijfheid, verharding of vergroeiing te weeg gebragt wordt, of die op eene overmatige uitzetting, door eene buitengewone hoeveelheid vruchtwater, of door een zeer groot Kind, en op eene ongeregelde ligging van het Kind, doorgang, naauwte, en wanstaltigheid van het bekken berust. Soms tijds neemt men de Stuiptrekkingen als een gevolg van te groote poging tot baren of van onregelmatige uitzetting van te naauwe uitwendige teel-dee-

(*) Ook daardoor heeft de Schrijver tweemaal de vreesfelijkste Stuiptrekkingen zien ontstaan.

deelen nog in de vierde periode der geboorte waar, of zij worden van bloedsstortingen, welke op dien tijd ontstaan, vergezeld.

Voorzegging.

§. 1163.

De voorzegging valt slechts in weinige gevallen gunstig uit. Zijn de Stuiptrekkingen hebbelijk geworden, en wordt de zieke ook buiten de zwangerheid, bijzonder bij eenen hysterischen aanleg, dikwijls daarmede overvallen, dan is er dikwijls geen gevaar bij, ook dan, wanneer zij staande de geboorte en na de verlossing uren, ja dagen lang, plaats grijpen. — Wanneer de plaatshebbende aanvallen telkens in hevigheid afnemen, het hoofd met zweet bedekt wordt en eene natuurlijke warmte verkrijgt, de beweging van het Kind gedurig gevoeld wordt, de aangewende geneesmiddelen door vermindering der Stuiptrekkingen werkzaam zijn, en er geene verschijnselen van eene ontijdige geboorte zich vertoond hebben, dan is er redding voor de zieke te hopen. Indien de Stuiptrekkingen aanhoudend waren, en op een idiopathisch lijden der hersenen berustten, of een gevolg waren eener hersenontsteking, dan blijft er somwijlen eene aanhoudende zwakheid van verstand over; zij kunnen ook in razernij en zwaarmoedigheid of zenuwkoorts overgaan. In de volgende gevallen is de voorzegging meer of min ongunstig: wanneer Stuiptrekkingen in de zwangerheid of geboorte bovendien zeer gezonde Vrouwen plotselijk overvallen, inzonderheid echter wanneer deze van een irritabel, volbloedig, repro-

duc-

ductief gestel zijn, dan is er groot gevaar te duchten. — Hoe meer edele organen door Stuiptrekkingen overvallen, en hoe meer de extremiteiten, of wel de geheele romp van het ligchaam, in eene geheel tegenovergestelde beweging en geleding getrokken worden, des te erger is de voorzegging. — Kan men de oorzaak der Stuiptrekkingen noch inzien, noch wegnemen, worden deze, in plaats van te verminderen, op het gebruik van geneesmiddelen heviger, en hebben er tevens verschijnselen van eene ontijdige geboorte plaats, zijn zij met koortsen vergezeld, krijgt de lijdere hare bewustheid en spraak niet spoedig weder, en zijn zij algemeen verspreid, dan is er weinig of in het geheel geene hoop op redding. — Stuiptrekkingen, welke bloedstortingen der baarmoeder na een aanmerkelijk verlies van bloed vergezellen, worden meestentijd door eenen onvermijdelijken en oogenblikkelijken dood achtervolgd. — Stuiptrekkingen der Zwangeren, welke aan hoofdhartzak- borst- of buikwaterzucht lijden, zijn doodelijk. Er is groot gevaar, wanneer de Stuiptrekkingen gevolgen eener scheuring der baarmoeder, eener afgestorvene vrucht of krampachtige zamentrekkingen der baarmoeder zijn. — Stuiptrekkingen, welke staande de geboorte en bijzonder dan verschijnen, wanneer het water reeds afgeloopen is, worden ook voor het Kind gevaarlijk, te meer, wanneer zij met hevige schudding van het ligchaam vergezeld zijn, stuipachtige, krampachtige zamentrekkingen der baarmoeder veroorzaken, en den omloop van het bloed gedurende eenen langen tijd beletten.

Algemeene grondstellingen omtrent de handelwijze van den Arts bij Stuiptrekkingen der Zwangeren.

§. 1164.

Bij Stuiptrekkingen der Zwangeren is de inachtneming der volgende algemeene grondstellingen voor den Arts van zeer veel belang: 1) iedere Zwangere, die door Stuiptrekkingen overvallen wordt, moet onderlagen worden, eensdeels om zich te overtuigen, of niet de ligging, de dood of hevige Stuiptrekkingen van het Kind, naauwte of mismaaktheid van het bekken, gebrekkelijke ligging der baarmoeder e. d. g. aandeel aan de Stuiptrekkingen hebben; anderdeels, om kennis te krijgen, of de geboorte voorhanden zij, en, zoo deze reeds plaats hebbe, of de Stuiptrekkingen buiten of telkens slechts gedurende de weeën ontstaan; 2) men moet aan de Zwangeren altijd eene horizontale ligging, zoo mogelijk in een laag bed, aanwijzen, en in hetzelfde elken stuipachtigen aanval niet storen, maar dien zijnen vrijen loop laten, anders wordt hij heviger en werkt nadeeliger naar binnen; 3) dewijl het gemakkelijker is, bij Stuiptrekkingen der Zwangeren vele geneesmiddelen en menigerlei toefstel voor te schrijven, dan gebruik daarvan te maken, zoo moet al hetgeen, wat door geneesmiddelen nut zal stichten, gering in omvang, maar veelbevattend in werking en kracht zijn, en meer kan in het algemeen door den aars en de scheede en op de buitenste oppervlakte van het ligchaam, omtrent geneesmiddelen, dan door den mond aangebragt worden;

4) wanneer de Stuiptrekkingen met hevige beweging en schudding van het ligchaam vergezeld zijn, en de Zwangere ligt uit het bed kan vallen, dan moet men haar vasthouden en hare extremiteiten slechts in zoo verre ondersteunen, dat haar door toevallige bezeering geen nadeel toegebracht worde; bijzonder moet men voor de tanden en de tong zorg dragen; maar belagchelijk, onnuttig en meer nadan voordeelig is het, met het losmaken der duimen zich bezig te houden (*).

Geneeswijze.

§. 1165.

De behandeling der Stuiptrekkingen bij Zwangeren is en blijft voor den Arts altijd eene zeer moeilijke taak, omdat men dikwijls niet kan inzien hoe zij ontstaan; van daar dat zij niet altijd aan de verwachting beantwoordt, offchoon de aanwijzing naar de theorie en de verschijnselen zeer juist schein te zijn; meestal hebben dan zulke veranderingen, bijzonder in het zenuwgestel, plaats gehad, die nog onbekend zijn, of de Stuiptrekkingen ontstaan uit oorzaken, welke niet weg kunnen genomen worden; van daar is het voor den Schrijver altijd eene merkwaardige bijzonderheid, dat

(*) Deze hier te Lande niet minder algemeene, dan voornaamste oudmoederlijke zorgvuldigheid, waaromtrent men dikwijls meer acht gegeven heeft, dan op de ziekte zelve, heeft niet alleen menig eene noodeloos de schromelijkste pijnen toegebracht, als wel voornamelijk aan verscheidenen *onrepareerbare* duimen gekost!

dat hij bij al de Zwangeren en Barenden, wier lijk hij ontleedde, altijd water in het hoofd, in de ruggegraat, borst, hartzak of buikholte vond; de groote hoeveelheid waters toonde, dat de ongeregelde ophooping niet het eerst een gevolg der Stuiptrekkingen was, maar reeds vroeger plaats gevonden had. Dat in menige gevallen en in het bijzonder dáár, waar de Stuiptrekkingen algemeen zijn, dadelijk de bewustheid weg, en de gewaarwording in het algemeen hevig aangetast is, schijnt wezenlijk een ontstekingsstoestand van het zenuwgestel, van het ruggemerg en van de inwendige zelfstandigheid der hersenen plaats te hebben; in dit geval berusten de Stuiptrekkingen op een idiopathisch lijden, en nemen gewoonlijk een zeer spoedig en doodelijk uiteinde, omdat het aandeel der irritabiliteit in de zelfstandigheid der hersenen en van het ruggemerg veel geringer is, en spoediger uitgeput wordt.

§. 1166.

Om nu de geneeswijze te bepalen, trachte men, na voorafgaand onderzoek van het ligchaamsgestel der lijderes, het beloop der zwangerheid, der merkbare verschijnselen en van sommige invloeden, zich de noodige kennis te verschaffen, waardoor de Stuiptrekkingen te weeg gebragt konden worden; ook is het van belang, dat men kennis neme, of de lijderes aan hysterische toevallen en Stuiptrekkingen ook buiten de zwangerheid geleden, of dat zij geheel onverwacht nu voor de eerstemaal daarvan is aangetast geworden.

§. 1167.

Indien de Zwangere van een irritabel, volbloedig gestel is, en een in §. 1160 gemeld maakfel van het ligchaam heeft, hetwelk in dit geval zoo zeer tot Stuiptrekkingen overhelt; het gezigt zeer rood, gloeiend, het oog schitterend, het hoofd zeer droog en heet is, de halsslagaderen hevig kloppen, de Zwangere buiten de aanvallen over eene hevige hoofdpijn op eene bepaalde plaats van het hoofd klaagt, inzonderheid aan het achterhoofd of in de ruggegraat vergezeld met Opisthotonus, en men bevindt, dat de pols vol, hard en snel is, gedurende of na den aanval neusbloedingen plaats hebben, de Stuiptrekkingen zeer hevig en algemeen zijn, de lijderes gedurende dezelve veel kracht en sterkte van ligchaam toont, en men volstrekt geene weeën bemerkt, dan zijn dadelijk in den beginne algemeene en plaatselijke bloedontlastingen, bij voorbeeld bloedzuigers, koppjen in den hals, op de ruggegraat of aan het achterhoofd gelegd, dringend aangewezen, en men kan verzekerd zijn, dat zij aan het oogmerk voldoen, zoodra gedeeltelijk gedurende, gedeeltelijk na de aanwending, de bedwelming ophoudt, het bewustzijn wederkeert en de vermindering der toevallen zelfs beterschap aankondigt.

§. 1168.

Behalve de bloedontlastingen wordt in het §. 1167 gemelde geval het nitrum tot inwendig gebruik aan-
geprezen, en onontbeerlijk blijven bijzonder bij sterke
ophoopingjen naar het hoofd en sterke bedwelming
de

de aanwending der stovingen van SCHMUCKER en koude begietingen, doch telkens eerst na de gedane bloedontlasting en na het scheren van het hoofd. Om den aandrang van bloed naar het hoofd op allerlei wijze te verminderen, is het zeer noodzakelijk, om door middel van klisteren open lijf te houden, en wanneer de Zwangere te voren zeer aan verstoppingen onderhevig was, kunnen ook ontlastende klisteren, bijzonder met zeep of uit eene oplossing van Glauberzout, aangewend worden. Warme voetbaden mogen ook wel zeer nuttig zijn, om de ophoopingten te verminderen, doch zij zijn inzonderheid bij groote onrust der Zwangeren, en te snel op elkander volgende stuipachtige aanvallen moeilijk aan te wenden; in derzelver plaats gebruike men liever mosterdpappen of Spaansche vliegpleisters aan de kuitten, in den hals en zelfs op het hoofd, maar ook nooit vroeger, dan na voorafgegane bloedontlastingen.

§. 1169.

De geneeswijze moet van de vorige gevallen verschillen, wanneer Vrouwen uitstekend prikkelbare zenuwen, een gevoelig ligchaamsgestel en eenen hysterischen aanleg hebben, en, zoo als de Schrijver waarnam, wanneer zulke Zwangeren door Stuiprekkingen plotselijk overvallen worden, en buiten de zwangerheid aan toevallen van vallende ziekten of Stuiptrekkingen onderhevig waren. Niet alleen, dat reeds het uiterlijke, het gestel, de hysterische aanleg en de invloeden, zoo als: veel zorg en verdriet in de zwangerheid, bijzonder bij ongehuwde Zwangeren,

gebrek aan voedsel, te groote inspanning van ziel en ligchaam, verzwakkende afdrijvende en buikzuiverende middelen, aanhoudende diarrhëen, bloedverlies door aderlatingen of bloedstortingen, enz. het kenteeken bepalen, zoo vertoont zich ook reeds eene verscheidenheid in de stuipachtige aanvallen zelven, en van verschijnselen, die ze aankondigen. De krachten zijn meer ter neêrgedrukt, de Zwangeren hebben te voren eene gevoelige gezette pijn in het hoofd, eene trekking in de ruggegraat, de oogen zijn zeer gevoelig voor het licht, de oogleden en de hoeken van den mond vertrekken, het gelaat is vóór den aanval zelfs bleek, het aangezigt koud, de Zwangere geeuwt zeer dikwijls, de krachten verminderen telkens meer en schielijk na iederen aanval, de pols slaat dikwijls, is zwak, eenigzins hard, trillend en zeer veranderlijk, er heeft meer benaauwdheid plaats, vergezeld met hartkloppingen, de tong is droog, bevend, het gehoor bij afwisseling zeer moeilijk of ten uiterste gevoelig, het hoofd duizelig, bedwelmd, het aangezigt bij herhaalde aanvallen van toenemende ophooping en naar het hoofd rood en heet, de pis waterachtig, melk- of zemelachtig, zeer menigvuldig, of ook de lozing daarvan geheel onderdrukt, het lijf meestal besloten, de huid geheel droog of ook met veel zweet bedekt, enz.

§. 1170.

In het §. 1169 aangewezen geval, waarin de gevoeligheid onmiddellijk aangetast is, en de Stuip-trekkingen door een idiopathisch lijden der mergachtige zelfstandigheid van de hersenen en der zenuwen

van

van de ruggegraat, wanneer gedurende den aanval de sterke bewegingen en krommingen van dezelve bijzonder zich vertoonen, gewoonlijk te weeg gebragt worden, zijn ook alleen bijzonder de zoogenaamde krampstillende middelen aangewezen. Ten zij dezelve, door de gezonkene irritabiliteit in de gevoeligheid op te beuren, de Stuiptrekkingen tegengaan, of in andere opzigten prikkel- en krampwerend zijn, of de onregelmatige verschijnselen en bewegingen der zenuwen bedaren, of derzelver verhoogde prikkelbaarheid verstoppen, dan zijn hier tot inwendig gebruik de volgende middelen dienstig: de kamilbloemen, de valeriaan, de ipecacuanha in kleine giften, het bevergeil en de tinctuur daarvan, oleum cajeput, ol. chamomillae dest., de zinkbloemen en de wismuthkalk, het ammonium en deszelfs preparaten, het liquor ammonii succ., het ammonium carbonicum, oleum animale aethereum, het heulfap, de aqua laurocerasi, de kamfer, het geneesmiddel van stütz, of het kali carbonicum bij afwisseling met tinctuur van opium, de stinkende asand, de aether sulphuricus, aeth. sulphur. phosphoratus, spiritus nitrico aethereus, en vooral de muskus, en derzelver tinctuur met die van amber.

§. 1171.

Tot uitwendig gebruik worden aanbevolen:
 1) laauwe baden, voornamelijk met een aftreksel van kamillen, aromatische kruiden, of eene oplossing van zeep, potasch, of van bijtend loogzout;
 2) warme stovingen van het hoofd, der borst en van den onderbuik, die in het §. 1169 vermelde

geval, waar de gevoeligheid onmiddellijk aangetast is, en de Stuiptrekkingen op een idiopathisch lijden der mergachtige zelfstandigheid van de hersenen en der zenuwen van de ruggegraat berusten, zeer bijzonder aangewezen zijn; men kan zich van dezelfde middelen bedienen, die tot de baden gebruikt worden, wel te verstaan, dat vooraf het hoofd moet geschoren worden; 3) vlugtige en geestrijke inwrijvingen op het hoofd, op de ruggegraat, op de borst, op de maag-lies- en heiligbeensstreek met het vlugtige smeersel, bijzonder uit kamfer en opium, met eene oplossing van kamfer in vitriooléther, met étherische oliën enz., doch welke men met omzigtigheid moet aanwenden, daar die bij eene zeer verhoogde gevoeligheid zelfs niet in het geringste verdragen worden, en meestal de Stuiptrekkingen verergeren, vooral als men die op de maagstreek aanwendt. Eene groote pleister uit theriak op den onderbuik is in dit geval dikwijls werkzamer; doch de werkzaamste zijn de onder N^o. 1 aangeprezene baden; 4) reukmiddelen uit het vlugtige ammonium, het liquor ammonii succin. e. d. g.; 5) klisteren uit een aftreksel van kamillen en valeriaan met het liquor ammonii succin., het heulsap of den stinkenden asand.

§. 1172.

Algemeene bloedontlastingen zijn wel in het geval §. 1169 niet aangewezen; intusschen kunnen dadelijk in den beginne, bij zeer sterke ophooping en buitengewone bedwelming en zwaarte in het hoofd, plaatselijke bloedontlastingen, bloedzuigers of koppen in den hals of aan het achter-

terhoofd dienstig zijn, maar ook alleen dadelijk in den beginne; want later, wanneer bij toenemende aanvallen de irritabiliteit schielijker uitgeput wordt en de krachten meer afnemen, doen zij meer naden voordeel. Ook mosterdpappen of Spaansche vliegpleisters op het hoofd, in den hals, of strooken daarvan op de ruggegraat gelegd, zijn dienstig, en kunnen vroeger aangewend worden, dan in §. 1168 bepaald werd.

§. 1173.

De geneeswijze, welke de Schrijver in de §. 1169 bijgebrachte gevallen bij Stuiptrekkingen der Zwangeren opvolgde, en die hem nimmer te leur stelde, wanneer hij dezelve dadelijk in het begin behandelde, en welke niet het gevolg van belangrijke organische gebreken of zekere ongeneeslijke ziekten geweest zijn, was gewoonlijk, bijzonder in het Kraamvrouwengesticht, de volgende: men gaf aan de lijderes dadelijk in het begin, het ééne half uur vijftien tot twintig druppelen van het liquor ammonii carbonici aquosi of succin. met de Thebaische tinctuur tot vijftien of twintig druppels, en het andere half uur vier tot zes greinen muskus met eenige siroop, of vijftien tot twintig druppels muskus- en ambertinctuur, hetgeen men des noods vermeerderde. Alle twee uren liet men een lavement uit een aftreksel van kamillen of valeriaan met den stinkenden asand zetten; den onderbuik, de borst en de ruggegraat met een flanel bedekken, dat verwarmd en met het liquor ammonii causticus natgemaakt werd, of men liet ook wel het in §. 1171

gemelde vlugtige smeersel buiten den aanval voorzigtig inwrijven; — den aanval zelven stoorde men echter in zijnen loop niet, vermeed alle geweld en te groote beweging van het ligchaam, zorgde, dat de lijderes zich niet bezeerde, en bemerkte men na twee uren geene vermindering van aanvallen, dan ging men dadelijk tot de aanwending van een algemeen laauw bad over, in hetwelk men drie drachmen tot eene halve once van het bijtend loogzout oploste, waarin de lijderes buiten den aanval twintig minuten tot een half uur toe gehouden, en bij het uitnemen met warme doeken zorgvuldig afgedroogd en vervolgens in eene door en door warme wolde deken gewikkeld werd. Over het hoofd liet men, bijzonder bij aanhoudende bedwelming en bewusteloosheid, met de in §. 1171 genoemde stovingen en inwrijvingen, en daarbij de overige middelen tot inwendig gebruik voortgaan, en diende dikwijls een' kop warme kamillenthee toe, bij afwisseling met bouillons. De baden werden alle drie, ook wel alle twee uren in het begin herhaald; doch meestal vertoonde zich de heerlijke werking van het genoemde bad reeds bij de eerste gebruikmaking daarvan, en indien er weldra een warm zweet ontstond en de Stuiptrekkingen langeren tijd wegbleven, of minder aanhoudend en hevig werden, dan was de lijderes gered. Maar het moet bijzonder het in §. 1169 gemelde geval zijn, en de Stuiptrekkingen mogen niet het gevolg eener ziekte of van een organisch gebrek wezen, dat niet kan verholpen worden; doch zelfs dáár bespeurde men, dat de Stuiptrekkingen verminderden, ja ook volkomen verdwenen.

dwenen, offchoon de oorspronkelijke ziekte onge-
 neeslijk was. De geroemde baden blijven der-
 halve het voornaamste middel ter genezing, bijzon-
 der in het in §. 1169 gemelde en nog in andere
 gevallen, waarvan naderhand gewag zal gemaakt
 worden. Jammer maar, dat de aanwending in de
 bijzondere praktijk met zoo vele zwarigheden ver-
 zeld, fomtijds zelfs geheel onmogelijk is; de Schrij-
 ver heeft derhalve inzonderheid derzelver voortref-
 felijke werking in het Kraamvrouwengesticht be-
 proefd. Wanneer men echter geene gelegenheid
 heeft om baden te kunnen gebruiken, dan bediene
 men zich van warme stovingen uit dezelfde oplos-
 sing over het hoofd, over de borst en den onder-
 buik, alsmede over de ruggegraat. In sommige ge-
 vallen werden om de in §. 1172 gemelde reden
 bloedzuigers met nut aangewend, en wanneer de
 bedwelming en bewusteloosheid aanhield, dan leide
 men mosterdpappen op de kuit en Spaansche vlieg-
 pleisters op het hoofd.

§. 1174.

Wanneer de Stuiptrekkingen wegblijven, dan gaat
 de toestand fomtijds in eene zenuwkoorts over,
 wanneer vervolgens de behandeling dezer koorts
 eenen aanvang neemt, of in den toestand van be-
 terschap blijft meestal eene zwakte met eene heer-
 schende prikkelbaarheid van het zenuwgestel bij, die
 zeer gemakkelijk bij den geringsten invloed, doch in-
 zonderheid bij eene op handen zijnde geboorte,
 nieuwe aanvallen van Stuiptrekkingen veroorzaakt.
 Gedurende dat tijdsverloop tot de op handen zijnde
 ge-

geboorte, late men daarom ten minste twee tot drie malen in de week, en met behoorlijke omzigtigheid, de aanbevolene laauwe baden gebruiken, late in de eerste dagen, wanneer er in het geheel geene Stuiptrekkingen plaats hebben, een aftreksel van valeriaan met den tinctuur van bevergeil, of het liquor ammonii succinici, en den spiritus sulphurico aethereus nemen, en geve naderhand zoogenaamde aanhoudend versterkende, gepaard met krampstillende middelen, de valeriaan, den stinkenden asand, het bevergeil, de bittere extracten, de kina, het ijzer, bijzonder de tinctura martis tonica. Behalve dit, bevele men een gepast, voedzaam diët, goede opasning en verzorging, zuivere lucht, rust naar ligchaam en ziel, en late alle invloeden vermijden, die slechts eene eenigzins nadeelige werking op het zenuwgestel kunnen hebben.

§. 1175.

Zijn de Stuiptrekkingen een gevolg van hersenontsteking, die voornamelijk in de slijm- en weivliezen haren zetel heeft, bewijzen de verschijnselen, dat inzonderheid het lymphatisch stelsel voornamelijk deel aan het ontstaan der ziekte neemt, of doen er zich teekens van hoofdwaterzucht voor, dan wordt, behalve de in §. 1170 opgegevene geneeswijze, een aftreksel der arnicabloemen en senegawortel, de tinctuur van vingerhoed en vooral het kwik aangeprezen; het hydrargyrum muraticum mite tot inwendig en de inwrijvingen van het unguentum hydrargyrum, op het hoofd. Bij groote bedwelming en verlamming blijven Spaansche vliegpleisters

op het hoofd, in den nek en op de ruggegraat onontbeerlijk, alsmede inwrijvingen van de tinktuur van Spaansche vliegen, en uit een aftreksel van mosterdzaad bereide baden. Men bereikt echter zelden het doel der genezing, want de Stuiptrekkingen slepen meestal den dood na zich, wanneer er eenmaal hydrocephalus bijkomt.

§. 1176.

Gelijk de Stuiptrekkingen der Zwangeren een gevolg van den hydrocephalus zijn kunnen, even zoo neemt men dien ook als gevolgen der borst- en hartzakwaterzucht waar, en daar de Schrijver dezen reeds driemaal daaruit zag ontstaan, zoo meent hij de Artsen daarop niet alleen opmerkzaam te maken, maar ook iets omtrent de behandeling derzelven te moeten voordragen.

§. 1177.

De Stuiptrekkingen der Zwangeren, die ten gevolge eener borst- en hartzakwaterzucht ontstaan, worden ten aanzien harer oorzaken ligt miskend; bij nauwkeurige beschouwing zullen een bol voorkomen van het aangezicht, gezwollene schaamlippen en onderste extremiteiten, welke de Schrijver eens daarmede verzeld zag, gezwollene armen en handen, een in de zwangerheid gedurende langen tijd voorafgegane drooge hoest, moeilijke ademhaling, menigvuldige benaauwdheid, bijzonder des nachts bij het liggen op den rug, als ook het verblijf in eene vochtige, bijzonder natte koude woning bij eene zittende leefwijze, opheldering geven. Deze
 Stuipt-

Stuiptrekkingen zijn met aanmerkelijke ophooping en naar de longen, met peripeumonische toevallen en met bloedspuwing, en bijzonder met eene hevige zamentrekking en uitzetting der borst (*thorax*) verzeld; na de aanvallen komt de Zwangere weder tot bewustheid, zij is minder bedwelmd, en er blijft een drooge hoest, of met bloed opgeven vergezeld, overig.

§. 1178.

In het geval §. 1177, waarin de omloop van het bloed door de longen en door het hart zeer moeilijk gemaakt wordt, eensdeels wegens de ophooping van het water, anderdeels wegens de hevige ophooping, die aldaar voornamelijk gedurende de Stuiptrekkingen ontstaan, zijn bloedzuigers op de borst, en bijzonder in de hartstreek aangewezen, en het is beter, dat men de gevolgen van den vermeerderden aandrang van bloed daardoor voorkome, dan dat men eerst het bloedhoesten afwachte, hetwelk ook een gevolg van de scheuring der vaten zijn kan. Tot inwendig gebruik dient de muskus met de sulphur stibiatum rubrum en aurantiacum, de hydrargyrum muriaticum mite, en de squilla, de digitalis purpurea, en een aftreksel der senega, en der arnica en kamilbloemen. Daarbij zijn bijzonder buiten de aanvallen, uit mosterd of eene oplossing van het bijtend loogzout bereide voet- en algemeene baden, stovingen daarvan op de borst en den geheelen omvang van den thorax, inwrijvingen met de tinctuur van Spaansche vliegen en blaarpleisters op dezelfde streek, en bijzonder tuschen de schouders dienstig. Bij groote benaauwdheid zorg men, dat

de

de Zwangere niet te laag met het bovenste deel des ligchaams ligge, en diene haar zoo veel mogelijk in den aanval zelven het liquor ammonii succin. met de Thebaïsche tinktuur toe.

§. 1179.

Zijn de Stuiptrekkingen een gevolg van bloedstortingen bij Zwangeren, die eenen hysterischen aanleg hebben, of voorheen reeds dikwijls aan krampachtige aandoeningen of aan hebbelijke Stuiptrekkingen onderhevig waren, en is het verlies van bloed gering, dan tracht men die naar de in §. 1078—§. 1081 bijgebragte geneeswijze te behandelen en vereenigt daarmede krampstillende middelen. Doch bijaldien de Zwangere te voren nimmer Stuiptrekkingen gehad had, en zij die nu plotseling met veel bloedverlies krijgt, en dadelijk in eenen hevigen graad, dan alleen is eene spoedige Verlosfing het middel ter genezing; want andere middelen te beproeven, ware tijd verspillen, en vermeederen het gevaar; alleen dan, wanneer met de weeën eene zeer krampachtige fluiting van den moedermond, of het reeds lang in groote menigte afgeloopene vruchtwater de verlosfing onmogelijk maakte, moet eerst deze hinderpaal door gepaste middelen weggenomen worden, wanneer men alsdan ook zoodanige, welke de bloedstorting zoo al niet volkomen wegnemen, dan toch ten minste verminderen, te gelijker tijd kan aanwenden. Tot inwendig gebruik bevele men de tinktuur van kaneel, den aluin, het Hallerszuur; daarmede vereenige men de essentia castorei, het liquor ammonii succin., de muskus; benevens lavemen-

menten en inspuitingen in de scheede uit het aftrekfel van kamillen, van valeriaan, met het heulsap en den stinkenden asand; de opiaatzalf aan den moedermond door middel eener spons aangebragt, stovingen op den onderbuik en laauwe baden uit een aftrekfel van verzachtende kruiden met het bilzenkruid, met kamillen enz. Wanneer nu bij het gebruik van deze middelen de krampachtige sluiting van den moedermond voorbij is, en de bloedstorting aanhoudt, dan gaat men zonder bedenken tot de kunstmatige Verlosfing over. Maar indien de bloedstorting en de Stuiptrekkingen ophouden, dan gaat men met de genoemde middelen voort, tracht de verminderde reproductie der lijderes door een voedzaam diët te verhelpen, en schrijve kina en ijzer voor.

§. 1180.

Bij de fcheuring der baarmoeder, hetzij dezelve het gevolg of de oorzaak der Stuiptrekkingen is, moet de verlosfing ter mogelijke redding van het Kind verhaast worden; slechts zelden gebeurt het, dat zij den dood niet voor de Moeder ten gevolge heeft; ten zij dezelve gering ware, of op eene plaats der baarmoeder ontstond, waar geen groot vat beledigd werd. — Is eenig gewrocht der voortteling, en voornamelijk de aanwezigheid der vrucht zelve oorzaak, hetzij dat zij nog leve of reeds dood zij, dan trachte men eerst al de in §. 1170—1173 opgegevene middelen aan te wenden, wanneer de Stuiptrekkingen een gevolg van eenen hysterifchen aanleg of van een zeer prikkelbaar zenuwgestel zijn; zoo zij echter niet spoedig werken, dan

dan moet de foetus als stoffelijke oorzaak weggeruimd, en de geboorte door uitwendige hulp verhaast worden. Intusschen is dit minder mogelijk dan men zich verbeeldt, indien al de Verlossing door de kunst niet slechter uitvalle, dan welligt de Stuiptrekkingen zelven zouden geweest zijn.

§. 1181.

Indien de Stuiptrekkingen het gevolg zijn van de drukking der baarmoeder door gestadig rijzen van den buik, om de zwangerheid te verbergen, dan onderzoek men vooreerst, of er niet tevens ontsteking der baarmoeder of van het buikvlies daardoor te weeg gebragt werd; in dit geval wordt de behandeling der genoemde ontsteking, door welker wegneming de Stuiptrekkingen zullen verdwijnen, daarenboven de in §. 1170—1173 bepaalde geneeswijze aangewezen; dezelve wordt ook vereischt bij die Stuiptrekkingen, welke na buitensporigheden en te menigvuldig genot van den bijslaap, na het misbruik van aderlatingen of verzwakkende ontlastmiddelen ontstaan; bij diegenen echter, welke na de aanwending van hevige afdrijvende middelen zich voordoen, kan wel dezelfde geneeswijze plaats hebben; doch men lette ook vooral dáárop, of niet door derzelver werking reeds vroeger ontsteking der baarmoeder te weeg gebragt werd, en de Stuiptrekkingen niet als gevolgen daarvan te beschouwen zijn, in welk geval men met de behandeling der baarmoederontsteking moet aanvangen. — Indigestiën der maag als oorzaak van Stuiptrekkingen vereischen naar omstandigheden braak- of ontlastmidde-

ten, en zijn zij een gevolg van plotselinge verkouding, dan moet de lijderes zich warm houden, den onderbuik met warme flanel bedekken, zweet- met krampstillende middelen gepaard inwendig gebruiken, zoo als: het aftreksel van kamillen en vlier, van valeriaan met het liquor ammonii acet., liq. ammon. succin. enz., lavementen uit dergelijke aftreksels, laauwe baden. De behandeling der buikvlies- darm- of baarmoederontsteking moet echter dadelijk plaats hebben, ingeval deze ziektevormen, bijzonder als het gevolg eener verwaarloozing of verkeerde behandeling, zich reeds vertoond hebben. — Stuiptrekkingen, door de hevige pijn eener beklemde breuk te weeg gebragt, vereischen de behandeling volgens de therapeutische grondstellingen der heilkunde; ook kan de Herniotomie in vele gevallen aangewezen zijn, doch somtijds moet de Verlossing vroeger bespoedigd worden, om de Stuiptrekkingen en daarmede de pijnen en de beklemming weg te nemen. — Aanhoudende pisopstopping, achteroverbuiging en uitzakking der zwangere baarmoeder moeten tot wegneming der Stuiptrekkingen overeenkomstig derzelve aard behandeld worden.

§. 1182.

Bijaldien de Stuiptrekkingen als een gevolg van den gewonen aandrang der weeën gedurende de geboorte, alsmede ten gevolge eener uitstekende prikkelbaarheid van het zenuwgestel, zich voordoen, dan wordt wel de in §. 1170—1173 opgegevene geneeswijze aangewezen, doch zoo dezelve op de geneeskundige hulp niet spoedig verminderen, dan

make men eene insnijding in den moedermond; de Schrijver heeft in een geval waargenomen, dat daarop de Stuiptrekkingen wegbleven, en zoo die al daardoor niet ophielden, dan kan men in het vervolg de Verlosfing ligt ondernemen, en het insnijden in de baarmoeder is in dit geval zelfs minder pijnlijk, en de tot mogelijke Verlosfing noodzakelijke opening van den moedermond eerder volbragt, dan de door middel van den vinger of van een kunstig werktuig herhaalde uitzetting van denzelfden.

§. 1183.

De Stuiptrekkingen krampachtige ongeregelde zamentrekkingen der baarmoeder vergezellende, is insgelijks de geneeswijze §. 1170—1173 aangewezen; bijzonder worden de laauwe baden of stovingen met de oplossing van het bijtend loogzout aan-geprezen. — De Stuiptrekkingen een gevolg van naauwe stroeve teeldeelende, trachte men dezelve leniger te maken, door inspuitingen uit een aftrekfel van weekmakende kruiden met lijnzaad en veel olie gemengd, door aanwending eener spons uit hetzelfde aftrekfel door de scheede aan den moedermond, doch vooral door het gebruik van laauwe halfbaden, voornamelijk met zeep. Dezelfde middelen, maar vooral het insnijden, worden bij eeltachtige verhardingen van den moedermond aanbevolen; zoo zij daarop niet spoedig ophouden, dan is ook de verhaaste Verlosfing alleen aangewezen. — Eene sterke uitzetting der baarmoeder door eene buitengemeene hoeveelheid van vruchtwater aan het ontstaan der Stuiptrekkingen aandeel hebbende, zag de Schrijver

spoedig door eene kunstmatige besprenging der waterblaas verdwijnen. — Stuiptrekkingen, als gevolgen van drukking of hevige inspanning, welke door eene onregelmatige ligging van het Kind, het scheef liggen en beklemming van het hoofd, voornamelijk bij naauwe mismaakte bekkens ontstaan, vereischen eene spoedige Verlosfing.

*Over de aanwijzingen der verhaaste Verlosfing
door de kunst.*

§. 1184.

De aanwijzing der verhaaste Verlosfing door de kunst in ieder bijzonder geval bij plaatshebbende Stuiptrekkingen der Zwangeren te bepalen, is eene der moeilijkste opgaven voor de Verloskunde; of men onderneemt dezelve, wanneer zij volstrekt niets tot wegneming der Stuiptrekkingen toebrengen, ja zelfs die vermeederen; of men neemt dit middel te laat bij de hand, en op een tijdstip, als het geene hulp meer kan aanbrengen. Daarenboven mag men ook de gevaren niet voorbijzien, die voor de Moeder met eene verhaaste Verlosfing kunnen vergezeld zijn, voornamelijk dán, wanneer de moedermond nog niet verwijd is, en er nog geene weeën hebben plaats gehad. Men moet derhalve bij zoodanige bepaling met de grootste omzigtigheid en overleg te werk gaan.

§. 1185.

Voor al onderzoeken men naauwkeurig, of de Stuiptrekkingen van dien aard zijn, of in zulk eenen
graad

graad zich voordoen, dat zij het leven van Moeder en Kind in gevaar stellen; want vroeger mag men buitendien nooit aan de Verlosfing denken. Heeft men bepaalde oorzaken doordacht, die de Stuiptrekkingen te weeg bragten, en volgens welke men vooraf beproeven kan, om dezelve door genees- en de overige reeds opgegevene middelen weg te nemen, dan fchrijve men dadelijk de krachtigfte middelen zoo fpoedig als mogelijk is voor en lette op derzelve werking. Wanneer hierop de aanvallen niet fpoedig bedaren, maar zelfs heviger worden, dan ftelle men de kunstmatige Verlosfing geen oogenblik uit, en zulks des te meer, wanneer de beweging van het Kind niet meer gevoeld wordt en de moedermond verwijd is. Eveneens befpoedige men de Verlosfing, wanneer de Stuiptrekkingen wel ophouden, maar de geboorte reeds aanwezig is, en er ten gevolge der voorafgegane aanvallen zulk eene vermindering van krachten ontftaan is, dat de Verlosfing door de krachten der natuur onmogelijk of gevaarlijk wordt, en er dan zelfs weder nieuwe aanvallen van Stuiptrekkingen te vreezen zijn.

§. 1186.

Als zeer gezonde en fterke Zwangeren, voornamelijk zonder aanleidende uitwendige oorzaken, plotfelijk en voor de eerftemaal door Stuiptrekkingen overvallen worden, zoo men bij eene wel voorafgegane bepaalde oorzaak te laat geroepen wordt, te voren geene of zeer ondoelmatige middelen aangewend werden, de Stuiptrekkingen zeer hevig waren of zijn, met aanmerkelijke bloedftortingen, inzonder-

heid der baarmoeder, vergezeld gaan, of een gevolg zijn eener scheuring der baarmoeder, van een naauw mismakkt bekken, van een onregelmatig liggend beklemd of reeds stervend of dood Kind, dan moet insgelijks de Verlosfing zoo spoedig mogelijk verhaast worden. Op welke wijze zulks voornamelijk moet volbragt worden, daarover beslist de Verloskunde, die almede de middelen bepaalt, welke men tot uitzetting van den moedermond moet aanwenden. Doch wanneer Stuiptrekkingen bij Zwangeren zich voordoen, als de geboorte nog geen plaats heeft, en volstrekt in geen oorzakelijk verband met deze staan, en het te verwachten is, dat door de Verlosfing de Stuiptrekkingen niet wijken, maar wel dat de Zwangere in het grootste levensgevaar gebragt wordt, dan moet men nimmer de Verlosfing ondernemen, inzonderheid omdat de Schrijver door waarnemingen ondervonden heeft, dat in dit geval verscheidene weken lang herhaalde Stuiptrekkingen de voortduring der zwangerheid niet storen.

§. 1187.

Eindelijk dient men aan te merken, dat, wanneer men in het aangewezen geval beproeven wil, om de geboorte door de kunst te volbrengen, de Stuiptrekkingen op nieuw te weeg gebragt, of zoo aanmerkelijk verergerd worden, dat men de Verlosfing niet wel kan uitvoeren, het beter is, voor de hand daarvan af te zien, opdat men, in plaats van nüt te doen, de zaak niet veeleer verergere. Buiten dien is het meestal voordeeliger, de Verlosfing door
de

de tang dan door de keering te voltooijen, dewijl men met dat instrument zelfs gedurende de aanvallen kan werkzaam zijn, hetgeen bij de keering met de hand geene plaats vindt, waarvan gedurende den aanval, bijzonder bij krampachtige zamentrekking der baarmoeder, de vrije uitoefening belet wordt.

L I T T E R A T U U R.

§. 1188.

KELP, *de convulsionibus parturientium. Argent. 1747.*

ENGELMANN, *de motibus convulsivis et convulsionibus a partu difficili. Altd. 1752.*

SCHAFONSKY, *de gravidarum, parturientium et puerperarum convulsionibus. Argent. 1763.*

GEHLER, *diss. I. II. de eclampsia parturientium, morbo gravissimo, neque adeo funesto. Lips. 1776, 1777; vertaald in deszelfs kl. Schrift. der Entb. I. Theil. Leipz. 1798. S. 195 u. 234.*

J. CHR. MEYER, resp. J. C. S. HILDEBRAND, *de dilaceratione velamentorum et de convulsionibus parturientium Analecta ad art. obstetr. pert. Traject. ad V. 1784, 4º.*

WEGELIN; in STARK'S *Archiv. I. B. 4e. St. Nº. 7. — RINK, t. a. pl. V. B. p. 389. — HINZE, t. a. pl. bl. 178.*

PETRI, *de convulsionibus gravidarum, parturientium et puerperarum. Gött. 1791.*

G. J. HOFFMANN, *über die Ursachen und Heilmittel der sogenannten Cichter oder Convulsionen u. s. w. Frankf. a M. 1795.*

J. HAMILTON, *über die Convulstoneu der Schwangern und Gebärenden*; in het *Journal der ausländ. Literatur*, 1802. Jul. N^o. 1. Sept. N^o. 2.

J. L. FRITZ, *de convulsionibus gravidarum et parturientium*. Wirceb. 1809. 8^o.

BOERS, *Aphorismen über Fraisen, besonders bei Schwangern en Gebärenden*; in het 2e. B. 4e. Deel zijner *Abhandl. geburtsh. Inhaltes*. S. 91.



V I J F D E H O O F D S T U K.

*Over de Tandpijn bij Zwangeren.**Verschijselen.*

§. 1189.

Zwangeren lijden of in het begin of op de helft harer dragt dikwijls aan Tandpijn; deze bepaalt zich of alleen tot den aangestokenen tand, of verspreidt zich van daar tot in de kaak, en veroorzaakt aldaar een hevig trekken of rukken. De pijn zelve is nu eens meer, dan eens minder hevig, nu aanhoudend, dan bij tusschenpoozing, nu eens zonder, dan wederom met koorts vergezeld; in het laatste geval is het aangezicht heet en op beide wangen, of slechts op ééne, een begrensde zeer hoog rood te zien.

Oorzaken.

§. 1190.

De naaste oorzaak is eene hevige onmiddellijke gevoeligheid der tandzenuw, die of het gevolg der gedurende de zwangerheid verhoogde prikkelbaarheid van het zenuwgestel in het algemeen, of van den onmiddellijk aangedanen tand zelve is. De oorzaken en invloeden, die het ontstaan der Tand-

pijn begunstigen, zijn: caries van den tand, en de kwaal is dan idiopatisch; buitendien volbloedigheid, ten gevolge der verhoogde werkzaamheid van de voortbrengingskracht of der vermeerderde bloedmaking, verkouding door het gebruik van koude dranken, of door het vatten van eenen togt, voornamelijk na voorafgegane algemeene of plaatselijke verhitting, bij voorbeeld door zitten dicht bij eene heete kagchel in den winter, waarbij de pijn en de daarmede vergezellende koorts van eenen zuiver ontstekingsachtigen aard is, onreinigheden in de maag en het darmkanaal, zoete spijsen, zure dranken, hevige aandoeningen en hartstogten, inspanning van den geest, waardoor de prikkelbaarheid der zenuwen verhoogd wordt, uitslag, rhumatismus en jicht.

Voorzegging.

§. 1191.

Indien de pijn slechts gering, zonder koorts en andere gevaarlijke toevallen vergezeld is, dan betekent zij weinig; doch zoo zij zeer hevig is, dan kan daaruit slapeloosheid, koorts, braken, belette spijsvertering en miskraam ontstaan. Doch buitendien wordt de Tandpijn bij Zwangeren dikwijls eerst door eene verkeerde behandeling bedenkelijk, en deze kan een langdurig gezwollen aangezicht, ettering van het tandvleesch, zwakheid der zintuigen, vermagering, trekkingen, krankzinnigheid, den dood der moeder en der vrucht ten gevolge hebben.

Geneeswijze.

§. 1192.

Indien de Tandpijn ontstaat door die prikkeling der tandzenuw, welke door volbloedigheid als een gevolg der verhoogde voortbrengingskracht en vermeerderde bloedmaking te weeg gebragt werd, de hevigste pijn na verkouding op voorafgegane verhitting plaats heeft, dezelve zeer hevig, kloppend en met hoofdpijn verzeld, het tandvleesch heet, gezwollen, rood en pijnlijk, de pols vol en hard is, het aangezicht en de oogen rood zijn, dan wordt de antiphlogistifche methode aangeprezen; eene aderlating aan den arm, eene emulsie met salpeter, verkoelende en verdunnende dranken, enz. Om de wangen en het aangezicht late men slechts eenen doek binden, en kamillen en vlierbloemen in melk gekookt dikwijls laauw in den mond nemen. Wanneer daarna de pijn niet ophoudt, dan late men eene Spaanfche vliegpleister in den nek of op beide schouders zetten, waarvan de Schrijver bij Zwangeren eene bijzondere uitwerking heeft waargenomen.

§. 1193.

Indien de Tandpijn reeds lang geduurd heeft, eene aanmerkelijke ontsteking veroorzaakte, welke verzuimd, of met zeer verkeerde middelen, bijzonder met te heete drooge matrassen, behandeld werd, dan wordt door de genoemde methode (§. 1192) de pijn wel minder, maar niet volkomen weggenomen, en de ontsteking is dan gewoonlijk

lijk in- of uitwendig aan de kaak in eene abces overgegaan, hetgeen door onderzoek naauwkeuriger kan blijken. Indien de abces zich van buiten gezet heeft, dan is het van geen gevolg, zij zal van zelve doorbreken, en de etter er uitloopen. Meer vrees is er, wanneer de abces in de kaak ontstaat, de pijn gaat zelden geheel over, de zieke heeft slapelooze nachten, vermagert, en er komen ligt gevaarlijke toevallen van koorts bij. In dit geval wordt het noodzakelijk, om den tand uit te trekken, bijzonder wanneer dezelve aangestoken is; dit vordert wel bij Zwangeren meer omzigtigheid, en kan, wanneer het eene gezonde en met de kaak vergroeide kies is, eene ontijdige geboorte ten gevolge hebben; wanneer men intusfchen den tand niet uittrekt, is het te vreezen, dat de pijn den hoogsten graad bereikt, en dan ook eene ontijdige geboorte en nog andere gevaren veroorzaakt. Het moet derhalve in elk bijzonder geval alleen den Arts overgelaten worden, wat hij voor het beste en zekerste houdt.

§. 1194.

Als de Tandpijn alleenlijk een gevolg is der verhoogde prikkelbaarheid en gevoeligheid der zenuwen, de Zwangere buitendien een gevoelig ligchaamsgestel en eenen hysterischen aanleg heeft, en de Tandpijn met andere krampachtige en hysterische toevallen gepaard gaat, dan zijn zulke geneesmiddelen aangewezen, die de al te zeer opgehoopte en verhoogde gevoeligheid verminderen; bedekking der wang met een slechts matig verwarmd matrasje uit kamillen en vlier-

vlierbloemen, het inwrijven eener opiaatzalf met den vlugtigen salmiakgeest, de onmiddellijke aanwending van opiumstinktuur, van de essentia castorei, van kruidnagelolie, van azijnether, bij eenen gecariëerden tand met den tinktuur van myrrhe door middel van boomwolfe op den tand en het emplastrum de galbano crocatum of matricale op de slaapstreek gelegd, zijn de middelen, welke men met een overeenkomstig derzelver werking inwendig gebruik aanwendt.

§. 1195.

Wanneer de Tandpijn door onzuiverheid in de eerste wegen veroorzaakt wordt, men de tong en de tanden zeer onzuiver bevindt, de pijn trekkend en bij afwisseling in verscheidene tanden verspreidt, de smaak bedorven en de adem zeer stinkend is, dan zijn naar omstandigheden braak- en ontlastmiddelen aangewezen. Tevens moet men ook bij zulke Zwangeren een gepast, algemeen en bijzonder diët, met betrekking tot de onderhouding en zuiverheid harer tanden, voorschrijven, voornamelijk wanneer te gelijk door het gebruik van schadelijke spijsen en dranken de onzuiverheden te weeg gebragt en de Tandpijn onderhouden worden.

§. 1196.

Indien uitflag, rhumatismus of jicht aan de Tandpijn deel heeft, hetgeen men aan zekere kenteecken kan weten, dan moet men die inzonderheid uit den weg trachten te ruimen; men prijze vooral Spaansche vliegpleisters achter het oor en mosterdpappen op de armen, matrasjes uit kamillen en vlierbloemen,

men met kamfer op de wangen, en inwrijvingen met een opiaatsmeerfel, en, wanneer de zieke het kan verdragen, terpentijnolie aan de kaakgewrichten aan; daarmede pare men tot inwendig gebruik naar den graad van koorts zweetdrijvende middelen, namelijk: de liquor ammonii aceticus, de tartarus emeticus, het sulphur auratum antimonii in kleine giften, voornamelijk met kamfer, de dulcamana, het aconitum, de guajak enz. Is de rhumatieke en jichtige ontsteking van het tandvleesch zeer hevig en de koorts aanmerkelijk, dan is eene aderlating op den arm en de in §. 1092 opgegevene antiphlogistische methode aangewezen. Somwijlen wordt de pijn door de kwijling verminderd, en wanneer men derhalve waarneemt, dat de Natuur daartoe geneigd is, dan kunnen gepaste speekselwekkende middelen aangewend worden, waarbij echter de zieke zich voor verkouding moet wachten, en zich steeds warm houden. Het zou voor het overige te wijdloopig wezen, om nog uitvoeriger omtrent de geneeswijze der Tandpijn te zijn, en de middelen, om dezelve weg te nemen, op te geven.

L I T T E R A T U U R.

§. 1197.

BUNON, *dissertation sur un préjugé concernant les maux des dents des femmes grosses. Paris 1741. 4^e.*

MOGIN, *ergo praegnantii mulieri acutissimo dentis dolore laboranti ejusdem evulsio. 1788.*

SERRE, *Geschichte der Zahnschmerzen des schönen Geschlechts in ihrer Schwangerschaft. Wien 1788.*

Z E S D E H O O F D S T U K.

*Over de Pijnen in het Kruis bij Zwangeren.**Verschijsfelen.*

§. 1198.

Zwangeren, meestal die zulks voor de eerstemaal zijn, worden dikwijls met Pijnen in het Kruis gekweld, voornamelijk in de eerste maanden harer dragt. De pijnen zijn nu eens zacht, dan weder hevig, de Vrouwen traag, loom, kunnen niet gaan, en het trappen klimmen valt voor haar bijzonder moeilijk, en menigmaal geheel onmogelijk; zij veroorzaken somtijds koorts, benemen haar den slaap, beletten de spijsvertering en zijn met braken vergezeld.

Oorzaken.

§. 1199.

Uit Pijnen in het Kruis gedurende de eerste helft der zwangerheid kan men tot eene achteroverbuiging of onvolkomene uitzakking der baarmoeder besluiten; dikwijls zijn zij slechts medelijdende en aanbeiachtige uitwerksfelen. In de tweede helft kunnen oorzaken zijn: ongewoonheid aan de uitzetting der baarmoeder, en vooral de daaruit ontstane spanning der achterste baarmoedersbanden, die zich naar de eerste lendenwervelen en naar het heiligbeen uitstrekken, bijzonder

der bij eene ongemeene uitzetting der baarmoeder door eene te groote hoeveelheid van vruchtwater, door een zeer groot Kind of door tweelingen; de drukking van een sterk en groot hoofd op de heiligbeenszenuwen en de vaten; onwerkzame zittende leefwijze, het vast rijgen van den onderbuik door naauwe kleederen, voornamelijk om de zwangersheid te verbergen, en aanhoudende hardlijvigheid. Meermalen reeds nam de Schrijver de Pijnen in het Kruis als een symptoma der bloedstortingen bij Zwangeren waar; somwijlen zijn dezelve een symptoma eener ontsteking der nieren, baarmoeder of van het ruggemerg; in het laatste geval zijn zij meestal met pijnen in den rug vergezeld. Buitendien moet men in aanmerking nemen, dat zij ook de gevolgen van weeën, en derhalve een teeken der op handen zijnde geboorte, kunnen zijn.

Voorzegging.

§. 1200.

Wanneer de Pijnen in het Kruis in een' geringen graad plaats hebben, behoeft men niets te vreezen; doch zoo zij hevig en aanhoudend zijn, koorts daarmee verzeld is, dan kunnen zij van nadeelige gevolgen wezen; wanneer Zwangeren zich daarbij aan eene zittende onwerkzame leefwijze gewennen, dan zal de geboorte zeer langzaam, traag en pijnlijk zijn. Wanneer de aanbeijen aan Pijnen in het Kruis deel hebben, dan houden zij op, zoodra de aanbeijen bloeden. Bedenkelyk worden de Pijnen in het Kruis, wanneer zij op eene voorafgegane verkouding toe-

ne-

nemen, tot in de lendenstreek zich uitstrekken, en een symptoma eener ontsteking der nieren of baarmoeder, en eener achteroverbuiging der baarmoeder zijn, alsmede met veel braken verzeld gaan. Die Pijnen in het Kruis zijn het gevaarlijkst, welke een symptoma der ruggemergsontsteking zijn; zij worden vergezeld of reeds in de zwangerheid of bij de geboorte, door stuipen en Opisthotonus met boogswijze krommingen der ruggegraat, of de geboorte loopt wel zonder deze gevaarlijke verschijnselen met uitzondering der aanhoudende hevige Pijnen in het Kruis geheel regelmatig en gelukkig af, doch dadelijk na dezelve volgt spoedig en onverwachts de dood, met of zonder stuiptrekkingen; echter heeft er eene flauwte plaats, de bewustheid en de verrigting aller zintuigen houden op, de bovenste extremiteiten worden koud, de pols is nauwelijks voelbaar, en een spoedig flinken van het gansche ligchaam, doch bijzonder der onderste extremiteiten, is inzonderheid merkbaar (*).

Ge-

(*) Onder zulke verschijnselen verloor de Schrijver twee Vrouwen, die op de gemakkelijkste wijze verlost werden; geene bloedstorting der baarmoeder had er plaats, welke deze treurige tooneelen konde te weeg brengen; de in het werk gestelde openingen van het hoofd, der borst- en buikholte, alsmede der teeldeelen gaven geene opheldering. In twee gevallen, welke naderhand deze treurige ondervinding maakten, werd het ruggemerg van de halswervelen af tot het heiligbeen toe, geopend; met verwondering vond men het ruggemerg ontstoken en eene ophooping van water, bijzonder

Geneeswijze.

§. 1201.

Vóórdat men de aanwijzing bepaalt, wordt niet zelden een naauwkeurig uit- en inwendig onderzoek vereischt, ten einde zich te overtuigen, of de Pijnen in het Kruis niet de gevolgen eener achteroverbuiging of uitzakking der baarmoeder, of der reeds plaats hebbende geboorte zijn; want, zoo als bekend is, kunnen deze, de geboorte moge vóór of op den bepaalden tijd plaats hebben, verscheidene dagen, zelfs weken lang duren. Doch indien dit het geval niet is, en achteroverbuiging of uitzakking der baarmoeder ware oorzaak, dan moet men alleenlijk deze onregelmatige ligging der baarmoeder trachten te verhelpen.

§. 1202.

Indien de Pijnen in het Kruis ontspruiten uit eene ongewone uitzetting der baarmoeder, en door de in

§. 1199

in het ééne geval, van eene buitengewone hoeveelheid. Door deze lijkopeningen werd de Schrijver bijzonder opmerkzaam gemaakt bij alle Zwangeren, die over hevige Pijnen in den Rug en in het Kruis klaagden. In twee gevallen, het eene in het Kraamvrouwengesticht te Berlijn, het andere in de bijzondere Praktijk waargenomen, zijn beide Zwangeren door eene gepaste geneeswijze in hare dragt voor die ongelukkige gevolgen na de geboorte behoed en in het leven gebleven. Voorloopig strekke dit om alle Artsen en Vroedmeesters daaromtrent opmerkzaam te maken, terwijl de Schrijver belooft, daarvan bij de eerste gelegenheid eene breedvoerige verhandeling, benevens de ziektegeschiedenis en den afloop der geboorte in zijn *Journal für Geburtshülfe* te zullen mededeelen.

§. 1199 genoemde uitwerksfelen vermeerderd worden, dan late men de lijdereſ bij afwiſſeling op de regter en linker zijde liggen, en bij eenen daarmede vergezeld gaande hangenden buik de baarmoeder door eenen buikband onderſteunen. Daarbij bevele men gepaste, ligt verteerbare ſpijzen aan, voorts zacht ontlaſtende klisteren uit een aftrekſel van weekmakende kruiden met zeep, en eene doelmatige beweging, welke bij eene onwerkzame zittende leefwijze des te noodzakelijker is. Wanneer de Pijnen in het Kruis een symptoma van aanbeijen, eener ontſteking der nieren of baarmoeder zijn, dan komt de behandeling dier ziekten te pas. Bijaldien de Pijnen in het Kruis gevolgen eener ontſteking van het ruggemerg zijn, dan worden, inzonderheid bij irritabele, volbloedige geſtellen, algemeene aderlatingen, bloedzuigers en koppen, ſtrooken van moſterdpappen of Spaanſche vliegpleiſters op den rug en de lendenſtreek gelegd, inwrijvingen met de kwikzalf, de digitalis en het opium op dezelfde ſtreken, en laauwe baden uit zemelen en zeep, aanbevolen. Inwendig geve men anti-phlogiſtica, verkoelende ontlaſtmiddelen, het kwik met de digitalis en het opium. Stuipen, Opisthotonus of andere krampachtige verſchijnselen, daarmede gepaard gaande, worden als in §. 1165—1176 is opgegeven, behandeld. De Pijnen in het Kruis, welke in de laaſte maand der zwangerheid plaats grijpen, en gevolgen der drukking van het diep liggend hoofd in het bekken zijn, gaan dikwijls niet eerder over, dan na de Verloſſing.



 ZEVENDE HOOFDSTUK.

Over de Pijnen in den Voet bij Zwangeren.

Verschijselen.

§. 1203.

Zwangeren klagen somtijds over Pijnen in den Voet, die nu eens meer dan eens minder hevig zijn, en haar het gaan en het trappen klimmen moeilijk maken. Dikwijls bepaalt zich de pijn alleen op eene zeer kleine plek, of de zetel der pijn is slechts in de eene of andere spier, of verspreidt zich over den geheelen voet, en verhindert het gebruik van denzelfven; bij anderen is voornamelijk alleen de dij door pijn aangedaan, en deze verspreidt zich tot in de heupen.

Oorzaken.

§. 1204.

De oorzaken kunnen zijn: ophooping van bloed naar de baarmoeder, drukking der vaten door algemeene volbloedigheid, verzameling van onzuiverheden in de darmen en van harde drekstoffen, bijzonder bij eene trage zittende leefwijze en aanhoudende hardlijvigheid, drukking der zwangere baarmoeder op de lendenspieren (*psoas*) en lendenze-
nu-

nuwen, voornamelijk bij eene scheeve ligging op zijde der baarmoeder of bij eene dwarsche of scheeve ligging van het Kind, bij een naauw bekken en mismaaktheid van de ruggegraat, drukking van naauwe kleederen. Soms is de pijn het gevolg eener rhumatieke ontsteking of van eene Psoitis, van een verborgen gezwel of eener abces in de scheede en in het bekken, eener stofverplaatsing, bijzonder na een voorafgegaan huiduitslag; of een peesknoop (*ganglion*) is er oorzaak van.

Voorzegging.

§. 1205.

De Pijnen in den Voet zijn wel zelden van nadeelige gevolgen, maar gaan dikwijls eerst na de Verlossing over. Zij zijn van belang, wanneer zij het gevolg eener Psoitis of van eene verborgene abces in de scheede en in het bekken zijn. Kramp-pijnen, die door een ganglion ontstaan, worden dikwijls zeer hevig, en kunnen flauwten, stuip-trekkingen en wezenlijke vallende ziekte veroorzaken.

Geneeswijze.

§. 1206.

Indien deze Pijnen uit ophooping van bloed en volbloedigheid ontstaan, dan kunnen zij wel door algemeene aderlatingen verminderd, maar niet altijd geheel ontnomen worden, omdat het bloed zich naar de baarmoeder blijft ophoopen. Gedurende de pijn zelve moet men den voet in flanel wik-

kelen en denzelven aan de buitenste zijde van boven naar onder wrijven. Indien de Pijnen het gevolg zijn van vergaarde onreinigheden in de darmen en van harde drekstoffen, alsmede van de drukking der zwangere baarmoeder of van naauwe kleederen, dan vindt de behandeling §. 1202 plaats. Bij eene dwarsche en scheeve ligging van het Kind, van eene scheeve mismaakte ruggegraat, helpt geen geneesmiddel, en de Pijnen gaan eerst na de Verlossing over.

§. 1207.

Indien de Pijnen in den Voet het gevolg zijn eener rhumatieke ontsteking of van eene Psoitis, dan is de antiphlogistische methode aangewezen; in het laatste geval worden inzonderheid aderlatingen aanbevolen, het nitrum, het calomel, verzachtende stovingen en inwrijvingen der mercuriaal- en altheazalf in de heup- en heiligbeenstreek, en vooral laauwe baden. Wanneer zich echter uit de aanwezige symptomata reeds etter in het bekken gevormd heeft, dan bevele men diaphoretische en diuretische geneesmiddelen, waardoor de etter opgeslorpt en door de huidwafeming zoowel als door de pis ontlast wordt; de liquor ammonii aceticus, camphora, flores arnicae, radix senegae, radix squillae en vooral de herba digitalis purpureae zijn tot dat oogmerk zeer dienstig; daarmede vereenige men dagelijks warme baden, welke de resorptie van den etter zeer bevorderen. Doch niet altoos loopt de kwaal zoo gelukkig af, bijzonder wanneer de etter zich zeer diep geplaatst heeft; zij blijft verborgen tot na de Verlossing, en, ten gevolge van eene nieuwe daar-

daarbij gekomene ontsteking baant zij zich eenen weg door de scheede of door de liezen; meestal gaat er dan reeds caries van het bekken mede vergezeld, of komt er spoedig bij met eene sluipende koorts, en de Zwangere sterft binnen korten tijd of lang daarna aan de gevolgen van tering.

§. 1208.

Zijn de Pijnen in den Voet door een ganglion of een gezwollen zenuweinde ontstaan, meestal als een gevolg van hevige inspanning bij vorige geboorten, en gewoonlijk alleen in de zwangerheid, dan helpt doorgaans alleen het uitsnijden, waarbij echter hetzelfde volkomen moet afgescheiden worden, omdat het geringste overblijffel, bijzonder bij eene aanstaande zwangerheid, op nieuw pijn veroorzaakt, en zich weder begint te zetten.



VIERDE AFDEELING.

OVER DE ZIEKTEN DER BORSTEN BIJ ZWANGEREN
EN OVER HET GEBREKKIGE MAAKSEL DER TEPELS.

EERSTE HOOFDSTUK.

*Over de ziekelijke zwelling en ophooping van
Zog in de Borsten.*

Verschijselen.

§. 1209.

Reeds werd in §. 61 over de naauwere betrekking, waarin de Borsten ten tijde der zwangerheid met de baarmoeder komen, gewag gemaakt; zij worden dikwijls reeds in de eerste weken na de bevruchting voller, veerkrachtiger en meer gerond; de Zwangeren gevoelen een spannen, steken, huiveren, rilling, somwijlen met eene moeilijke ademhaling vergezeld; uit dezelve vloeit bij de minste drukking dikwijls reeds in de eerste maanden der zwangerheid, meermalen echter, doch later tegen het einde derzelve, een wit vocht. Deze veranderingen bewijzen de ook reeds wezenlijk gedurende de zwangerheid ver-
hoog

hoogde levenskracht der Borsten, doch zoodanig, dat zij niet over die der baarmoeder de overhand hebbe, en deze verschijnselen zelven zijn een gelukkig voortteeken; want de afscheidende vaten der klieren worden vrijer, en de aanstaande afscheiding van Zog in het kraambed wordt daardoor oneindig gemakkelijk gemaakt. In dezen graad is er ook geen nadeel te vreezen, bijzonder wanneer de Zwangere de Borsten voor alle prikkeling, drukking en verkouding bewaart, met een' warmen doek bedekt houdt, en alle te voedzame, verhittende spijsen en dranken vermijdt.

§. 1210.

Doch somwijlen bereiken de genoemde verschijnselen eenen hooger graad; de Borsten zwellen buitengemeen, worden hard en pijnlijk, de afscheiding eener melkachtige vochtigheid of van volkomen bereid Zog wordt te overvloedig, is met koortsachtige bewegingen, benaauwdheden, hoofdpijn en een' hevigen steek vergezeld, de Zwangere vermagert op het laatst, verliest den eetlust enz.

Oorzaken.

§. 1211.

De naaste oorzaak der verschijnselen (§. 1210) is eene te zeer verhoogde levenskracht der Borsten, die nu reeds over die der baarmoeder de overhand tracht te krijgen en juist daardoor ziekte te kennen geeft; zeer prikkelbare, volbloedige, reproductive gestellen, Vrouwen, die te voren de maanstonden

zeer overvloedig hadden, zijn inzonderheid aan dit lijden der Borsten onderhevig, en door een te voedzaam, verhittend diët, door eene onwerkzame zittende leefwijze, wegens het te menigvuldig betasten der Borsten door de Mannen, waarbij tevens de teeldrift te zeer opgewekt wordt, door het lezen van boeken, die de zinnelijkheid opwekken, het nu en dan waschen der Borsten met te prikkelende, welriekende middelen, en door plotselinge verkouding na voorafgegane verhitting, kan aan deze onregelmatige zwelling en ophooping van Zog nog veeleer aanleiding gegeven worden.

Voorzegging.

§. 1212.

De buitengewone zwelling en ophooping van Zog in de Borsten ten tijde der zwangerheid is wel niet altijd gevaarlijk, bijzonder wanneer de Zwangere een geregeld diët houdt; ja het ontbreekt niet aan waarnemingen, dat bij eene langdurige zeer vermeerderde afscheiding van Zog Zwangeren hare kinderen volkomen voldragen hebben, niettegenstaande zij daarbij zeer mager werden. Maar de ondervinding leert ook het tegendeel; plotselinge verkouding, bijzonder na voorafgegane verhitting, kan ligt melkknobbels, ontstekingen en veretteringen der Borsten doen ontstaan, en zoo er eene hevige koorts mede vergezeld gaat, dan is er eene ontijdige geboorte te vreezen, zoodra de daarin te zeer verhoogde levenskracht over die der baarmoeder de overhand bekomt, waarbij de voeding van den foetus

gestoord en zijn organisch verband met de baarmoeder verbroken wordt. Soms doet ook het ontstaan van te veel Zog nadeel aan de Moeder, verzwakt hare reproductie buitengemeen, zij vermagert daarbij zeer, en kan zoo zwak worden, dat zij tot onderhouding van hare gezondheid gedurende haar kraambed het Kind de Borst niet geven kan. Nadeelig is de te menigvuldige afzondering van Zog voor diegenen, welke, ten gevolge van het maakfel hares ligchaams, neiging tot bloedspuwen en tot longtering hebben; men heeft opgemerkt, dat zulke Vrouwen zelfs gedurende den vermeerderden toevloed van Zog reeds in de zwangerheid soms bloedspuwingen krijgen.

Geneeswijze.

§. 1213.

Bijaldien de buitengewone zwelling en te overvloedige ophooping der Borsten niet met pijn en koorts vergezeld gaan, dan zijn dikwijls de volgende gezondheidsregelen toereikend, om dezelve te verminderen, of ten minste verdere nadeelige gevolgen, die daaruit kunnen ontstaan, te verhoeden:

- 1) de Zwangere mag de Borsten niet te zeer opbinden en prangen; de drukking, waardoor Vroedvrouwen en andere raadgeeffters wanen, het Zog te kunnen verdrijven, is dikwijls zeer nadeelig, en veroorzaakt melkknobbels, die gemakkelijk tot ontsteking overgaan; men bevele eene dienstige kleding en eene gepaste ondersteuning der Borsten aan.
- 2) De Borsten moeten voor koude behoed worden,

bij-

bijzonder als het ligchaam verhit is; men rade derhalve bijzonder eene warme, ligte bedekking met eenen zachten doek aan. 3) De Zwangere moet eene onwerkzame zittende leefwijze vermijden, zich met gepasten arbeid bezig houden en veel beweging maken; daardoor worden de overige afscheidingen, bijzonder die der huid, zeer bevorderd, waardoor de afscheiding van Zog verminderd wordt; 4) zij gebruike geene te voedzame en verhittende spijsen en dranken, bijzonder niet zulke, welke buitendien de zogafscheiding te zeer bevorderen, dunne spijsen, meestal uit het plantenrijk, gekookte vruchten e. d. g. zijn dan in dat geval verkieslijker, wanneer de Zwangere buitendien gezond is en voornamelijk een zeer reproductief gestel heeft; bij zwakkelijke, gevoelige gestellen en aanmerkelijke vermagering van het ligchaam heeft er eene uitzondering plaats. 5) De Zwangere zorge steeds voor eenen geregelden stoelgang, waartoe eene werkzame leefwijze, veel beweging en een geschikte leefregel het hunne zullen bijdragen; 6) zij vermijde alle aandoeeningen, welke de teeldrift en de levenskracht in de Borsten te zeer opwekken; zij matige zich derhalve in het genot van de liefde, waardoor tevens tot wellustige betasting en der Borsten aanleiding gegeven wordt, die de ophooping en naar de Borsten en bijgevolg ook de zogafscheiding vermeederen; 7) zij moet het waschen der Borsten met welriekende wateren nalaten, die wegens derzelver al te groote prikkeling der Borsten, en inzonderheid der tepels, zeer nadeelig zijn; 8) zij moet omzigtig wezen in de keus der middelen, waar-
door

door de tepels voor het aanstaande zogen voorbereid worden, opdat zij geene te prikkelende bestanddeelen bevatten; te dezen aanzien doen somtijds de uitgeholde muskaatnoten of tepelhoedjes nadeel, welke met een te prikkelend vernis bestreken zijn.

§. 1214.

Indien de zwelling en spanning der Borsten zeer hevig is, bijzonder bij diegenen, welke voor de eerste maal zwanger en reeds bejaard zijn, of bij zoodanige Vrouwen, wier vezelen in het algemeen eene bijzondere slagheid hebben, dan late men de Borsten met fijn flanel, wol of gewaste taf bedekken; ook worden, wanneer daardoor geene verzachting te weeg gebragt wordt, inwrijvingen met warmgemaakte amandelolie en het gebruik van een borstbad aangeprezen, waartoe het badbekken van den overleden Hofraad STEIN bijzonder geschikt is.

§. 1215.

Doch somtijds wordt de hevige spanning en zwelling der Borsten bijzonder vermeerderd, doordien het afgescheidene vocht wegens morsigheid en onreinigheid op den tepel of bedekking met het smerig huidje (*cuticula sebacea*) niet kan uitvloeijen; de reiniging van den tepel en voorzigtige wegneming van het genoemde huidje, door middel van betting met zeepwater of een bad uit een aftreksel van kamillen- en vlierbloemen, zal het uitvloeijen bevorderen, en vervolgens de spanning verminderen; in het vervolg laat men den tepel met kamfergeest waschen, die met het genoemde aftreksel vermengd wordt.

§. 1216.

§. 1216.

Zoo de toevloed van Zog in eenen hoogen graad vermeerderd, het fteken en de pijn in de Borsten buitengemeen hevig is, deze zeer hard, pijnlijk en gezwollen zijn; men plaatselijke ontsteking te duchten heeft, met koorts vergezeld is, de Zwangere een volbloedig prikkelbaar gestel heeft, te voren ook invloeden plaats hadden, waardoor de prikkelbaarheid in het vaatgestel te zeer verhoogd werd, dan zijn algemeene aderlatingen, ontstekingwerende middelzouten, zachte ontlastmiddelen, kortom de antiphlogistische geneeswijze dringend aangewezen. Geheel bijzonder worden tot plaatselijke bloedontlastingen de bloedige koppen, hetzij op de beide bovenarmen, of alleen op dien, aan welks zijde de meeste toevloed van Zog naar de Borst plaats heeft, aanbevolen; men laat den bovenarm, het best aan het gewricht van den elleboog, in eenen regten hoek buigen en aldus gebogen tegen het lijf houden, en kiest dan tot aanwending de plaats aan de buitenste zijde van den bovenarm, waar deze aan de inplanting van de deltapier eene groef maakt. Over de Borsten zelven laat men slechts een' verwarmenden doek of flanel leggen, of in het geval de pijn en de spanning niet spoedig verminderen, eene matig warme pap van gekookte rijst omflaan, welke de Schrijver altijd zeer werkzaam vond.

§. 1217.

Indien de ophooping van Zog aanhoudend, zeer overvloedig, wel zonder koorts en pijnen is, maar waardoor de voeding van Moeder en Kind lijdt, dan
laat

laat men dagelijks eenige giften van het zwavelzure loogzout (*arcantum duplicatum*) nemen, en de Borsten, zoodra het Zog uitgevloed of door een zuigglas uitgehaald is, met eene in azijn natgemaakte spons of met een aftreksel van aromatische kruiden stoven. Doch de drooge stovingen, die door middel van zacht flenel of wol aangewend worden, welke men over met gewone witte suiker of mastik bestrooide kolen verwarmt, of met kamfer bestrijkt, verdienen veel meer aanbeveling. Wanneer deze middelen ook den toevloed van Zog niet verminderen, dan kan men nog beproeven, om drooge koppen op de bovenarmen te zetten. Voor het overige heeft de Schrijver waargenomen, dat het in vele gevallen moeilijk is, om dit toeval te beperken; men moet dan alleen de in §. 1213 opgegevene gezondheidsregelen dringend aanbevelen, en inzonderheid daarvoor zorgen, dat de Zwangere hare Borsten, wanneer zij zeer nat worden, niet verkoude, en door het dikwijls verwisselen van matig verwarmde doeken tegen de nattigheid zoo veel mogelijk behoeden.



T W E E D E H O O F D S T U K.

*Over de Ontsteking der Borsten.**Verschijselen.*

§. 1218.

De Borsten, hetzij slechts eene of beide te gelijk, kunnen in de zwangerheid ontstoken worden; deze is of eene uitwendige zichtbare, meestal roosachtige Ontsteking, welke met spanning en pijn vergezeld is, doch naderhand, inzonderheid bij verzuim, tot eene in de klierschijf zelve dieper zich verspreidende phlegmoneuse Ontsteking overgaat, of zij is dadelijk in den beginne eene in de diepte van het klierorgaan gevormde Ontsteking, die naderhand eerst uitwendig zichtbaar wordt; de eerste onderscheidt zich daardoor, dat men dadelijk in het begin aan de eene of andere zijde der Borst een rozenrood waarneemt; doch de laatste is alleen door de meestal kloppende pijn, en door de eerst later volgende zwellings der Borst kenbaar; beide echter zijn met koorts vergezeld, die het kenteeken eener Synocha of van een' Synochus heeft, bijzonder wanneer het eene roosachtige Ontsteking is.

Oorzaken.

§. 1219.

De Borsten zijn overeenkomstig derzelve in de zwangerheid verhoogde levenskracht op zich zelve reeds zeer geneigd tot Ontsteking, welke des te gemakkelijker ontstaan kan, naar mate eene spoedige zamentrekking in derzelve vaatgestel plaats grijpt, waardoor de afscheiding gestoord wordt, en opstoppingen ontstaan; verkouding is derhalve gewoonlijk de uitwendige oorzaak, welke de Schrijver ook bijna altijd bevestigd heeft bevonden; de lijderezen waren tevens van een zeer prikkelbaar, volbloedig gestel, hadden zeer groote Borsten en meestal bij het waschen in den winter of in gure dagen van den herfst en het voorjaar zich de Ontsteking op den hals gehaald; in het waschvertrek gaan zij bovendien dunner gekleed, en stellen bijzonder hare voeten aan de koude bloot, welke met de Borsten in een bijzonder verband schijnen te staan; ook bij zwangere ontuchtige Vrouwspersonen, die des nachts op straat haar bedrijf uitoefenen, wordt de Ontsteking der Borsten niet zelden waargenomen. Buitendien kan er door het menigvuldig betasten en door het te nauw prangen der Borsten, tot Ontsteking aanleiding gegeven worden; in één geval zag de Schrijver dezelve door de al te geweldige aanwending der middelen ter ophaling van de tepels ontstaan, waarbij de Borst te zeer gedrukt werd; dat nu al deze invloeden des te gemakkelijker Ontsteking veroorzaken, naar mate eene onregelmatige zwelling en ophooping

van zog in de Borsten met eene heviger spanning en pijnen vergezeld gaat, laat zich gemakkelijk begripen; hier moet men niet alleen de grootste omzigtigheid bij de aanwending van zuigglazen en zogpompen aanbevelen, welke gemakkelijk door derzelver drukking of het koud opleggen Ontsteking veroorzaken; maar in dit tijdstip zijn ook de prikkelende borstpleisters en zalven bijzonder nadeelig, die door Kwakzalvers, Vroedvrouwen of oude Moeders zeer ontijdig aangewend worden.

Uitgang.

§. 1220.

De Ontsteking der Borst in de zwangerheid kan zich verdeelen, waardoor de geregelde verrigting van het orgaan volkomen hersteld wordt, of zij gaat tot verharding of ettering over. De verdeling heeft zelden plaats; veel menigvuldiger zijn de beide overige uitgangen, verharding en ettering. De verharding is niet kwaadaardig en alleenlijk het gevolg der gestoorde afscheiding, der opstopping, ophooping van vochten en der verzwakte verrigting der vaten, die na de Ontsteking overblijft; zij duurt dikwijls nog de geheele zwangerheid door en verdwijnt eerst na de Verlosfing met de plaats grijpende zogaffscheidung, bijzonder wanneer het Kind vroegtijdig aan de Borst gelegd wordt, en het zogen gemakkelijk en gelukkig geschiedt. Maar dikwijls wordt, bijzonder in de laatste maand der zwangerheid of wanneer er schadelijke invloeden bijkomen, de verharding op nieuws ontstoken,

ken, en er volgt ettering. De ettering der Borsten, de menigvuldigste uitgang der Ontsteking, duurt dikwijls nog de geheele zwangerheid door, of indien ook de uitvloeijing ophoudt, dan wordt roch, ten zij de ontstokene plaats slechts eenen geringen omtrek beslaat, zelden nog in de zwangerheid de volkomene gezondheid en welgesteldheid der Borst hersteld; er blijft meer of min verharding over, die eerst in den volgenden zoogtijd volkomen verdeeld wordt, of in dit tijdperk tot Ontsteking en dan op op nieuw tot ettering overgaat.

Voorzegging.

§. 1221.

De Ontsteking der Borsten is wel niet gevaarlijk, en zou zulks nog minder zijn, indien slechts Zwangeren altijd dadelijk, zoodra zij bespeuren, dat zij ziek worden, gepaste hulp zochten. Een hoogere graad van Ontsteking met hevige pijn en spanning kan aanleiding tot stuiptrekkingen en tot eene ontijdige geboorte geven; de daarop volgende te sterke ettering verzwakt zeer de reproductie der Moeder, en zal dan ook altijd op de voeding van het Kind invloed hebben; de Schrijver zag eene Zwangere door eene zenuwkoorts overvallen, ten gevolge der te menigvuldige ettering; de koorts was met ijelhoofdigheid verzeld, en men vreesde voor het leven der Zwangere. De overblijvende verhardingen in de Borsten worden voor eene Zwangere ook zeer nadeelig, omdat zij in het kraambed ligt tot Ontsteking en ettering overgaan, en tevens daardoor

en door de nieuwe hevige pijnen het zogen zeer onaangenaam maken.

Geneeswijze.

§. 1222.

De Ontsteking der Borst te verdeelen, moet als de eerste en belangrijkste aanwijzing beschouwd worden, omdat alleen daardoor de geregelde verrigting van het orgaan weldra weder kan hersteld, en ook de verdere gevolgen verhoed worden, waarmede dikwijls Zwangeren maanden lang te worstelen hebben. Het doel der verdeeling zal echter slechts dan bereikt worden, wanneer men tijdig geneeskundige hulp inroept en de Ontsteking nog niet tot verharding of ettering tracht over te gaan. Vindt men derhalve, dat de koorts het kenmerk eener Synocha heeft, de lijderes buitendien van een volbloedig prikkelbaar gestel is, de pols vol en hard slaat, de Zwangere over hitte en dorst, na voorafgegane koude klaagt, en inzonderheid de pijn en de hevigste roodheid kort daarop plaats had, dan drale men niet om eene algemeene bloedontlasting voor te schrijven, en inwendig nitrum in toereikende giften toe te dienen; de leefregel moet geheel antiphlogistisch zijn, en bijzonder dient er ook gezorgd te worden, dat de Zwangere zich rustig in het bed houde en de Borst behoorlijk ondersteund worde. Maar indien de koorts niet van belang, en de spanning en de pijn minder hevig zijn in de Borsten, dan late men bloedzuigers aan dezelve zetten, waarvan men bij de Ontsteking der Borsten meer gebruik moest maken.

§. 1223.

Indien de Ontsteking meer van eenen erysipela-
teusen aard is, en de koorts geen' te hoogen graad
bereikt heeft, dan moet de lijderes zich matig warm
houden, en zweetmiddelen, eene oplossing van den
braakwijnsteen, en bij het afnemen der koorts vooral
de liquor ammonii aceticus gebruiken; heeft de koorts
het kenmerk van eenen Synochus en hadden er in-
vloeden te voren plaats, waardoor de geregelde ver-
rigting der spijsverteringswerktuigen gestoord werd,
dan worden zachte ontlasmiddelen, bijzonder ta-
marinde, manna, bitteraarde en cremor tartari aan-
geprezen, waarbij echter, bij diep knagende hevige
pijnen, de bloedzuigers, aan de lijdende Borst gezet,
niet uitgesloten mogen worden, om de verdeeling te
bewerken. Indien de Ontsteking der Borst het ge-
volg is van eenen ongeregelden toevloed van zog,
dan behandelde men dezelve als in §. 1216 is opge-
geven; inzonderheid zullen de bloedige koppen, op
de bovenarmen gelegd, zeer veel tot wegneming
der Ontsteking bijdragen.

§. 1224.

Uitwendige middelen worden er bij de bijgebragte
behandeling, en wanneer men tijdig geroepen wordt,
volstrekt niet vereischt; ja men kan beweren, dat
daardoor, inzonderheid dezulke, welke door Kwak-
zalvers, Vroedvrouwen en oude Moeders aangeraden
worden, gewoonlijk de Ontsteking eerder vermeerde-
ren, dan dat zij de verdeeling zouden bevorderen,
en den overgang tot verharding en ettering bespoe-

digen. Men bedekke de borst met een' zachten, matig verwarmden doek of zacht flenel, ondersteune dezelve door middel van een' schortband, bevele eene rustige horizontale ligging in het bed of op eene sofa aan, en behoede ze voor drukking, verkouding en het gebruik van al te prikkelende middelen, natte compresen, pleisters, zalven e. d. g., bijzonder wanneer het eene roosachtige Ontsteking is. Bij eene diep zittende phlegmoneuse Ontsteking heeft echter, na aanwending der bloedontlastingen en van de verdere ontstekingwerende geneeswijze, de stoving met eene niet te vochtige en matig warme pap van rijst nog de meeste uitwerking gedaan; andere pappen, bijzonder wanneer ze te vochtig of te heet opgelegd worden, verdeelen de Ontsteking niet, en bespoedigen den overgang tot verharding en ettering.

§. 1225.

De hulp van den Arts, om de Ontsteking volkomen te verdeelen, wordt meestal te laat ingeroepen; want omdat de Zwangeren in het begin op de ongesteldheid weinig acht geven, zoo verzuimen zij niet alleen den Arts te raadplegen, maar stellen zich nog meer aan de schadelijke invloeden bloot, inzonderheid aan verkoudingen, of zoeken haar heil in het gebruik van al te prikkelende zalven, pleisters, te warme matrassen e. d. g., die de Ontsteking vermeederen en verharding en ettering des te zekerder te weeg brengen. Aan eene volkomene verdeeling is dan niet meer te denken; intusschen is de pijn hevig en bijzonder in de

de diepte kloppend, en duurt de ontstekingskoorts nog in eenen hoogen graad voort, dan is desniettemin de in §. 1222 bijgebragte geneeswijze aangewezen, om ten minste de plaatselijke Ontsteking te beperken.

§. 1226.

Er hebben dan twee gevallen plaats: of de Ontsteking verdwijnt, doch er blijven verhardingen of knobbels in de borst over, die bij het aanraken niet pijnlijk zijn; of deze verhardingen veroorzaken bij aanhoudendheid pijn, de Borst zwelt telkens meer op, de zieke heeft bestendig koorts bij afwisfeling met huivering en nachtzweet vergezeld; in dit geval is er eene ettering op handen. In het eerste geval bevele men de Zwangere aan, alles te vermijden, wat die knobbels zou kunnen doen ontsteken; vooral wende zij slechts geene uitwendige middelen aan, om deze knobbels te verdeelen of zacht te maken, het geringste kan ligt weder Ontsteking te weeg brengen, en dan is de ettering onvermijdelijk. Zij moet de Borst met eenen zachten doek of met een lamsvelletje bedekt houden, en door een suspensorium ligt ondersteunen, zij vermijde drukking, kwetfing en verkouding, zij neme matigheid in acht bij het gebruik van spijs en drank, vermijde alles, wat den toevloed van vochten naar de Borsten te zeer vermeerdert, onderhoude alle overige se- en excernerende verrigtingen, en leide eene onschadelijke werkzame leefwijze. Bij deze voorzorg kunnen de verhardingen, zoo al niet geheel verdwijnen, ten minste verminderen, en indien in het vervolg de zoogtijd invalt zonder in het oog loopende

storing, en men het Kind vroegtijdig aan de Borst legt, dan wordt alle hardheid gedurende het kraambad volkomen opgelost.

§. 1227.

Doch indien er in het tweede geval (§. 1226) alle symptomen eener op handen zijnde ettering zich voordoen, dan trachte men deze door weekmakende pappen te bevorderen, en late de ontlasting van den etter aan de natuur over. De daarmede verbonden koorts kan ook het kenmerk eener Synocha hebben, en de ontstekingswerende geneeswijze vereischen, doch in het vervolg bij aanhoudende menigvuldige ettering van eenen zenuwachtigen aard worden, waarbij de irritabiliteit en reproductie der zieke zeer sterk daalt. Alsdan heeft de aanwijzing plaats, welke bij den gemelden aard der koorts vereischt wordt; doch wanneer deze afneemt, en inzonderheid de pijn in de Borst verdwenen is, dan tracht men door versterkende en zacht voedende middelen de gezonkene reproductie der zieken op te beuren.

§. 1228.

De uitgang der tot ettering overgegangene Ontsteking is dan verschillend; daardoor wordt alle hardheid opgelost en de Borst volkomen hersteld, of er blijven nog eenige opstoppingen, knobbels en verhardingen over, welke bij de in §. 1226 opgegevene voorzorg van tijd tot tijd en des te eerder verdwijnen, naar mate het tijdperk der aanstaande geboorte nog verre af is, en er geen ongeregelde toevloed van zog plaats heeft, of dezelve worden
eerst

eerst in het kraambed opgelost, of gaan alsdan tot ettering over, wanneer de gemakkelijke en geregelde afscheiding van zog gestoord, of het aan de Borst leggen van het Kind geheel verzuimd wordt. Soms tijds heeft ook eene oplossing van kali tartarisatum of potasch, als matig warme stovingen aangewend, zulke overblijvende knobbels weggenomen. Zoude het in menig geval, wanneer er bij den volgenden zoogtijd Ontsteking en ettering te vreezen ware, waardoor de pligt eener Moeder, om zelve haar Kind te zogen, dikwerf zoo zeer veronaangenaamd wordt, niet raadzamer zijn, om inwendig van het kwik gebruik te maken, inzonderheid wanneer daardoor noch de reproductie der Moeder, noch de voeding van het Kind lijdt? Bij eene voorzigtige aanwending daarvan kan het geen kwaad doen, vooral wijl Zwangeren, naar de ondervinding van den Schrijver, zeer groote giften van dat middel zonder nadeel kunnen verdragen.



DERDE HOOFDSTUK.

*Over de Ontvelling der Borsten.**Verschijselen.*

§. 1229.

De Ontvelling der Borst heeft of aan de algemeene bekleedselen plaats, of bepaalt zich alleen tot de tepels met den hen omgevenden kring; in het eerste geval wordt het vel rood, ontstoken en pijnlijk, meestal in eene onder eene groote nederhangende Borst gevormde plooï; in het tweede is de tepel insgelijks zeer rood, ontstoken, gesprongen, glimmend, als eene zweer, en ten uiterste gevoelig.

Oorzaken.

§. 1230.

De Ontvelling der bekleedselen wordt begunstigd door eene zeer vette neêrhangende Borst, inzonderheid bij verzuim der noodzakelijke zuiverheid onder de plooï, zoodra de huidwaseming zeer heeft toegenomen; scherp zweet, de eene of andere verborgene uitslag, het menigvuldig krabben der Borsten met de nagels, hevige drukking van kleederen en de uit keurslijven stekende baleinen kunnen deze kwaal
des

des te eerder doen ontstaan. — De tepels ontvellen spoedig bij eene te teedere opperhuid, bij eene gewelddadige of geheel verzuimde losmaking der cuticula sebacea, bij eene morfige bedekking, die vast aan den tepel kleeft, bij eene ruwe betasting van den tepel, bijzonder van ruwe morfige handen, bij de wrijving van grove vuile hemden, en bij de aanwending van ongepaste en schadelijke middelen, om kleine tepels op te halen. Somwijlen neemt men waar, dat Vrouwen reeds tamelijk opgewasfene kinderen nog in de zwangerheid zogen, die haar de tepels door het zuigen ontvellen. Menigmaal heeft ook de eene of andere uitflag hier deel aan.

Voorzegging.

§. 1231.

Gedurende de zwangerheid heeft de Ontvelling der tepels zoowel als der algemeene bekleedfelen geene bijzondere gevolgen; maar voor het na de Verlosfing plaatshebbende kraambed is dezelve zeer nadeelig; het zogen wordt daardoor zeer gehinderd en pijnlijk, en des te meer moet men reeds in de zwangerheid alles aanwenden, om de kwaal weg te nemen, wijl de hulp in het kraambed met vele zwarigheden vergezeld gaat; en dewijl Vrouwen, die eens daaraan leden, bij eene volgende zwangerheid en kraambed weder daarvan overvallen worden.

Geneeswijze.

§. 1232.

Men moet vooral acht geven, of de Ontvelling der Borsten niet door bijzondere uit- en in-

inwendige invloeden ontstaan zij en gedurig onderhouden worde; deze, zoo als daarvan verscheidene in §. 1230 opgegeven werden, te verwijderen, is de eerste aanwijzing. Bij de Ontvelling der Tepels moet men evenwel de cuticula sebacea en de morfigheid, die zich in allen gevalle daarbij mogt bevinden, met zeepwater losweeken en voorzigtig wegnemen, en dan, na verwijdering van alle invloeden, de ontvelde plaatsen aan den Tepel zoowel als aan het overige gedeelte der Borst met een middel dikwijls waschen laten, waardoor zij weldra genezen worden. Kalk- of Goulardswater zijn tot dat oogmerk bijzonder dienstig. Daarnevens bevele men de grootste zindelijkheid aan, late de Borst behoorlijk ondersteunen, en bij de Ontvelling der bekleedselen eener zeer vette neêrhangende Borst, tot verhoeding van het wrijven, de ontvelde plaats met plukfel bedekken; bijaldien echter verscheidene plaatsen op de huid etteren, dan wende men eene zalf uit kalk, lood of zink aan.

§ 1233.

Doch als de oorzaken weggenomen zijn, vordert de Tepel eene bijzondere zorg, om voor het volgende zogen niet op nieuw aanleiding tot ontvelling te geven. Men late een tepelhoedje dragen, en den Tepel zelven, bijzonder bij eene teedere opperhuid, met THEDEN's wondwater, wijngeest, eau de lavande of met een afkooksel van wilgenbast waschen; HAHNEMANN prijst versch kalkwater en het bestrooijen der Tepels met het poeder van galnoten aan, en indien er roodheid en Ontsteking plaats

plaats heeft, dan wende men eene oplossing van het witte vitriool aan, waarmede de Tepel dikwijls bestreken wordt (*).

(*) Tegen zeere tepels bij Kraamvrouwen heb ik dikwijls met het beste gevolg het smeersel van JÖRG aangewend, bestaande uit:

Balsam. Peruv. $\frac{3}{4}$ i

Solv. cum Vitell. ovi q. s.

Sp. Lavendul. $\frac{3}{4}$ i β

Hiermede worden de ontvelde tepels, telkens nadat het Kind er aan gezogen heeft, besmeerd, zorg dragende, dat dezelve niet aan de kleederen kleve. Vóórdat men het Kind de Borst geeft, wasche men deze tepels voorzigtig met koud water af. Daar echter de genezing zelden spoedig volgt, zoo raadt de Heer JÖRG, in deszelfs *Handbuch der Krankheiten des menschlichen Weibes*, Leipz. 1809, bl. 487, om dit ongemak te voorkomen, dat Vrouwen, die eene zeer gevoelige en teedere huid hebben, vooral welke voor de eerste maal zwanger zijn, vier of zes weken vóór hare Verlossing zich dagelijks drie a vier malen met arquebusade, rum, sterken brandewijn of eau de Cologne waschen, waardoor men de huid hard maakt en dezelve niet ligt door het zogen zal ontveld worden.



VIERDE HOOFDSTUK.

Over den Uitflag aan de Borsten.

Verschijselen.

§. 1234.

Somtijds neemt men aan de Borsten der Zwangere-
 ren Uitflag waar; deze verspreidt zich of alleen op
 de huid buiten den kring en den tepel, of bedekt
 ook deze tevens of slechts alleen. De Uitflag is
 verschillend van gedaante: *a*) zijn het kleine witte
 puistjes, die eenen roodachtigen grond hebben,
 Lymphe bevatten en aan de Zwangere spanning,
 brand en jeukte veroorzaken, waardoor zij genood-
 zaakt worden om te krabben, en dan ligt ontvellen
 en zweren veroorzaken; *b*) zijn het kleine vlekken,
 die somtijds hoog geel of bruinachtig zijn, korsten
 vormen, weder afvallen en op nieuw te voorschijn
 komen, vervolgens in huidzweren overgaan of droog
 worden, en hard blijven; of *c*) de kring, de tepel
 en somtijds ook nog het overig gedeelte van de
 Borst is met eene dikke geelbruine korst bedekt,
 die in den beginne uit puisten ontstaat, weldra
 doorbreekt, en eene taaie, kleverige, geelachtige
 vochtigheid afzondert; deze Uitflag heeft met de
 melk-

melkkorst der kinderen de meeste overeenkomst. De spruwzweertjes bemerkt men aan den tepel der Zwangeren zeldzamer; meestal alleenlijk na de Verlossing in den zoogtijd, welke derhalve op hare plaats zullen gemeld worden.

Oorzaken.

§. 1235.

Aan den Uitslag der Borsten is schurft of venerische besmetting oorzaak; de aethiologische verhouding der eerste heeft gewoonlijk de onder letter *a* (§. 1234) beschrevene Uitslag (*), daar integendeel de onder letter *b* aangewezenen gedaante van eenen venerischen somtijds ook van eenen herpetischen aard is. De dikke geelbruine korst, letter *c*, waarmede de tepel en deszelfs kring bedekt zijn, is dikwijls een gevolg der in de zwangerheid reeds zeer verhoogde levenskracht der Borsten, en van de daardoor vermeerderde afzondering eener overvloedige voedingsstof. De wrijving der tepels en van derzelver kring door kleederen, bijzonder door grove, morsige hemden, door het te dikwijls betasten der Mannen, door een te prikkelend en voedzaam diët, en te warme bedekking der Borst, kan in dit geval des te eerder dien Uitslag veroorzaken.

Voor-

(*) De Schrijver nam dezen uitslag het meeste waar bij Jodinnen, bij welke de schurft doorgaans zeer gemeen is.

Voorzegging.

§. 1236.

De Uitslag aan de Borsten, bijzonder wanneer zij van eenen schurftachtigen of venerischen oorsprong zijn, geven gemakkelijk aanleiding tot ontstekingen, etteringen en kwaadaardige zweren, waardoor het zogen in het kraambed gestoord en de zuigeling ligt aangestoken wordt. De Uitslag, die een gevolg der al te zeer verhoogde levenskracht en de daardoor vermeerderde afzondering van eenen overvloed aan voedingstof is, duurt dikwijls de geheele zwangersheid door, en verdwijnt eerst volkomen met den plaatshebbenden zoogtijd na de Verlosfing. Voor het overige wordt de Uitslag aan de Borsten bijzonder zeer verergerd, doordat Kwakzalvers, Vroedvrouwen en oude Moeders, zeer schadelijke middelen, gewoonlijk bij wijze van zalven of pleisters, aanraden.

Geneeswijze.

§. 1237.

Iedere Zwangere, die eenen Uitslag aan de Borsten heeft, moet men vooral de grootste zindelijkheid en verzorging der Borsten aanbevelen; voornamelijk moet men op het dikwijls verwisfelen van schoon linnen bedacht zijn, en alle werktuigelijke invloeden verwijderen, welke tot wrijving en drukking der Borsten aanleiding geven. Buitendien onderzoek men naauwkeurig, of de uitslag van eenen schurft-

ach-

achtigen aard of door venerifche aanfteking veroorzaakt zij; men herkent dit niet alleen zeer dikwijls aan de gedaante van den Uitflag, maar ook uit andere verschijnselen, die daarmede gepaard gaan, en men uit deze of gene gedaante bepaaldelijk opmaken kan. De schurftachtige Uitflag vereischt de bij de schurft plaatshebbende algemeene behandeling; de zwavelbloemen, het pokhout, zachte ontlastmiddelen enz. worden hier aangewezen; de Uitflag zelf verdwijnt bij zorgvuldige zuiverheid, of men laat denzelfden met zeepwater, of een afkookfel van dulcamara waschen.

§. 1238.

Wanneer de Uitflag van eenen venerifchen aard is, dan kan dezelve alleen door de aanwending van het kwik op de zekerste wijze genezen worden; het zoete kwik met goudzwavel is het minste schadelijk tot inwendig gebruik, en uitwendig laat men de Borst met een aftreksel van chairophyllum sylvestre, met kalkwater of aqua phagadaenica waschen, en ingeval er belangrijke korsten of zweren ontstaan zijn, worden dezelve met de zalf van ZELLER verbonden. — Is de Uitflag van eenen herpetifchen aard, dan diene men inwendig een decoctum van toxicodendron, van dulcamara, van olmenbast, mercuriaal- en antimoniamiddelen toe, waarmede gedeeltelijk ook derzelver uitwendig gebruik, of dat eener oplossing van wit vitriool, van aluin, van sublimaat enz. kan gepaard gaan. Is de Uitflag een gevolg der verhoogde levenskracht van de Borsten en der daardoor vermeerderde afzondering van over-

vloedige voedingstof, dan verbiede men het genot van al te voedzame en prikkelende spijsen en dranken, en late alle invloeden verwijderen, welke maar eenigzins de levenskracht van het Organismus in het algemeen te zeer verhoogen, en schrijve somtijds een verkoelend ontlastmiddel voor; den Uitslag zelven late men echter met zeepwater weekmaken, en zodra de roof er afgevallen is, den tepel en den kring om denzelven met kalkwater waschen, en een speenhoedje dragen.

V I J F D E H O O F D S T U K .

*Over de te groote gevoeligheid en teederheid,
alsmede van het gebrek aan oprigting der
Tepels.*

I. TE GROOTE GEVOELIGHEID EN TEEDERHEID DER TEPELS.

§. 1239.

De te groote gevoeligheid en teederheid der Tepels is gewoonlijk het gevolg der uitstekende verhoogde gevoeligheid van het Organismus en van het teeder maakfel des ligchaams in het algemeen; dezelve wordt echter door het dikwijls te warm bedekken der Borsten, door het te menigvuldig betasten door de Mannen en de daardoor verhoogde teeldrift, door wrijving van kleederen, en aanwending van ondoelmatige middelen tot oprigting der Tepels, zeer vermeerderd. Het gevolg is, dat er ligt ontvelling en zweren aan de Tepels reeds in de zwangerheid, nog veel eerder echter gedurende den zoogtijd, ontstaan, en dat het zogen zeer pijnlijk wordt.

§. 1240.

De beste hulp is, dat zulke Zwangeren al datgene vermijden, wat hare gevoeligheid in het algemeen zeer verhoogt, dat zij een tepelhoedje dragen,

en de Tepels verscheidene weken vóór de Verlossing vlijtig met rooden wijn, brandewijn, arak, eau de lavande of galnotentinctuur wasfchen. Bij de aanwending dezer middelen geve men acht, dat men de Tepels, zoodra men er die op legt, met eenen zachten doek afdrooge; wanneer zij echter in den beginne dadelijk te veel pijn verwekken, late men ze met water verdunnen, of men wende eerst het kalk- of Goulardwater aan; ook wordt in dit geval het bestrooijen met het poeder van galnoten aangeprezen. De Engelsche Vrouwen nemen een stuk brood, waarin zij met een gloeiend ijzer een gat branden, dat op de Tepels past, en bevochtigen dit dikwijls met rooden wijn.

II. GEBREK AAN OPRIGTING DER TEPELS.

§. 1241.

De Tepel moet zich oprigten, wanneer het Kind dien met den mond behoorlijk vatten zal, om te zuigen; bij vele Zwangeren blijft dezelve geheel flap, en verheft zich weinig of volstrekt niet over den kring; en daardoor ontstaat met den volgenden zoogtijd eene wezenlijke verhindering. De oorzaak ligt in het gebrek aan gevoeligheid of in eene te groote ftugheid der Tepels; van daar dat men zulks inzonderheid bij meer bejaarden, en die voor de eerste maal zwanger zijn, aantreft. Om de noodzakelijke oprigting der Tepels te bewerken, moet men ook reeds in de zwangerheid de doelmatigste middelen aanwenden; men late de Tepels dikwijls door de Zwangere met hare vingers, welke zij met haar

haar speeksel bevochtigd heeft, bestrijken en daaraan trekken; buitendien wende men een zuigglas en eene borstpomp aan, en bij eene bovenmatige stugheid late men de Tepels met zeepwater betten, met zuivere versche amandelolie bestrijken en ook een borstbad in het badbekken van STEIN gebruiken, hetwelk §. 1214 aanbevolen werd. Voor het overige moet de Tepel steeds met een hoedje bedekt, en de Borst warmer dan gewoonlijk gehouden worden.



Z E S D E H O O F D S T U K.

Over het gebrekkige maakfel der Tepels.

I. T E K L E I N E T E P E L S.

§. 1242.

Te kleine Tepels vereifchen reeds in de zwangerheid des te meerdere opmerkzaamheid, wyl de hulp gedurende het kraambed dikwerf te laat komt, en de Moeder zoowel als het Kind daardoor veel te lijden hebben; gene moet dikwijls de hevigfte pijnen verdragen, de Tepels worden gemakkelijk opengezogen, en de pogingen, die men eerst in het oogenblik van den zoogtijd aanwendt, om de Tepels op te rigten, hebben niet altijd het gewenschte gevolg, zijn dikwijls met oneindige zwarigheden verbonden, geven ligt aanleiding tot borstontfteking, en dikwijls, wanneer de toevloed van zog het sterkste is, moet men van verdere pogingen afzien, ten zij dat het Kind, moede over de dikwijls vruchteloos aangewende pogingen, de Tepels niet meer vat, of dat ieder middel vruchteloos bleef, om het noodige oogmerk ter oprigting van den Tempel te bereiken. Men heeft alsdan met eene nieuwe kwaal te kampen, die der zogaffcheiding in de Borsten tegen te gaan, en gedurende dezen tijd ontstaat er ligt ontfteking der bovendien te voren zoo geprik-

prikkelde Borst, waarvan de verdeeling zeer moeilijk gelukt, wanneer de Moeder zeer verdrietig is, om den aangename pligt van zelve haar Kind te zogen, niet te kunnen vervullen.

Verschijselen.

§. 1243.

De afwijking kan op verschillende wijzen plaats hebben: *a*) de Tepels zijn te klein ten gevolge van hun oorspronkelijk maakfel; *b*) zij zijn slechts ter neder gedrukt door het dragen van naauwe, vastzittende kleederen, bij voorbeeld door corchetten en keurslijven, die, helaas! ook thans weder in de mode schijnen te komen; *c*) de Tepels zijn naar binnen getrokken of *d*) zij ontbreken geheel.

Geneeswijze.

§. 1244.

Als de Tepels te klein zijn, dan moet de Zwangere alles vermijden, wat maar eenigzins de Borst te zeer prangt, de Tepels zelven dikwijls met de vingers wrijven en optrekken, het zuigglas vlijtig aanwenden, of — een der werkzaamste middelen — door een' anderen zuiveren persoon dikwijls daaraan laten zuigen. Buitendien kan men zijn doel bereiken door het dragen van digte tepelhoedjes, welke men uit klei, hout, gips, ivoor, lood, tin, blik, zilver, glas, de korst van brood e. d. g. vervaardigt; deze zijn echter te hard en veroorzaken eene nadeelige drukking; dit geldt ook van de aanwen-

ding der aarden pijpen en van de notendoppen; minder zijn zulks, wél is waar, de uitgeholde muskaatnoten, doch men vindt ze zelden groot genoeg, en door de olie, welke zij bevatten, wordt het vel te week, te teeder en ontvelt naderhand zeer ligt bij het zuigen. Men bedient zich ook nog van anderen uit was, doch zij worden door de warmte der Borst week, en geven dan mede. De beste zijn die uit fijnen, weinig poreufen kurk en daarna de elastieke van PICKEL; doch de eersten hebben dit nadeel, dat zij ligt breken. Het dikwijls zuigen door een' zuiveren persoon, en daarbij het dragen van een geschikt hoedje blijven steeds de zekerste en onschadelijkste middelen ter oprigting van kleine Tepels, die men tevens, omdat zij door het dikwijls zuigen gevoeliger en teederder worden, dikwijls met rooden wijn of eau de lavande laat waschen.

§. 1245.

TEPEL

Ingedrukte en inzonderheid meer naar binnen getrokken Tepels vereischen meer moeite; de genoemde middelen zijn niet altijd toereikend; men moet de borstpomp dikwijls aanwenden, en dan door het dragen van eenen ring van harst het terugtrekken der Tepels trachten te verhoeden; dit is de methode van OSIANDER. De Tepel wordt eerst gestoofd, en in den omtrek week gemaakt, de cuticula sebacea voorzigtig afgenomen, het zuigglas drie tot vier malen daags zonder geweld en in het begin alleenlijk zóó lang gebruikt, dat het vel met het overige van de Borst gelijk wordt; het te spoedig optrekken ver-
oor-

oorzaakt hevige pijnen, ontstekingen en ontvellingen. Is nu de Tepel ver genoeg opgetrokken, dan brengt men een met een gat voorzien en te voren warm gemaakt stuk harst zoodanig over denzelven, dat men dit aan beide zijden vat en langzaam uit elkander trekt, zoo ver het, zonder het te breken, mogelijk is; dan laat men den ring digt aan de Borst zamenloopen, en den Tepel zoo ver insluiten, dat er geene te hevige pijnen en zwelling door ontstaan; buitendien moet er een andere ring met eene grootere opening genomen worden, welken men gedurende de eerste dagen slechts een half uur laat dragen, tot dat de Zwangere zich daaraan gewend heeft. Wanneer de Tepel zich zoo verre opgerigt heeft, dat hij niet meer terugtrekt, dan late men dien dagelijks weder door eenen anderen persoon ophalen en een hoedje dragen. — Menigmaal doen echter bij zeer ingetrokkene (zoogenaamde holle) tepels de genoemde middelen geenen dienst, bijzonder wanneer de opening over den omgekeerden Tepel zoo klein is, dat hij er niet kan doorgebracht worden; in dit geval blijft of elke poging tot het optrekken en de op rigting van den Tepel vruchteloos, of somtijds kan het doel daardoor bereikt worden, wanneer de kleine opening door eene gemaakte insnijding vergroot wordt. Doch indien de Tepel geheel ontbreekt, door ettering of door plaats gehad hebbende operatiën bij verzweringen en verhardingen der Borst geheel of ten deele verloren is gegaan, dan bestaat er geene hulp en het zogen moet aan deze Borst achterwege blijven.

II. TE GROOTE TEPELS.

§. 1246.

De Tepels zijn somtijds te groot; men moet dan voornamelijk een onderscheid maken, of de Tepels werkelijk van de regelmatige grootte afwijken, dan of zij slechts betrekkelijk wegens den kleinen en naauwen mond van het Kind te groot worden; in beide gevallen kan het Kind niet zuigen, en bij eenen zeer naauwen mond van hetzelfde zag de Schrijver als een gevolg van de poging tot zuigen glossitis ontstaan. In beide gevallen tracht men de Tepels door aanwending van zamentrekkende middelen, bij voorbeeld een afkooksel van eikenbast met rooden wijn, eene gesatureerde galnotentinctuur e d. g. te verkleinen, en dan met een zuigglas behoorlijk op te rigten.

L I T T E R A T U R.

§. 1247.

BUDERMANN, *praes.* ZELLER, *de mammis et lacte.* Tubing. 1727.

MITHOF et LAURENTIUS, *de lactis discussione.* Erford. 1749.
MUS, *diss. sistens rationalem methodum curandi et praecavendi quosdam mammarum muliebrium, laesam lactationem concernentes morbos.* Duisb. 1770.

Observations sur le danger et l'inutilité de préparer pendant la grossesse le sein des femmes, qui se proposent de nourrir leurs enfants. Paris 1772.

GRUNER, *de statu sano et morboſo mammarum in gravidis et puerperiis. Jena 1792.*

Vernünftige und bewährte Mittel zur Erlangung und Erhaltung einer ſchönen Gorge. Berl. 1795.

V. TRIBOLET, *Sorgfalt für die Brüste junger Frauen etc. Leipz. 1794.*

BOEHMER, *de [mammarum praesidiis ante partum. Viteb. 1796.*

OSIANDER, *Denkwürdigkeiten. II. B. p. 424.*

BOER, t. a. pl. II. B. N°. 4.

MEYER, *de mammis muliebribus in statu sano et morboſo consideratis. Erford. 1800.*

J. G. MEINIKE, *diss. mammarum structuram et morbos sistens. Viteb. 1805. 4°.*

BRAUM, *über den Werth und die Wichtigkeit der weiblichen Brüste, t. a. pl.*

VOGT, *de mammarum structura et morbis. Viteb. 1805.*

KLEES, *über die weiblichen Brüste, t. a. pl.*



